

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRV I KRVOTVORNIH ORGANA									
	B03	ANTIANEMICI									
	B03X	Ostali antianemijski preparati									
	B03XA	Ostali antianemijski preparati									
	B03XA01	epoetin alfa (eritropoetin)									
0069150	B03XA01	epoetin alfa	EPREX	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 6 po 1000 i.j./0,5 ml	Cilag AG	Švajcarska	4.489,00	1000 i.j.	748,17	-
0069152	B03XA01	epoetin alfa	EPREX	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 6 po 2000 i.j./0,5 ml	Cilag AG	Švajcarska	8.978,00	1000 i.j.	748,17	-
0069154	B03XA01	epoetin alfa	EPREX	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 6 po 3000 i.j./0,3 ml (brizgalica)	Cilag AG	Švajcarska	13.467,00	1000 i.j.	748,17	-
0069155	B03XA01	epoetin alfa	EPREX	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 6 po 4000 i.j./0,4 ml (brizgalica)	Cilag AG	Švajcarska	17.956,00	1000 i.j.	748,17	-
0069157	B03XA01	epoetin alfa	EPREX	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 6 po 10000 i.j. (brizgalica)	Cilag AG	Švajcarska	44.890,00	1000 i.j.	748,17	-
INDIKACIJE		Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.									
	B03XA01	epoetin beta (eritropoetin)									
0069164	B03XA01	epoetin beta	RECORMON	rastvor za injekciju, špric	napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 1000 i.j./0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	4.472,40	1000 i.j.	745,40	-
0069165	B03XA01	epoetin beta	RECORMON	rastvor za injekciju, špric	napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	8.944,70	1000 i.j.	745,39	-
0069166	B03XA01	epoetin beta	RECORMON	rastvor za injekciju, špric	napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 5000 i.j./0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	22.362,00	1000 i.j.	745,40	-

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
0069167	B03XA01	epoetin beta	RECORMON	rastvor za injekciju, špric	napunjeni injekcioni špric, 6 brizg. po 10000 i.j./0,6 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	44.724,00	1000 i.j.	745,40	-
INDIKACIJE		Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.									
	B03XA01	epoetin zeta									
0069221	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	584,40	1000 i.j.	584,40	-
0069222	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	3.506,10	1000 i.j.	584,35	-
0069226	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.168,70	1000 i.j.	584,35	-
0069227	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	7.012,40	1000 i.j.	584,37	-
0069230	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,9 ml (3000 i.j./0,9 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.753,10	1000 i.j.	584,37	-
0069231	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,9 ml (3000 i.j./0,9 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	10.518,30	1000 i.j.	584,35	-
0069234	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.337,40	1000 i.j.	584,35	-
0069235	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	14.024,40	1000 i.j.	584,35	-
0069223	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 1 ml (10000 i.j./ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	5.843,50	1000 i.j.	584,35	-

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
0069220	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 1 ml (10000 i.j./ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	35.060,70	1000 i.j.	584,35	-
0069224	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,5 ml (20000 i.j./0,5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	11.686,90	1000 i.j.	584,35	-
0069228	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,75 ml (30000 i.j./0,75 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	17.530,40	1000 i.j.	584,35	-
0069232	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 1 ml (40000 i.j./ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	23.373,80	1000 i.j.	584,35	-
INDIKACIJE		Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.									
	B03XA02	darbepoetin alfa									
0069939	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric, 1 po 0,4 ml (10 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	1.516,50	4,5 mcg	682,43	-
0069938	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,38 ml (15 mcg/0,375 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	2.274,80	4,5 mcg	682,44	-
0069924	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	3.033,00	4,5 mcg	682,43	-
0069928	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	4.549,50	4,5 mcg	682,43	-
0069929	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,4ml (40 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	6.066,00	4,5 mcg	682,43	-

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
0069933	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	7.582,50	4,5 mcg	682,43	-
0069934	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	9.099,00	4,5 mcg	682,43	-
0069936	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	12.132,00	4,5 mcg	682,43	-
0069920	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	15.165,00	4,5 mcg	682,43	-
0069922	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	22.747,50	4,5 mcg	682,43	-
0069926	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	45.495,00	4,5 mcg	682,43	-
0069925	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	3.033,00	4,5 mcg	682,43	-
0069930	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,4 ml (40 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	6.066,00	4,5 mcg	682,43	-
0069935	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	9.099,00	4,5 mcg	682,43	-
0069937	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	12.132,00	4,5 mcg	682,43	-
0069921	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	15.165,00	4,5 mcg	682,43	-
0069923	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	22.747,50	4,5 mcg	682,43	-

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
0069927	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	45.495,00	4,5 mcg	682,43	-
INDIKACIJE 1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).											
	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta									
0069206	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 50 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	8.891,50	4 mcg	711,32	-
0069205	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 75 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	13.337,30	4 mcg	711,32	-
0069204	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 100 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	17.782,90	4 mcg	711,32	-
0069203	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 150 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	26.674,40	4 mcg	711,32	-
0069202	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 200 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	35.565,80	4 mcg	711,32	-
0069201	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 250 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	44.457,31	4 mcg	711,32	-
0069208	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 50 mcg/1 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	8.891,50	4 mcg	711,32	-

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
0069213	B03XA03	metoksipolietilengli kol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 30 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	5.334,90	4 mcg	711,32	-
0069212	B03XA03	metoksipolietilengli kol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 120 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	21.339,50	4 mcg	711,32	-
0069214	B03XA03	metoksipolietilengli kol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 360 mcg/0,6 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	64.018,50	4 mcg	711,32	-
INDIKACIJE		1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L	ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI									
	L01	ANTINEOPLASTICI									
	L01A	Alkilirajući citostatici									
	L01AX	Ostali alkilirajući antineoplastici									
	L01AX03	temozolomid									
1031407	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 5 mg	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	1.930,90	-	-	-
1031405	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 20 mg	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	8.310,40	-	-	-
1031408	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 100 mg	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	40.117,60	-	-	-
1031406	L01AX03	temozolomid	TEMODAL	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 250 mg	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	99.007,40	-	-	-
INDIKACIJE		Glioblastoma multiforme kod bolesnika, PS 0 ili 1 kao postoperativna terapija, istovremeno sa zračnom terapijom (75 mg/m2 dnevno), a po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom još šest ciklusa na 28 dana u dozi od 150-200 mg/m2 tokom pet dana po ciklusu, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
	L01B	Antimetaboliti									
	L01BA	Analozi folne kiseline									
	L01BA04	pemetreksed									
0034413	L01BA04	pemetreksed	ALIMTA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Lilly France S.A.S.	Francuska	131.301,60	-	-	-
INDIKACIJE		1. Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L01BC	Analози pirimidina									
	L01BC06	kapecitabin									
1034341	L01BC06	kapecitabin	XELODA	film tableta	blister, 120 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	28.705,60	-	-	-
1034340	L01BC06	kapecitabin	XELODA	film tableta	blister, 60 po 150mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	4.646,40	-	-	-
INDIKACIJE		1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C" , kod starijih bolesnika (≥ 65 godina), PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
	L01C	Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi									
	L01CD	Taksani									
	L01CD02	docetaksel									
0039300	L01CD02	docetaksel	TAXOTERE	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 1,5 ml (20 mg/0,5 ml)	Aventis Pharma Ltd.	Velika Britanija	14.373,00	-	-	-

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
0039301	L01CD02	docetaksel	TAXOTERE	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 6 ml (80 mg/2 ml)	Aventis Pharma Ltd.	Velika Britanija	52.481,90	-	-	-
INDIKACIJE		1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1- retreatman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIb, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC									
	L01D	Citotoksični antibiotici i srodne supstance									
	L01DB	Antraciklini i srodni preparati									
	L01DB06	idarubicin									
0033181	L01DB06	idarubicin	ZAVEDOS	liofilizat za rastvor za injekciju	1 po 10 mg	Actavis Italia S.P.A.	Italija	11.649,90	-	-	-
INDIKACIJE		Svi oblici akutnih leukemija i limfoblastni limfom, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika									
NAPOMENA		STAC									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L01X	Ostali antineoplastici									
	L01XC	Monoklonska antitela									
	L01XC02	rituksimab									
0014140	L01XC02	rituksimab	MABTHERA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 2 po 10 ml (100 mg/10 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	47.487,50	-	-	-
0014141	L01XC02	rituksimab	MABTHERA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (500 mg/50 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	117.245,50	-	-	-
INDIKACIJE		1. Nemoćinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupnoćelijski, novodijagnostifikovani uz hemioterapiju; 2. Nemoćinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostifikovani i u recidivu bolesti; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. 3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) – rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to: a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2). Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi.									
NAPOMENA		STAC; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L01XC03	trastuzumab									
0039345	L01XC03	trastuzumab	HERCEPTIN	prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju	liobočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (440 mg/20 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	165.552,70	-	-	-
INDIKACIJE		Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3+ ili CISH+): a) adjuvantna hemioterapija- kao nastavak adjuvantne hemioterapije antraciklinima kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksanima do ukupno 12 meseci, kod nodus pozitivnih bolesnica i nodus negativnih bolesnica sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antracikline, trastuzumab kombinovati sa neantraciklinskim režimima); b) metastatska bolest- PS 0 ili 1, prva linija posle antraciklinske terapije, u kombinaciji sa taksanima, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti samo Herceptin do progresije bolesti; c) lokalno uznapredovali karcinom dojke: primena Herceptina u kombinaciji sa taksanskom hemioterapijom, a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu Herceptina u neoadjuvantnom pristupu ; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC									
	L01XC04	alemtuzumab									
0039450	L01XC04	alemtuzumab	MABCAMPATH	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 3 po 1 ml (30 mg/ml)	Schering AG	Nemačka	118.841,80	-	-	-
INDIKACIJE		1. Hronična limfocitna leukemija, refraktorni ili relapsirajući oblik bolesti, posle prethodno primenjenih alkilirajućih agenasa ili purinskih analoga, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L01XC06	cetuximab									
0039153	L01XC06	cetuximab	ERBITUX	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Merck KGaA	Nemačka	19.034,20	-	-	-
INDIKACIJE		1. Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatina i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija ili u kombinaciji sa irinotekanom, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 2. Planocelularni karcinom glave i vrata: a) lokalno uznapredovala, inoperabilna bolest, kod koje inicijalno nije indikovana radioterapija (bilo koji T N3 za orofarinks i T4 bilo koji N za karcinom jezika ili usne duplje i paranazalnih sinusa), PS 0, 1 ili 2, nakon indukcione hemioterapije, u kombinaciji sa radioterapijom; b) lokalno uznapredovala, inoperabilna bolest, u kombinaciji sa radioterapijom PS 0 ili 1, u pacijenata kod kojih je kontraindikovana primena lekova na bazi platine; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika .									
NAPOMENA		STAC									
	L01XC07	bevacizumab									
0039401	L01XC07	bevacizumab	AVASTIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 4 ml (100 mg/4 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	29.245,10	-	-	-
0039400	L01XC07	bevacizumab	AVASTIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 16 ml (400 mg/16 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	117.126,30	-	-	-
INDIKACIJE		Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb ili IVc, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, do postizanja resektabilnosti metastaza i odgovarajuće operacije istih, maksimalno 10 ciklusa, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L01XE	Inhibitori protein kinaze									
	L01XE01	imatinib-mesilat									
1039381	L01XE01	imatinib-mesilat	GLIVEC	kapsula, tvrda	blister, 120 po 100 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	203.801,40	-	-	-
INDIKACIJE		1. Prva terapijska linija kod novodijagnostifikovanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, u hroničnoj fazi bolesti, Philadelphia hromozom ili bcr-abl rearanžman pozitivni, bez dodatnih aberacija, uz dozvoljenu prethodnu leukoredukciju hidroksiureom do šest meseci, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori)- lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO za odobravanje upotrebe leka Glivec.									
	L01XE02	gefitinib									
1039398	L01XE02	gefitinib	IRESSA	film tableta	30 po 250 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	206.330,10	-	-	-
INDIKACIJE		Nesitnoćelijski karcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
	L01XE03	erlotinib									
1039402	L01XE03	erlotinib	TARCEVA	film tableta	blister, 30 po 25 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	43.823,30	-	-	-
1039403	L01XE03	erlotinib	TARCEVA	film tableta	blister, 30 po 100 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	151.214,00	-	-	-
1039404	L01XE03	erlotinib	TARCEVA	film tableta	blister, 30 po 150 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	182.328,50	-	-	-
INDIKACIJE		Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L01XE04	sunitinib									
1039703	L01XE04	sunitinib	SUTENT	kapsula, tvrda	blister, 28 po 12,5 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	110.714,60	-	-	-
1039704	L01XE04	sunitinib	SUTENT	kapsula, tvrda	blister, 28 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	220.365,20	-	-	-
1039706	L01XE04	sunitinib	SUTENT	kapsula, tvrda	blister, 28 po 50 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	440.376,50	-	-	-
INDIKACIJE		Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetloćelijski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
	L01XE08	nilotinib									
1039710	L01XE08	nilotinib	TASIGNA	kapsula, tvrda	blister, 112 po 200 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	353.773,20	-	-	-
INDIKACIJE		Druga terapijska linija kod odraslih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju, uključujući imatinib mesilat, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja komisije RZZO.									
	L01XX	Ostali antineoplastici									
	L01XX05	hidroksikarbamid									
1039285	L01XX05	hidroksikarbamid	LITALIR	kapsula	bočica, 100 po 500 mg	Bristol Myers-Squibb S.R.L.	Italija	3.791,50	-	-	-
INDIKACIJE		Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L01XX11	estramustin									
1031043	L01XX11	estramustin	ESTRACYT	kapsula	100 po 140 mg	Pharmacia Italia S.P.L.	Italija	11.000,00	-	-	-
INDIKACIJE		Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
	L01XX14	tretinoin									
1069140	L01XX14	tretinoin	VESANOID	kapsula	100 po 10 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	16.226,20	-	-	-
INDIKACIJE		Akutna mijeloidna leukemija, podtip akutna promijelocitna leukemija, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
	L01XX32	bortezomib									
0039100	L01XX32	bortezomib	VELCADE	prašak za rastvor za injekciju	1 po 3,5 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	115.350,80	-	-	-
INDIKACIJE		Multipni mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (klirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4); prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L02	ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA									
	L02B	Hormonski antagonisti i srodni lekovi									
	L02BG	Inhibitori enzima aromataze									
	L02BG03	anastrozol									
1039325	L02BG03	anastrozol	ARIMIDEX	film tableta	28 po 1 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	2.887,40	1 mg	103,12	-
1039326	L02BG03	anastrozol	TRASOLETTE	film tableta	blister, 28 po 1 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.887,40	1 mg	103,12	-
1039720	L02BG03	anastrozol	AREMED	film tableta	blister, 28 po 1 mg	Remedica Ltd.	Kipar	2.887,40	1 mg	103,12	-
INDIKACIJE		Karcinom dojke: 1. Rani steroid- receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije takoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno pet godina. Od ovog se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid- receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do pet godina; b) ranim steroid- receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do pet godina; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid- receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili e									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L02BG04	letrozol									
1039330	L02BG04	letrozol	FEMARA	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	3.093,60	2,5 mg	103,12	-
1039331	L02BG04	letrozol	FEMOZOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	3.093,60	2,5 mg	103,12	-
1039716	L02BG04	letrozol	LAMETTA	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Vipfarm	Poljska	3.093,60	2,5 mg	103,12	-
INDIKACIJE		Karcinom dojke: 1. Rani steroid- receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije takoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno pet godina. Od ovog se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid- receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do pet godina; b) ranim steroid- receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do pet godina; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid- receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili e									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L02BG06	eksemestan									
1039390	L02BG06	eksemestan	AROMASIN	tableta	30 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	3.093,60	25 mg	103,12	-
INDIKACIJE		Karcinom dojke: 1. Rani steroid- receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije takoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno pet godina. Od ovog se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid- receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do pet godina; b) ranim steroid- receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biološke terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do pet godina; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid- receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili e									
	L03	IMUNOSTIMULANSI									
	L03A	Citokini i imunomodulatori									
	L03AB	Interferoni									
	L03AB07	interferon beta 1a									
0328388	L03AB07	interferon beta 1a	REBIF	rastvor za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjen injektion špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (44 mcg/0.5 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	83.112,10	-	-	-
0328647	L03AB07	interferon beta 1a	AVONEX	rastvor za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjen injektion špric, 4 po 0.5 ml (30 mcg/0.5ml)	Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS	Danska	73.189,90	-	-	-
INDIKACIJE		1. Multipla skleroza									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L03AB08	interferon beta 1b									
0015150	L03AB08	interferon beta 1b	BETAFERON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 15 po 1,2 ml (250 mcg/ml)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	77.752,00	4 Mi.j.	2.159,78	-
INDIKACIJE		1. Multipla skleroza									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									
	L03AB10	peginterferon alfa 2b									
0328630	L03AB10	peginterferon alfa - 2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	7.797,30	7,5 mcg	1.169,60	-
0328631	L03AB10	peginterferon alfa - 2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (80 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	12.436,50	7,5 mcg	1.165,92	-
0328900	L03AB10	peginterferon alfa - 2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	15.757,60	7,5 mcg	1.181,82	-
0328632	L03AB10	peginterferon alfa - 2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (120 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	18.426,30	7,5 mcg	1.151,64	-

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
0328633	L03AB10	peginterferon alfa - 2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (150 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	24.341,50	7,5 mcg	1.217,08	-
INDIKACIJE		Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: -anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - nivo HCV RNK veći od 100 000 kopija u ml seruma (PCR metodom) , b. biohemijski nalaz: povišena aktivnost transaminaza (ALT), c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza), d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije a ispunjavaju sve ostale uslove, e. bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra, f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).									
NAPOMENA		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									
	L03AB11	peginterferon alfa 2a									
0328607	L03AB11	peginterferon alfa- 2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u napunjenom injektionom špricu	napunjen injektioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12.371,00	26 mcg	2.382,56	-

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
0328608	L03AB11	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	16.494,70	26 mcg	2.382,57	-
INDIKACIJE		Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: -anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - nivo HCV RNK veći od 100 000 kopija u ml seruma (PCR metodom) , b. biohemijski nalaz: povišena aktivnost transaminaza (ALT), c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekroinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza), d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije a ispunjavaju sve ostale uslove, e. bolesnici koji apstiniraju od i.v.droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra), f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom, Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisno od genotipa virusa (genotip 2 i 3 HCV 24 nedelje, a genotipovi 1, 4, 5 i 6 HCV 48 nedelja).									
NAPOMENA		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									
	L03AX	Ostali imunostimulansi									
	L03AX13	glatiramer acetat									
0015120	L03AX13	glatiramer acetat	COPAXONE	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 28 po 1 ml (20 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	Izrael	74.285,90	20 mg	2.653,07	-
INDIKACIJE		1. Multipla skleroza									
NAPOMENA		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L04	IMUNOSUPRESIVI									
	L04A	Imunosupresivi									
	L04AB	Inhibitori tumor necrosis faktora TNF-alfa									
	L04AB01	etanercept									
0014310	L04AB01	etanercept	ENBREL	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica staklena , 4 po 25 mg	Wyeth Laboratories Limited	Velika Britanija	49.202,40	7 mg	3.444,17	-
0014312	L04AB01	etanercept	ENBREL	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric sa iglom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	97.474,70	7 mg	3.411,61	-
INDIKACIJE		1. Poliartrikularni juvenilni hronični artritis (M08) za pacijente čija je bolest počela u dobi od 4 do 17 godina života, sa neadekvatnim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove najmanje tokom šest meseci terapije; 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci) ; 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda)									
NAPOMENA		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L04AB02	infliksimab									
0014220	L04AB02	infliksimab	REMICADE	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 100 mg	Centocor B.V.	Holandija	54.111,80	3,75 mg	2.029,19	-
INDIKACIJE		1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa / bez fistule kod pacijenata koji nisu reagovali na konvencionalnu terapiju kortikosteroidima, imunomodulatorima i primarnu nutritivnu terapiju kao i kod onih pacijenta koji pomenute lekove ne podnose ili kod kojih je takva vrsta terapije kontraindikovana; 2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatori (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju; 3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prosustvo aktivne zglobove bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje e 5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj p									
NAPOMENA		STAC; Za indicaciju pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja 3 lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Za indicaciju pod tačkom 3., 4. i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L04AB04	adalimumab									
0014202	L04AB04	adalimumab	HUMIRA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 2 po 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	Abbott Biotechnology Deutschland GmbH	Nemačka	102.084,60	2,9 mg	3.700,57	-
INDIKACIJE		1. Poliartikularni juvenilni hronični artritis (M08) za pacijente čija je bolest počela u dobi od 4 do 17 godina života, sa neadekvatnim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove najmanje tokom šest meseci terapije; 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobove bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda); 5. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50) - luminalni oblik, kod bolesnika kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i imunosupresivima									
NAPOMENA		STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO. Za indikaciju pod tačkom 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja 3 lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	L04AC	Inhibitori interleukina									
	L04AC07	tocilizumab									
0014400	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4ml (80 mg/4 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	14.701,78	-	-	-
0014401	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (200 mg/10 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	36.642,90	-	-	-
0014402	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (400 mg/20 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	72.521,60	-	-	-
INDIKACIJE		Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.									
NAPOMENA		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RZZO.									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	M	MIŠIČNO-KOSTNI SISTEM - LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIČNO-KOSTNOG SISTEMA									
	M05	LEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU									
	M05B	Delovi koji deluju na strukturu kosti i mineralizaciju									
	M05BA	Bisfosfonati									
	M05BA02	klodronska kiselina									
0059062	M05BA02	klodronska kiselina	BONEFOS	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 5 ml (60 mg/1ml)	Schering OY	Finska	7.023,90	1,5 g	7.023,90	-
INDIKACIJE		1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Hiperkalcemijska koma, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC									
	M05BA03	pamidronska kiselina									
0059101	M05BA03	pamidronska kiselina	AREDIA	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	liobočica sa rastvaračem, 4 po 5 ml (15 mg)	Novartis Pharma AG	Švajcarska	5.024,90	60 mg	5.024,90	-
0059102	M05BA03	pamidronska kiselina	AREDIA	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	liobočica sa rastvaračem, 2 po 10 ml (30 mg)	Novartis Pharma AG	Švajcarska	5.024,90	60 mg	5.024,90	-
0059300	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMITOR	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 2 ml (15 mg/ml)	Torrex Chiesi Pharma GmbH	Austrija	2.512,40	60 mg	5.024,80	-
0059301	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMITOR	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 4 ml (15 mg/ml)	Torrex Chiesi Pharma GmbH	Austrija	5.024,90	60 mg	5.024,90	-
0059302	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMITOR	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 6 ml (15 mg/ml)	Torrex Chiesi Pharma GmbH	Austrija	7.537,40	60 mg	5.024,93	-
0059305	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMIFOS	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 10 ml (3 mg/ml)	Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka	Republika Srbija	2.512,40	60 mg	5.024,80	-
0059306	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMIFOS	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 5 ml (3 mg/ml)	Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka	Republika Srbija	1.256,20	60 mg	5.024,80	-

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
0059307	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMIFOS	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 30 ml (3 mg/ml)	Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka	Republika Srbija	7.537,40	60 mg	5.024,93	-
0059308	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMIFOS	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (3 mg/ml)	Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka	Republika Srbija	5.024,90	60 mg	5.024,90	-
0059105	M05BA03	pamidronska kiselina	HIDENSIL	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 2 po 10 ml (30 mg/10 ml)	Viphaarm S.A.	Poljska	5.024,90	60 mg	5.024,90	-
INDIKACIJE		1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Hiperkalcemijska koma, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC									
	M05BA06	ibandronat									
0059083	M05BA06	ibandronat	BONDRONAT	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 2 mg/2 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	10.236,40	6 mg	30.709,20	-
0059086	M05BA06	ibandronat	BONDRONAT	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 6 mg/6 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	23.101,60	6 mg	23.101,60	-
0059087	M05BA06	ibandronat	BONDRONAT	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 6 mg/6 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	115.507,70	6 mg	23.101,54	-
INDIKACIJE		1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Hiperkalcemijska koma, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC									

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica
	M05BA08	zoledronska kiselina									
0059211	M05BA08	zoledronska kiselina	ZOMETA	prašak za rastvor za infuziju	1 po 4 mg+ 5 ml rastvarača	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	20.218,00	4 mg	20.218,00	-
0059222	M05BA08	zoledronska kiselina	ZOLEDRONATE PHARMASWISS	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	20.218,00	4 mg	20.218,00	-
INDIKACIJE		1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 2. Hiperkalcemije preko 3.0 mmol/l, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; 3. Hiperkalcemijska koma, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika.									
NAPOMENA		STAC									