

**LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I
IZDAJU NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA**

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2157101	A01AB09	mikonazol	DAKTANOL	oralni gel	tuba, 1 po 40 g 2%	Galenika a.d.	Republika Srbija	225,50	0,2 g	56,38	50,00		
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	329,40	20 mg	21,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122858	A02BC01	omeprazol	ZEPROM	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	307,40	20 mg	21,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	307,40	20 mg	21,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122857	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	307,40	20 mg	21,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122936	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	307,40	20 mg	21,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122935	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	boca, 15 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	329,40	20 mg	21,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	125,50	40 mg	8,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122774	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	125,50	40 mg	8,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	125,50	40 mg	8,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	251,00	40 mg	8,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122160	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	380,00	30 mg	27,14	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122161	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	439,00	30 mg	31,36	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122162	A02BC03	lansoprazol	LARONA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	bočica plastična, 28 po 30 mg	Jadran Galenski Laboratorij d.d.	Hrvatska	760,00	30 mg	27,14	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122163	A02BC03	lansoprazol	LARONA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	bočica plastična, 28 po 15 mg	Jadran Galenski Laboratorij d.d.	Hrvatska	439,00	30 mg	31,36	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122859	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	121,10	30 mg	25,95	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	242,30	30 mg	25,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	484,60	30 mg	25,96	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122883	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	163,20	30 mg	17,49	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	326,20	30 mg	17,48	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	652,30	30 mg	17,47	50,00	Zollinger Ellisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1124301	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	134,00	30 mg	13,40	50,00		
3124300	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	oralni rastvor	bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (5 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	79,80	30 mg	23,94	50,00		
1124303	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	tableta	blister, 40 po 10 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska	Republika Makedonija	178,70	30 mg	13,40	50,00		
1124532	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 4 mg	Slavamed d.o.o.	Republika Srbija	1.506,40	16 mg	602,56	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124534	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 8 mg	Slavamed d.o.o.	Republika Srbija	3.013,00	16 mg	602,60	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124100	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister, 10 po 1 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	2.109,10	2 mg	421,82	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124104	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister, 5 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	2.943,60	2 mg	588,72	50,00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1127177	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula	100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2.195,70	0,75 g	65,87	50,00	Primarna biliarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127176	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula	50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.097,80	0,75 g	65,87	50,00	Primarna biliarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127050	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	sirup	1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	402,30	6,7 g	8,08	50,00	1. Portosistemske encefalopatije (K72), 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127426	A06AD11	laktuloza	LAKTULOZA	sirup	boca, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	402,30	6,7 g	8,08	50,00	1. Portosistemske encefalopatije (K72), 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3126303	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL	oralna suspenzija	bočica, 1 po 90 ml (200 mg/5 ml)	Bosna i Hercegovina	Bosna i Hercegovina	254,10	600 mg	42,35	50,00	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana.	Samo za decu.
1126401	A07DA03	loperamid	LOPERAMID	tableta	blister, 20 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	111,40	10 mg	27,85	50,00		
1126412	A07DA03	loperamid	LOPEDIUM AKUT	kapsula, tvrda	blister, 10 po 2 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	55,70	10 mg	27,85	50,00		
1129930	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 100 po 3 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	8.663,20	9 mg	259,90	50,00	Crohnova bolest terminalnog ileuma ili ascedentnog kolona (K50).	Lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1129490	A07EC01	sulfasalazin	SALAZOPYRIN-EN	gastrorezistentna tableta	boca plastična, 100 po 500 mg	Kemwell AB	Švedska	936,00	2 g	37,44	50,00		
1129300	A07EC02	mesalazin	5-ASA	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 250 mg	Slavamed d.o.o.	Republika Srbija	863,60	1,5 g	51,82	50,00	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129303	A07EC02	mesalazin	5-ASA	supozitorija	blister, 30 po 250 mg	Slavamed d.o.o.	Republika Srbija	901,90	1,5 g	180,38	50,00	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121153	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezistentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 20 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	558,30	4 kapsule	111,66	50,00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhoea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1121154	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezištentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 50 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	1.395,70	4 kapsule	111,66	50,00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121155	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezištentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	2.791,40	4 kapsule	111,66	50,00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121159	A09AA02	pankreas prašak	EUROBIOL 25 000	gastrorezištentna kapsula, tvrda	bočica staklena, 100 po (274,05 - 329,875 mg)	Laboratoires Mayoly Spindler	Francuska	2.791,40	4 kapsule	111,66	50,00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121152	A09AA02	pankreatin	KREON 10 000	gastrorezištentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 150 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	1.112,70	6 kapsula	66,76	50,00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121157	A09AA02	pankreatin	KREON 40 000	gastrorezištentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 50 po 400 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	2.589,00	4 kapsule	207,12	50,00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
0041559	A10AB01	insulin humani	ACTRAPID PENFILL	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.183,80	40 i.j.	58,23	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041425	A10AB01	insulin humani	HUMULIN R	rastvor za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.183,80	40 i.j.	58,23	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041563	A10AB01	insulin humani	INSUMAN RAPID SOLOSTAR	rastvor za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.183,80	40 i.j.	58,23	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041507	A10AB04	insulin lispro	HUMALOG	rastvor za injekciju	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.325,60	40 i.j.	88,68	50,00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041532	A10AB05	insulin aspart	NOVO RAPID	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	2.434,70	40 i.j.	97,39	50,00		Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041527	A10AB05	insulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	3.652,00	40 i.j.	97,39	50,00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugodelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041549	A10AB06	insulin glulizin	APIDRA	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.168,20	40 i.j.	86,73	50,00		Pacijenti na terapiji subkutanom insulinskom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041548	A10AB06	insulin glulizin	APIDRA	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	3.252,30	40 i.j.	86,73	50,00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugododelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugododelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041556	A10AB06	insulin glulizin	APIDRA SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	3.252,30	40 i.j.	86,73	50,00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugododelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugododelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041557	A10AC01	insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan)	INSULATARD PENFILL	suspenzija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.348,20	40 i.j.	62,62	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041428	A10AC01	insulin humani	HUMULIN NPH	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.348,20	40 i.j.	62,62	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041515	A10AC01	insulin humani	HUMULIN NPH KwikPen	suspenzija za injekciju u peni sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.	Francuska	2.348,20	40 i.j.	62,62	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041564	A10AC01	human insulin	INSUMAN BAZAL SOLOSTAR	suspenzija za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.348,20	40 i.j.	62,62	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041558	A10AD01	insulin humani	MIXTARD 30 PENFILL	suspenzija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.348,20	40 i.j.	62,62	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041565	A10AD01	insulin humani	INSUMAN COMB 25 SOLOSTAR	suspenzija za injekciju, pen sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.348,20	40 i.j.	62,62	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041427	A10AD01	insulin humani	HUMULIN M3	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.348,20	40 i.j.	62,62	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041514	A10AD01	insulin humani	HUMULIN M3 KwikPen	suspenzija za injekciju u penu sa uloškom	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.	Francuska	2.348,20	40 i.j.	62,62	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041502	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 25	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.367,80	40 i.j.	89,81	50,00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041503	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 50	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	3.367,80	40 i.j.	89,81	50,00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041504	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 25 KwikPen	suspenzija za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.	Francuska	3.367,80	40 i.j.	89,81	50,00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041505	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 50 KwikPen	suspenzija za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.	Francuska	3.367,80	40 i.j.	89,81	50,00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041528	A10AD05	insulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	suspenzija za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	3.652,00	40 i.j.	97,39	50,00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041530	A10AE04	insulin glargin	LANTUS OPTIPEN	rastvor za injekciju	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	5.109,80	40 i.j.	136,26	50,00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola / l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
0041555	A10AE04	insulin glargin	LANTUS SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	5.109,80	40 i.j.	136,26	50,00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola / l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041550	A10AE05	insulin detemir	LEVEMIR FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	5.465,90	40 i.j.	145,76	50,00		Samo za pacijente sa nezaodovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodio hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju.
1043060	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	74,70	2 g	9,96	50,00		
1043062	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	115,00	2 g	7,67	50,00		
1043070	A10BA02	metformin	TEFOR	tableta	30 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	74,70	2 g	9,96	50,00		
1043071	A10BA02	metformin	TEFOR	film tableta	tegla, 30 po 850 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	89,20	2 g	7,00	50,00		
1043107	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S; Merck S.L.; Merck KGaA; Merck KGaA & Co. WERK SPITAL	Francuska; Španija; Nemačka; Austrija	115,00	2 g	7,67	50,00		
1043116	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Zdravlje a.d	Republika Srbija	74,70	2 g	9,96	50,00		
1043118	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tableta	blister, 30 po 850 mg	Zdravlje a.d	Republika Srbija	89,20	2 g	7,00	50,00		
1043117	A10BA02	metformin	METFODIAB	film tableta	blister, 30 po 1000 mg	Zdravlje a.d	Republika Srbija	115,00	2 g	7,67	50,00		
1042332	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 3.5	tableta	blister, 30 po 3,5 mg	Berlin-Chemie (Menarini group)	Nemačka	90,00	7 mg	6,00	50,00		
1042076	A10BB09	gliklazid	GLIKOSAN	tableta	blister, 30 po 80 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	168,00	0,16 g	11,20	50,00		
1042070	A10BB09	gliklazid	GLIORAL	tableta	blister, 30 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	168,00	0,16 g	11,20	50,00		
1042065	A10BB09	gliklazid	DIPRIAN	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	168,00	0,16 g	11,20	50,00		
1042311	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi-Aventis S.P.A.	Francuska; Italija	92,90	2 mg	3,10	50,00		
1042312	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi-Aventis S.P.A.	Francuska; Italija	156,20	2 mg	3,47	50,00		
1042313	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Sanofi-Aventis S.P.A.	Italija	156,20	2 mg	2,60	50,00		
1042830	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	119,00	2 mg	7,93	50,00		

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1042831	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	92,90	2 mg	3,10	50,00		
1042832	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	156,20	2 mg	3,47	50,00		
1042833	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	156,20	2 mg	2,60	50,00		
1042834	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 6 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	360,50	2 mg	4,01	50,00		
1042815	A10BB12	glimepirid	DIBIGLIM	tableta	blister, 30 po 1 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d.	Republika Srbija	119,00	2 mg	7,93	50,00		
2050087	A11CC05	holekalciferol	VIGANTOL ULJE	oralne kapi	bočica, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)	Merck KGaA	Nemačka	167,10	-	-	50,00		
1053075	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONAT ALKALOID	tableta	tegla, 50 po 1 g	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	282,10	3 g	16,93	50,00		
1063115	B01AA03	varfarin	FARIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	134,40	7,5 mg	6,72	50,00		
1068200	B01AC05	tiklopidin	TICLODIX	film tableta	blister, 30 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	229,70	0,5 g	15,31	50,00		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetylsalicylic acid, a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
3060073	B03AB05	gvožđe (II) hidroksid polimaltozni kompleks	FERRUM SANDOZ	sirup	1 po 100 ml (50 mg/5 ml)	Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Vifor Inc, Švajcarska	Slovenija	222,10	90 mg	19,99	50,00		
3060072	B03AB05	gvožđe (II) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	222,10	90 mg	19,99	50,00		
3060074	B03AB05	gvožđe (II) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	494,70	90 mg	22,26	50,00		
3060050	B03AB09	gvožđe (III)-proteinsukcinilat	LEGOFER	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 150 ml (800 mg/15 ml)	Alkaloid a.d. u saradnji sa Italfarmaco S.P.A. Italija	Republika Makedonija	265,70	-	-	50,00		
1061040	B03BB01	folna kiselina	FOLNAK	tableta	fiola, 20 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	110,10	0,4 mg	0,44	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061050	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	tableta	fiola, 20 po 5 mg	Jadran Galenski Laboratorij d.d.	Hrvatska	110,10	0,4 mg	0,44	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061021	B03BB01	folna kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	110,10	0,4 mg	0,44	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1100252	C01AA05	digoksin	DILACOR	tableta	blister, 20 po 0,25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	73,40	0,25 mg	3,67	50,00		
1101130	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister, 50 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	359,90	0,3 g	14,40	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101131	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister, 50 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	648,00	0,3 g	12,96	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101402	C01BD01	amiodaron	AMIODARON	tableta	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	525,20	0,2 g	8,75	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101440	C01BD01	amiodaron	SEDACORON	tableta	blister, 50 po 200 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	437,70	0,2 g	8,75	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1101354	C01BD01	amjodaron	CORDARONE	tableta	blister, 30 po 200 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	262,60	0,2 g	8,75	50,00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1102071	C01DA08	izosorbid dinitrat	DIFUTRAT	kapsula	60 po 20 mg	Srbolek a.d.	Republika Srbija	224,60	60 mg	11,23	50,00		
1102060	C01DA08	izosorbid dinitrat	ISOSORB RETARD	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	224,60	60 mg	11,23	50,00		
1102082	C01DA08	izosorbid dinitrat	CORNILAT	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	74,80	60 mg	11,22	50,00		
1102450	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	107,70	40 mg	7,18	50,00		
1102452	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	175,00	40 mg	5,83	50,00		
1102302	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	107,70	40 mg	7,18	50,00		
1102300	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 40 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	175,00	40 mg	5,83	50,00		
1102522	C01DX12	molsidomin	LOPION FORTE	tableta	blister, 30 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	173,70	-	-	50,00	Angina pectoris koja ne reaguje na uobičajeno doziranje molsidomina.	
1103432	C02AB02	meti dopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	158,90	2 g	63,56	50,00	Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.
1400410	C03AA03	hidrohloftiazid	DIUNORM	tableta	blister, 20 po 25 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	97,10	25 mg	4,86	50,00		
1400142	C03CA01	furosemid	LASIX	film tableta	blister, 12 po 40 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	78,60	40 mg	6,55	50,00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400041	C03CA02	bumetanid	YURINEX	tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	195,30	1 mg	9,77	50,00		
1400440	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	276,30	75 mg	20,72	50,00		
1400441	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	532,30	75 mg	13,31	50,00		
1401290	C03EA...	amilorid, metiklotiazid	LOMETAZID	tableta	30 po (10 mg + 5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	138,20	1 tableta	4,61	50,00		
1400400	C03EA01	hidrohloftiazid, amilorid	HEMOPRES	tableta	blister, 40 po (50 mg + 5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	163,30	1 tableta	4,08	50,00		
1107183	C07AA05	propranolol	PROPRANOLOL	tableta	50 po 40 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	107,90	0,16 g	8,63	50,00		
1107496	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	144,90	0,15 g	7,25	50,00		
1107750	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	69,90	0,15 g	7,49	50,00		
1107751	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	139,90	0,15 g	7,49	50,00		
1107886	C07AB02	metoprolol	EGILOK	tableta	bočica staklena, 60 po 50 mg	Egis Pharmaceuticals PLC	Mađarska	149,90	0,15 g	7,50	50,00		
1107885	C07AB02	metoprolol	EGILOK	tableta	bočica staklena, 60 po 100 mg	Egis Pharmaceuticals PLC	Mađarska	289,80	0,15 g	7,25	50,00		
1107580	C07AB02	metoprolol	CORVITOL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	Nemačka	74,90	0,15 g	7,49	50,00		
1107582	C07AB02	metoprolol	CORVITOL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Berlin-Chemie AG (Menarini Group)	Nemačka	144,90	0,15 g	7,25	50,00		
1107170	C07AB03	atenolol	PRINORM	tableta	14 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	91,60	75 mg	4,91	50,00		
1107550	C07AB03	atenolol	ATENOLOL	tableta	14 po 100 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	91,60	75 mg	4,91	50,00		
1107552	C07AB03	atenolol	ATENOLOL	tableta	blister, 20 po 50 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	72,80	75 mg	5,46	50,00		
1107500	C07AB03	atenolol	ATENOLOL	tableta	14 po 100 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	91,60	75 mg	4,91	50,00		
1107042	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	105,30	10 mg	14,04	50,00		

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107020	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	134,80	10 mg	8,99	50,00		
1107021	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	244,70	10 mg	8,16	50,00		
1107023	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	134,80	10 mg	8,99	50,00		
1107022	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	244,70	10 mg	8,16	50,00		
1107026	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	105,30	10 mg	14,04	50,00		
1107027	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	134,80	10 mg	8,99	50,00		
1107025	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	244,70	10 mg	8,16	50,00		
1107035	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	105,30	10 mg	14,04	50,00		
1107036	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	134,80	10 mg	8,99	50,00		
1107037	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	244,70	10 mg	8,16	50,00		
1107041	C07AB07	bisoprolol	BILOKORD	tableta	blister, 30 po 5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	134,80	10 mg	8,99	50,00		
1107040	C07AB07	bisoprolol	BILOKORD	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	244,70	10 mg	8,16	50,00		
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	128,30	37,5 mg	12,83	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107660	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	119,80	37,5 mg	12,84	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107661	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	28 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	205,10	37,5 mg	10,99	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107673	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 6,25 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	166,70	37,5 mg	35,72	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	119,80	37,5 mg	12,84	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	128,30	37,5 mg	12,83	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	219,70	37,5 mg	10,99	50,00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107024	C07BB07	bisoprolol, hidroflortiazid	TENSEC plus	film tableta	blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	175,10	1 tableta	5,84	50,00	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401531	C07BB07	bisoprolol, hidroflortiazid	BYOL plus	film tableta	blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	175,10	1 tableta	5,84	50,00	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1402860	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	47,40	5 mg	2,37	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402861	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	57,40	5 mg	1,44	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402140	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 20 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	47,40	5 mg	2,37	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402141	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	57,40	5 mg	1,44	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402146	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	47,40	5 mg	2,37	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402147	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 10 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	57,40	5 mg	1,44	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402850	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	47,40	5 mg	2,37	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402851	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 20 po 10 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	57,40	5 mg	1,44	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402862	C08CA01	amlodipin	MONODIPIN	tablete	blister, 20 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	47,40	5 mg	2,37	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402854	C08CA01	amlodipin	MONODIPIN	tablete	blister, 20 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	57,40	5 mg	1,44	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402956	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	71,10	5 mg	2,37	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402833	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	86,10	5 mg	1,44	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402852	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 5 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	71,10	5 mg	2,37	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402853	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 10 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	86,10	5 mg	1,44	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402000	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	47,40	5 mg	2,37	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402001	C08CA01	amlodipin	CARDIPINE	tableta	blister, 20 po 10 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	57,40	5 mg	1,44	50,00	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402481	C08CA05	nifedipin	NIFELAT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	157,20	30 mg	7,86	50,00		
1402703	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	64,20	0,24 g	12,84	50,00		
1402704	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL	film tableta	blister, 60 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	145,30	0,24 g	8,72	50,00		
1402721	C08DA01	verapamil	IZOPAMIL	film tableta	blister, 45 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	130,80	0,24 g	8,72	50,00		
1402120	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	64,20	0,24 g	12,84	50,00		
1402121	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 80 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	87,10	0,24 g	8,71	50,00		
1402250	C08DB01	diltiazem	CORTIAZEM RETARD	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 90 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	222,50	0,24 g	19,78	50,00		
1402203	C08DB01	diltiazem	DILTIAZEM ALKALOID	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 90 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	222,50	0,24 g	19,78	50,00		
1103632	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	bočica plastična, 40 po 12,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	71,50	50 mg	7,15	50,00		
1103630	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	124,40	50 mg	6,22	50,00		

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103631	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	bočica plastična, 40 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	248,90	50 mg	6,22	50,00		
1103220	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	124,40	50 mg	6,22	50,00		
1103222	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	40 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	248,90	50 mg	6,22	50,00		
1103571	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	112,00	10 mg	5,60	50,00		
1103572	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 20 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	224,00	10 mg	5,60	50,00		
1103870	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL	tableta	blister, 20 po 5 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	71,50	10 mg	7,15	50,00		
1103871	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	112,00	10 mg	5,60	50,00		
1103872	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	224,00	10 mg	5,60	50,00		
1103178	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	167,90	10 mg	5,60	50,00		
1103176	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	336,00	10 mg	5,60	50,00		
1103887	C09AA02	enalapril	ENATENS	tableta	blister, 20 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	112,00	10 mg	5,60	50,00		
1103888	C09AA02	enalapril	ENATENS	tableta	blister, 20 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	224,00	10 mg	5,60	50,00		
1103886	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL	tableta	strip, 20 po 10 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	112,00	10 mg	5,60	50,00		
1103885	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL	tableta	strip, 20 po 20 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	224,00	10 mg	5,60	50,00		
1103875	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL	tableta	20 po 5 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	71,50	10 mg	7,15	50,00		
1103876	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL	tableta	20 po 10 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	124,40	10 mg	6,22	50,00		
1103877	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL	tableta	20 po 20 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	248,90	10 mg	6,22	50,00		
1103565	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	124,40	10 mg	6,22	50,00		
1103566	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	248,90	10 mg	6,22	50,00		
1103567	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	186,60	10 mg	6,22	50,00		
1103568	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	373,30	10 mg	6,22	50,00		
1103071	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	102,20	2,5 mg	3,65	50,00		
1103072	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	177,80	2,5 mg	3,18	50,00		
1103080	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL PHARMAS	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	102,20	2,5 mg	3,65	50,00		
1103081	C09AA05	ramipril	RAMIPRIL PHARMAS	tableta	blister, 28 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	177,80	2,5 mg	3,18	50,00		
1103011	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	102,20	2,5 mg	3,65	50,00		
1103010	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blister, 28 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	177,80	2,5 mg	3,18	50,00		
1103024	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	109,50	2,5 mg	3,65	50,00		
1103018	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	190,60	2,5 mg	3,18	50,00		
1103722	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	28 po 2, 5 mg	Sanofi-Aventis S.P.A.	Italija	102,20	2,5 mg	3,65	50,00		
1103723	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	28 po 5 mg	Sanofi-Aventis S.P.A.	Italija	177,80	2,5 mg	3,18	50,00		
1103724	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	28 po 10 mg	Sanofi-Aventis S.P.A.	Italija	283,30	2,5 mg	2,53	50,00		
1103012	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 1,25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	118,90	2,5 mg	8,49	50,00		
1103013	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	102,20	2,5 mg	3,65	50,00		
1103083	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	177,80	2,5 mg	3,18	50,00		

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103082	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	283,30	2,5 mg	2,53	50,00		
1103251	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 28 po 1,25 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	118,90	2,5 mg	8,49	50,00		
1103255	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	102,20	2,5 mg	3,65	50,00		
1103259	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 28 po 5 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	177,80	2,5 mg	3,18	50,00		
1103263	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	283,30	2,5 mg	2,53	50,00		
1401502	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP H	tableta	blister, 20 po (10 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	184,20	1 tableta	9,21	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401500	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	PRILENAP HL	tableta	blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	154,40	1 tableta	7,72	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401504	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENATENS PLUS	tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	278,70	1 tableta	13,94	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401505	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENATENS PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	418,10	1 tableta	13,94	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401082	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	418,10	1 tableta	13,94	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401083	C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT	tableta	blister, 30 po (20 mg + 6 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	394,90	1 tableta	13,16	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401171	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	154,40	1 tableta	7,72	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401172	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	278,80	1 tableta	13,94	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401182	C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	418,10	1 tableta	13,94	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401922	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	231,50	1 tableta	7,72	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401923	C09BA03	lizinopril, hidrohlortiazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 25 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	463,00	1 tableta	15,43	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401131	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	AMPRIL HD	tableta	28 po (5 mg + 25 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	185,70	1 tableta	6,63	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401013	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TRITACE COMP	tableta	28 po (5 mg + 25 mg)	Sanofi-Aventis S.P.A.	Italija	185,70	1 tableta	6,63	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401012	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	TRITACE COMP LS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Sanofi-Aventis S.P.A.	Italija	152,50	1 tableta	5,45	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401908	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	VIVACE PLUS L	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	152,50	1 tableta	5,45	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401909	C09BA05	ramipril, hidrohlortiazid	VIVACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	185,70	1 tableta	6,63	50,00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1104510	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	91,90	30 mg	13,79	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104511	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	20 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	160,50	30 mg	12,04	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	128,70	30 mg	13,79	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	224,70	30 mg	12,04	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	368,60	30 mg	9,87	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	137,90	30 mg	13,79	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	240,70	30 mg	12,04	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	394,80	30 mg	9,87	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	267,50	30 mg	13,38	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	594,40	30 mg	14,86	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	267,50	30 mg	13,38	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104486	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	594,40	30 mg	14,86	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	451,80	20 mg	7,53	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	451,80	20 mg	7,53	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104601	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104600	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Slovenija	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104555	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104556	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104557	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	451,80	20 mg	7,53	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104790	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.683,60	20 mg	14,03	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104605	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104606	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104607	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	451,80	20 mg	7,53	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	396,20	10 mg	28,30	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	664,70	10 mg	23,74	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	1.095,20	10 mg	19,56	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	1.910,40	10 mg	17,06	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	712,30	10 mg	23,74	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.173,60	10 mg	19,56	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104720	C10AA07	rosuvastatin	ROVESTA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	664,70	10 mg	23,74	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104721	C10AA07	rosuvastatin	ROVESTA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.095,20	10 mg	19,56	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104722	C10AA07	rosuvastatin	ROVESTA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.910,40	10 mg	17,06	50,00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
1104470	C10AB08	ciprofibrat	LIPANOR	kapsula, tvrda	blister, 30 po 100 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	403,60	0,1 g	13,45	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijeta trigliceridi u krvi nisu manji od 4,6 mmol/l.
4157100	D01AC02	mikonazol	DAKTANOL	krem	tuba, 1 po 30 g 2%	Galenika a.d.	Republika Srbija	198,20	-	198,20	50,00		
4150023	D06AX01	fusidinska kiselina	STANICID	mast	tuba, 1 po 10 g (2%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	248,50	-	248,50	50,00		
4151050	D06BA01	sulfadiazin srebro	SANADERM	krem	tuba, 1 po 50 g 1%	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	197,30	-	197,30	50,00		
4152075	D07AA02	hidrokortizon (kortizol)	HYDROCORTISON	mast	tuba, 1 po 5 g 2,5%	Galenika a.d.	Republika Srbija	66,90	-	66,90	50,00		
4152192	D07AC04	fluocinolonacetonid	SINODERM	gel	tuba, 1 po 30 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	120,40	-	120,40	50,00		
4152190	D07AC04	fluocinolonacetonid	SINODERM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	78,80	-	78,80	50,00		
4152191	D07AC04	fluocinolonacetonid	SINODERM	mast	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	78,80	-	78,80	50,00		
4153220	D07CC02	fluocinolonacetonid, neomicin	SINODERM N	krem	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	107,20	-	107,20	50,00		
4153221	D07CC02	fluocinolonacetonid, neomicin	SINODERM N	mast	tuba, 1 po 15 g (0,25 mg/g + 3,3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	107,20	-	107,20	50,00		
4159350	D11AH02	pimekrolimus	ELIDEL	krem	tuba, 1 po 15 g (1%)	Novartis Pharma Produktions GmbH; Meda Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka; Nemačka	1.574,60	-	1.574,60	50,00	Atopijski dermatitis (L20).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
6137082	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	vagitorija	10 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	202,80	0,5 g	20,28	50,00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137225	G01AF04	mikonazol	GINO DAKTANOL	vagitorija	7 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	282,40	0,1 g	20,17	50,00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
2141136	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,25 mg/1 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	92,70	0,2 mg	7,42	50,00	1. Neoznačen pobačaj (O06); 2. Krvarenje posle porođaja (O72).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1135240	G03AA07	levonorgestrel, etinilestradiol	LEGRAVAN	film tableta	blister, 1 po 21 (0,15 mg + 0,03 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	150,80	0,75 tabl.	5,39	50,00	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048111	G03BA03	testosteron	ANDRIOL TESTOCAPS	kapsula, meka	blister, 30 po 40 mg	N.V. Organon	Holandija	624,40	0,12 g	62,44	50,00	1. Muški sterilitet (N46); 2. Organska polna nemoć - impotencija (N48.4); 3. Druge bolesti muških polnih organa (N50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili endokrinologa.
1048463	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 30 po 100 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	532,70	300 mg	53,27	50,00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobačaj (O20.0); 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1048462	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 14 po 200 mg	Laboratoires Besins International; Besins Manufacturing Belgium	Francuska; Belgija	532,70	300 mg	57,08	50,00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteći pobačaj (O20.0); 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiol	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	1 po 21 (11 belih + 10 smeđih)	Schering GmbH & Co. Produktions KG	Nemačka	248,80	0,75 tabl.	8,89	50,00	1. Primarna amenoreja (N91.0); 2. Sekundarna amenoreja (N91.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Schering AG	Francuska; Nemačka	2.185,40	0,1 g	87,42	50,00	Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0044308	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 30 i.j. (10 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	21.251,50	2 i.j.	1.416,77	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044309	H01AC01	somatropin	NORDITROPIN NORDILET	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 45 i.j. (15 mg/1,5 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	31.877,30	2 i.j.	1.416,77	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044242	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	8.664,10	2 i.j.	1.089,82	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044241	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	uložak, 5 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	43.320,50	2 i.j.	1.089,82	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rastenju (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044243	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	19.616,70	2 i.j.	1.089,82	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteњу (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044244	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	uložak, 5 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	98.083,80	2 i.j.	1.089,82	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteњу (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044239	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	11.263,30	2 i.j.	1.416,77	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteњу (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044236	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	25.501,70	2 i.j.	1.416,76	50,00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionna terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam)(E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteњу (P05.1), 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
7045080	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	sprej za nos, rastvor	bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	3.649,30	25 mcg	182,47	50,00		
1045081	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	tableta	bočica plastična, 30 po 0,2 mg	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	3.582,40	0,4 mg	238,83	50,00		
1047143	H02AB02	deksametazon	DEXASON	tableta	blistar, 50 po 0,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	307,60	1,5 mg	18,46	50,00		
1047180	H02AB04	metilprednizolon	NIRYPAN	tableta	blistar, 20 po 8 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	392,00	7,5 mg	18,38	50,00		
1047632	H02AB07	prednizon	PRONISON	tableta	20 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	281,80	10 mg	7,05	50,00		
1047511	H02AB07	prednizon	PREDNIZON	tableta	blistar, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	55,90	10 mg	11,18	50,00		
1040050	H03AA01	levotiroksin natrijum	TIVORAL	tableta	blistar, 50 po 100 mcg	Galenika a.d.	Republika Srbija	152,10	150 mcg	4,56	50,00		
1040230	H03AA01	levotiroksin natrijum	EUTHYROX	tableta	50 po 25 mcg	Merck KGaA	Nemačka	96,10	150 mcg	11,53	50,00		
1040190	H03BA02	propiltiouracil	PTUJ	tableta	20 po 50 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	134,40	0,1 g	13,44	50,00		

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1040192	H03BA02	propiltiouracil	PTU	tableta	45 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	651,50	0,1 g	14,48	50,00		
1040120	H03BB02	tiamazol	TIASTAT	tableta	20 po 20 mg	Bosnaliyek d.d.	Bosna i Hercegovina	142,20	10 mg	3,56	50,00		
0341340	H04AA01	glukagon	GLUCAGEN HYPOKIT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 1 mg/1 ml	Novo Nordisk A/S	Danska	1.626,60	1 mg	1.626,60	50,00		
1022510	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	kapsula	5 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	69,80	0,1 g	13,96	50,00		
1022515	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	69,80	0,1 g	13,96	50,00		
1021145	J01CA04	amoksisicilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	96,80	1 g	24,20	50,00		
1021148	J01CA04	amoksisicilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	124,70	1 g	15,59	50,00		
3021146	J01CA04	amoksisicilin	SINACILIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica od tamnog stakla, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	123,80	1 g	24,76	50,00		
1021961	J01CA04	amoksisicilin	AMOKSICILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	96,80	1 g	24,20	50,00		
1021965	J01CA04	amoksisicilin	AMOKSICILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	124,70	1 g	15,59	50,00		
1021007	J01CA04	amoksisicilin	OSPAMOX DT	tableta za oralnu suspenziju	14 po 1000 mg	Sandoz GmbH	Austrija	240,40	1 g	17,17	50,00		
3021001	J01CA04	amoksisicilin	OSPAMOX	prašak za oralnu suspenziju	1 po 60 ml (500 mg/5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	121,70	1 g	20,28	50,00		
1021008	J01CA04	amoksisicilin	OSPAMOX DT	tableta za oralnu suspenziju	14 po 500 mg	Sandoz GmbH	Austrija	107,60	1 g	15,37	50,00		
3020185	J01CE02	fenoksimetilpenicilin	CLIACIL	prašak za sirup	bočica, 1 po 150 ml (60000 i.j./ml)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	263,90	3000000 i.j.	87,97	50,00		
1020183	J01CE02	fenoksimetilpenicilin	CLIACIL	tableta	blister, 20 po 600000 i.j.	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	163,00	3000000 i.j.	40,75	50,00		
1020184	J01CE02	fenoksimetilpenicilin	CLIACIL	tableta	blister, 20 po 1200000 i.j.	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	394,00	3000000 i.j.	49,25	50,00		
3021602	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	269,90	1 g	107,96	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021606	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	448,80	1 g	89,76	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021608	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	332,10	1 g	59,30	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021609	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	664,20	1 g	59,30	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3021568	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg)/5 ml	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	332,10	1 g	59,30	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3321875	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	prašak za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	173,20	2 g	69,28	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1321870	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blister, 16 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	135,80	2 g	67,90	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1321872	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	253,20	2 g	63,30	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
3321719	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	granule za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	173,20	2 g	69,28	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
1321710	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	135,80	2 g	67,90	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1321711	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	253,20	2 g	63,30	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
3321644	J01DC02	cefuroksim	XORIMAX	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (125 mg/5 ml), 32,90 g	Sandoz GmbH	Austrija	347,30	0,5 g	99,23	50,00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3321951	J01DC10	cefprozil monohidrat	CEFZIL	granule za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)	Corden Pharma Latina S.P.A.	Italija	780,60	1 g	260,20	50,00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja (osim indikacije pod tačkom 4.) što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3321621	J01DD08	cefksim	PANCEF	prašak za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	916,50	0,4 g	183,30	50,00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3321623	J01DD08	cefksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	549,90	0,4 g	183,30	50,00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3321525	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	prašak za oralnu suspenziju	bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	520,40	0,4 g	260,20	50,00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3026210	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM	sinup	bočica, 1 po 100 ml (200 mg + 40 mg)/5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	144,90	1,92 g	57,96	50,00		
1026211	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM	tableta	blister, 20 po (400 mg + 80 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	158,60	1,92 g	31,72	50,00		
1325152	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	film tableta	blister, 20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225,50	1 g	45,10	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1325153	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	tableta	20 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	372,50	1 g	37,25	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1325550	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	film tableta	blister, 16 po 250 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	180,40	1 g	45,10	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
1325551	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	film tableta	blister, 16 po 500 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	298,00	1 g	37,25	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
3325552	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	granule za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	377,30	1 g	150,92	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3325553	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN	granule za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	631,60	1 g	126,32	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2). 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325095	J01FA03	midekamicin	MACROPEN	film tableta	blister, 16 po 400 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	240,80	1 g	37,63	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta.
3325096	J01FA03	midekamicin	MACROPEN	granule za oralnu suspenziju	bočica,115 ml po 175 mg/5 ml	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	391,60	1 g	97,29	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42). 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5). 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34). 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na poledini recepta. Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poledini recepta.
3325483	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	125,80	0,3 g	94,35	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
3325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225,60	0,3 g	56,40	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
3325570	J01FA10	azitromicin	AZITROMICIN SANDOZ	prašak za oralnu suspenziju	bočica plastična, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)	Sandoz S.R.L.	Rumunija	125,80	0,3 g	94,35	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325471	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 125	film tableta	blister, 6 po 125 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	367,80	0,3 g	147,12	50,00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1329450	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	tableta	10 po 250 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	157,60	1 g	63,04	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329452	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	tableta	10 po 500 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	285,70	1 g	57,14	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329451	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	tableta	20 po 250 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	315,20	1 g	63,04	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329453	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	tableta	20 po 500 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	571,30	1 g	57,13	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329190	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROCINAL	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	157,60	1 g	63,04	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329192	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROCINAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	285,70	1 g	57,14	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329410	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	157,60	1 g	63,04	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329411	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	285,70	1 g	57,14	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329808	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Srbolek a.d.	Republika Srbija	157,60	1 g	63,04	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329809	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Srbolek a.d.	Republika Srbija	285,70	1 g	57,14	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329400	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	157,60	1 g	63,04	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329401	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	285,70	1 g	57,14	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329511	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	157,60	1 g	63,04	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329510	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	285,70	1 g	57,14	50,00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1132350	J01MA06	norfloksacin	URICIN	film tableta	bočica plastična, 20 po 400 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	438,60	0,8 g	43,86	50,00		
1327130	J02AB02	ketokonazol	MYCOSEB	tableta	20 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	513,10	0,2 g	25,66	50,00		
1025859	J04AB02	rifampicin	RIFAMOR	kapsula, tvrda	blister, 16 po 300 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	339,90	0,6 g	42,49	50,00		
1328230	J05AB01	aciklovir	ACIKLOVIR	tableta	blister, 25 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	672,50	4 g	538,00	50,00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94). 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja dermatologa i oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa.
1328372	J05AE01	sakvinavir	INVIRASE	film tableta	120 po 500 mg	Roche Pharma S.A.; F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	30.124,50	1,8 g	903,74	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328621	J05AE...	lopinavir, ritonavir	ALUVIA	film tableta	bočica, 120 po (200 mg + 50 mg)	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	7.322,10	-	-	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328622	J05AE...	lopinavir, ritonavir	ALUVIA	film tableta	bočica, 60 po (100 mg + 25 mg)	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	3.689,00	-	-	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328617	J05AE03	ritonavir	NORVIR	film tableta	boca, 30 po 100 mg	Abbvie Deutschland GMBH & Co. KG	Nemačka	2.499,90	1,2 g	999,96	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328120	J05AE07	fosamprenavir	TELZIR	film tableta	bočica plastična, 60 po 700 mg	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	32.202,50	1,4 g	1.073,42	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328612	J05AE10	darunavir	PREZISTA	film tableta	boca, 60 po 600 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	68.573,10	1,2 g	2.285,77	50,00	HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328411	J05AF01	zidovudin	ZIDOSAN	kapsula, tvrda	bočica plastična, 100 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	7.766,10	0,6 g	465,97	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328505	J05AF02	didanozin	VIDEX EC	kapsula	30 po 400 mg	Bristol Myers-Squibb S.R.L.	Italija	16.521,20	0,4 g	550,71	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328512	J05AF04	stavudin	ZERIT	kapsula	56 po 30 mg	Bristol Myers-Squibb	Švajcarska	12.884,40	80 mg	613,54	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328376	J05AF05	lamivudin	ZEFFIX	film tableta	28 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	5.741,40	0,3 g	615,15	50,00	1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni). 2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1), hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6) 3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima - svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg ⁻ : hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml serumu) c) bihemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na Zeffix	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
1328375	J05AF05	lamivudin	EPIVIR	film tableta	bočica plastična, 60 po 150 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	10.199,50	0,3 g	339,98	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328530	J05AF06	abakavir	ZIAGEN	film tableta	blister, 60 po 300 mg	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	23.481,10	0,6 g	782,04	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328500	J05AF07	tenofovir	VIREAD	film tableta	boca, 30 po 245 mg	Gilead Sciences Ltd.	Irska	29.850,47	0,245 g	995,02	50,00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
3328381	J05AG01	nevirapin	VIRAMUNE	oralna suspenzija	bočica, 1 po 240 ml (50 mg/5 ml)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1.696,50	0,4 g	282,75	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328380	J05AG01	nevirapin	VIRAMUNE	tableta	blister, 60 po 200 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3.461,80	0,4 g	115,39	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328393	J05AG03	efavirenz	STOCRIN	film tableta	bočica plastična, 30 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	30.070,00	600 mg	1.002,33	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328640	J05AR01	zidovudin, lamivudin	COMBIVIR	film tableta	blister, 60 po (300 mg + 150 mg)	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	20.758,30	2 tablete	691,94	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328601	J05AR02	abakavir, lamivudin	KIVEXA	film tableta	blister, 30 po (600 mg + 300 mg)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	33.818,10	1 tableta	1.127,27	50,00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328660	J05AX08	raltegravir	ISENRESS	film tableta	bočica, 60 po 400 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	63.270,40	0,8 g	2.109,01	50,00	HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1328657	J05AX09	maravirok	CELESENTRI	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	71.448,10	0,6 g	4.763,21	50,00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328656	J05AX09	maravirok	CELSENTRI	film tableta	blister, 60 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	71.448,10	0,6 g	2.381,60	50,00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani trojizam virusa za CCR5 koreceptor (B20, B21, B22, B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Kliničkog centra Kragujevac.
1030223	L01CB01	etopozid	LASTET CAP.25	kapsula	blister, 40 po 25 mg	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	11.361,80	-	-	50,00		
1030222	L01CB01	etopozid	LASTET CAP.50	kapsula	blister, 20 po 50 mg	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	9.425,30	-	-	50,00		
1030221	L01CB01	etopozid	LASTET CAP.100	kapsula	blister, 10 po 100 mg	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	11.361,80	-	-	50,00		
1039285	L01XX05	hidroksikarbamid	LITALIR ◊	kapsula	bočica, 100 po 500 mg	Corden Pharma Latina S.P.A	Italija	2.966,90	-	-	50,00	Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetska dečja klinika, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, KC Kragujevac, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.
1039284	L01XX05	hidroksikarbamid	HIDROKSIKARBAMID ◊	kapsula, tvrda	blister, 100 po 500 mg	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpraparate M.B.H	Nemačka	1.928,20	-	-	50,00	Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetska dečja klinika, Klinika za hematologiju KC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, KC Kragujevac, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti KC Niš.
1031043	L01XX11	estramustin	ESTRACYT ◊	kapsula	100 po 140 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	11.598,80	-	-	50,00	Karcinom prostate, hormon refraktorni, u slučaju kontraindikacija za primenu docetaksela, PS 0, 1 ili 2.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za urologiju KC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za urologiju KC Vojvodine, Klinika za onkologiju KC Niš, KC Kragujevac.
3048912	L02AB01	megestrol	MEGACE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	Bristol Myers-Squibb	Francuska	5.584,70	160 mg	93,08	50,00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1048913	L02AB01	megestrol	MEGACE	tableta	bočica, 30 po 160 mg	Bristol Myers-Squibb	Francuska	4.336,60	160 mg	144,55	50,00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
3048951	L02AB01	megestrol	MEGOXI	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5.584,70	160 mg	93,08	50,00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1039010	L02BA01	tamoksifen	NOLVADEX	film tableta	blister, 30 po 10 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	226,70	20 mg	15,11	50,00		
1039395	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN	tableta	30 po 10 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	226,70	20 mg	15,11	50,00		
1039396	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN	tableta	30 po 20 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	482,70	20 mg	16,09	50,00		
1037076	L02BB03	bikalutamid	BICADEX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.096,00	50 mg	74,86	50,00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1037350	L02BB03	bikalutamid	BIKALUTAMID PLIVA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	2.096,00	50 mg	74,86	50,00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1039325	L02BG03	anastrozol	ARIMI/DEX	film tableta	28 po 1 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	1.426,40	1 mg	50,94	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrija dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039326	L02BG03	anastrozol	TRASOLETTE	film tableta	blister, 28 po 1 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.426,40	1 mg	50,94	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039720	L02BG03	anastrozol	AREMED	film tableta	blister, 28 po 1 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	1.426,40	1 mg	50,94	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039328	L02BG03	anastrozol	ANASTROZOLE MEDICO UNO	film tableta	blister, 28 po 1 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	1.426,40	1 mg	50,94	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemoterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039331	L02BG04	letrozol	FEMOZOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o	Republika Srbija	1.698,00	2,5 mg	56,60	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemoterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039333	L02BG04	letrozol	LETROZOLE MEDICO UNO	film tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	1.584,80	2,5 mg	56,60	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i bilioske terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039390	L02BG06	eksemestan	AROMASIN	tableta	30 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	1.886,80	25 mg	62,89	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039391	L02BG06	eksemestan	EXEMESTANE ALVOGEN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Eirgen Pharma Ltd.	Irska	1.886,80	25 mg	62,89	50,00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014081	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	kapsula	blister, 300 po 250 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	14.968,40	2 g	399,16	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014083	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	film tableta	blister, 150 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	17.447,70	2 g	465,27	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014094	L04AA06	mikofenolna kiselina	MICOLAT	kapsula, tvrda	blister, 300 po 250 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	8.836,50	2 g	235,64	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014111	L04AA06	mikofenolna kiselina	MOFETAN	kapsula, tvrda	blister, 30 po 250 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	883,60	2 g	235,63	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014110	L04AA06	mikofenolna kiselina	MOFETAN	film tableta	blister, 150 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	11.308,70	2 g	301,57	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014260	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 180 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	12.912,80	2 g	860,85	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014261	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 360 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	25.807,80	2 g	860,26	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014270	L04AA10	sirolimus	RAPAMUNE	obložena tableta	blister, 30 po 1 mg	Wyeth Pharmaceuticals; Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Velika Britanija; Irska	11.480,60	3 mg	1.148,06	50,00	Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom kalena, kod pojave izražene fibroze dokazane na biopćičkom materijalu ili ehosonografski, sa ciljem uspostorenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014051	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,25 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	9.946,10	1,5 mg	994,61	50,00	Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014052	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	18.313,20	1,5 mg	915,66	50,00	Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014990	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	3.740,90	0,25 g	748,18	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014992	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	7.201,20	0,25 g	720,12	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014991	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	13.441,10	0,25 g	672,06	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014999	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	oralni rastvor	boćica, 1 po 50 ml (100 mg/1 ml)	Novartis Pharma GMBH	Nemaćka	13.042,10	0,25 g	652,11	50,00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za najteže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014255	L04AD02	takrolimus	PANALIMUS	kapsula, tvrda	blister, 60 po 0,5 mg	Panacea Biotec Ltd.	Indija	1.260,00	5 mg	210,00	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lećenja odbacivanja alogenh transplantaata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014256	L04AD02	takrolimus	PANALIMUS	kapsula, tvrda	blister, 60 po 1 mg	Panacea Biotech Ltd.	Indija	2.450,00	5 mg	204,17	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014257	L04AD02	takrolimus	PANALIMUS	kapsula, tvrda	blister, 100 po 5 mg	Panacea Biotech Ltd.	Indija	45.593,90	5 mg	455,94	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014250	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	60 po 1 mg	Astellas	Irska	5.901,00	5 mg	491,75	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014251	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 5 mg	Astellas	Irska	13.678,10	5 mg	455,94	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014252	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 0,5 mg	Astellas	Irska	1.610,40	5 mg	536,80	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014240	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	2.300,50	5 mg	766,83	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014242	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 1 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	4.215,00	5 mg	702,50	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014245	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 3 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	13.340,80	5 mg	741,16	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014247	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	19.540,20	5 mg	651,34	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014244	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 1 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	8.430,00	5 mg	702,50	50,00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014020	L04AX01	azatioprin	IMURAN	film tableta	100 po 50 mg	Excelsa GmbH	Nemačka	1.926,40	0,15 g	57,79	50,00		
1034330	L04AX03	metotreksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 2,5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	701,30	2,5 mg	14,03	50,00		
1034331	L04AX03	metotreksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	kontejner za tablete, 50 po 5 mg	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1.250,10	2,5 mg	12,50	50,00		
3162033	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	sirup	plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	205,30	1,2 g	123,18	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162533	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	sirup	bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	171,10	1,2 g	102,66	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3162325	M01AE01	ibuprofen	IBALGIN BABY	oralna suspenzija	bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Zentiva K.S.	Češka	171,10	1,2 g	102,66	50,00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1165122	M03BX02	tizanidin	SIRDALUD	tableta	blister, 30 po 4 mg	Novartis Uruntleri	Turska	589,50	12 mg	58,95	50,00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
1168089	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL	tableta	blister, 40 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	107,70	0,4 g	10,77	50,00		
3087306	N02AA01	morfin-hidroklorid	MORPHIN MERCK 2%	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 50 ml (2%)	Merck KGaA	Nemačka	1.408,30	0,1 g	140,83	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
3087302	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralni rastvor	kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (10 mg/5 ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	1.222,70	0,1 g	611,35	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
3087303	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralni rastvor	kontejner jednodozni, 20 po 5 ml (30 mg/5 ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	1.222,70	0,1 g	203,78	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
3087301	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	551,50	0,1 g	137,88	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
3087304	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	sirup	boca staklena, 1 po 100 ml (10 mg/5ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	310,40	0,1 g	155,20	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087711	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 8 mg	Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	2.585,20	20 mg	461,64	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087710	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	14 po 16 mg	Pharmaceutica N.V.; Janssen-Cilag S.P.A	Belgija; Italija	4.552,60	20 mg	406,48	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087715	N02AA03	hidromorfon	JURNISTA	tableta sa produženim oslobađanjem	28 po 32 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	17.236,30	20 mg	384,74	50,00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	689,20	1,2 mg	39,38	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.378,40	1,2 mg	39,38	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.399,70	1,2 mg	45,71	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.309,80	1,2 mg	33,00	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu - i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina - i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087805	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transedermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5 cm²)	Hexal AG	Nemačka	683,20	1,2 mg	28,37	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu - i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina - i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087808	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transedermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 11,56 mg/21 cm ²)	Hexal AG	Nemačka	1.366,30	1,2 mg	28,37	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu - i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina - i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid druge linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrene funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087802	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transedermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 23,12 mg/42 cm ²)	Hexal AG	Nemačka	2.289,60	1,2 mg	23,77	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu - i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid druge linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina - i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid druge linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrene funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF	Island	683,20	1,2 mg	39,75	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu - i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina - i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm ²)	Actavis Group PTC EHF	Island	1.366,30	1,2 mg	39,75	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu - i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina - i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm ²)	Actavis Group PTC EHF	Island	2.318,00	1,2 mg	44,96	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu - i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina - i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm ²)	Actavis Group PTC EHF	Island	2.289,60	1,2 mg	33,30	50,00	Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu - i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina - i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboja bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
1087530	N02AX02	tramadol	TRODON	kapsula, tvrda	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	172,10	0,3 g	51,63	50,00		
1087650	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	307,00	0,3 g	46,05	50,00		
1087651	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 150 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	495,10	0,3 g	49,51	50,00		
1087700	N02AX02	tramadol	TRAMAFASH	oralna disperzibilna tableta	blister, 20 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	172,10	0,3 g	51,63	50,00		
1087553	N02AX02	tramadol	TRODON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	153,50	0,3 g	46,05	50,00		
1087550	N02AX02	tramadol	TRODON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	307,10	0,3 g	46,07	50,00		
3086595	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL	sirup	bočica, 1 po 100 ml (120 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	150,00	3 g	187,50	50,00		Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3086742	N02BE01	paracetamol	PANATERM	sirup	bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)	Sopharma PLC	Bugarska	150,00	3 g	150,00	50,00		Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1084210	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	71,00	0,1 g	15,78	50,00		
1084521	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	158,10	0,1 g	5,27	50,00		
3084513	N03AD01	etosuksimid	SUXINUTIN	sirup	bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)	Famar Orleans	Francuska	356,70	1,25 g	44,59	50,00	Epilepsija (G40-G41).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1084402	N03AE01	klonazepam	RIVOTRIL	tableta	fiola, 30 po 2 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	93,80	8 mg	12,51	50,00		
1084403	N03AE01	klonazepam	RIVOTRIL	tableta	bočica, 50 po 0,5 mg	Roche Farma S.A.; F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Španija; Švajcarska	158,70	8 mg	50,78	50,00		
1084255	N03AE01	klonazepam	KLONAZEPAM	tableta	blister, 30 po 2 mg	Remedica Ltd.	Kipar	93,80	8 mg	12,51	50,00		
1084070	N03AF01	karbamazepin	GALEPSIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	257,10	1 g	25,71	50,00		
1084060	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	257,10	1 g	25,71	50,00		
3084532	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	oralna suspenzija	1 po 250 ml (2 g/100 ml)	Novartis Pharma S.A.S.	Francuska	388,80	1 g	77,76	50,00		Samo za decu.
1084530	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 400 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	454,60	1 g	37,88	50,00		
1084351	N03AF01	karbamazepin	CARBAMAZEPINE-RETARD	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 400 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	454,60	1 g	37,88	50,00		
3084501	N03AG01	natrijum valproat	EFTIL	sirup	bočica, 1 po 150 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Unither Liquid Manufacturing	Republika Srbija; Francuska	376,30	1,5 g	75,26	50,00		
1084500	N03AG01	natrijum valproat, valproinska kiselina	EFTIL	tableta sa produženim oslobađanjem	fiola, 30 po (333 mg + 145 mg)	Hemofarm a.d. u saradnji sa Sanofi Winthrop Industrie, Francuska; Sanofi Winthrop Industrie	Republika Srbija; Francuska	330,80	1,5 g	34,60	50,00		
1084817	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	VALPROIX	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (145 mg + 333 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	330,80	1,5 g	34,60	50,00		
1084780	N03AX09	lamotrigin	LAMECT	tableta	blister, 30 po 25 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	135,20	0,3 g	54,08	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084781	N03AX09	lamotrigin	LAMECT	tableta	blister, 30 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	288,90	0,3 g	57,78	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084782	N03AX09	lamotrigin	LAMECT	tableta	blister, 30 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	532,80	0,3 g	53,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084550	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Pojlska	135,20	0,3 g	54,08	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084551	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Pojlska	288,90	0,3 g	57,78	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084552	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Pojlska	532,80	0,3 g	53,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084827	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	135,20	0,3 g	54,08	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084826	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	288,90	0,3 g	57,78	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084825	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	532,80	0,3 g	53,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084080	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	135,20	0,3 g	54,08	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084081	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	288,90	0,3 g	57,78	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084082	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	532,80	0,3 g	53,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084083	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 200 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	1.730,50	0,3 g	86,53	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084126	N03AX09	lamotrigin	EPITRIGINE	tableta	30 po 25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	135,20	0,3 g	54,08	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084127	N03AX09	lamotrigin	EPITRIGINE	tableta	30 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	288,90	0,3 g	57,78	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084125	N03AX09	lamotrigin	EPITRIGINE	tableta	30 po 100 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	532,80	0,3 g	53,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084121	N03AX09	lamotrigin	EPITRIGINE	oralna disperzibilna tableta	30 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	103,20	0,3 g	516,00	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084123	N03AX09	lamotrigin	EPITRIGINE	oralna disperzibilna tableta	30 po 5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	87,10	0,3 g	174,20	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084122	N03AX09	lamotrigin	EPITRIGINE	oralna disperzibilna tableta	30 po 25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	135,20	0,3 g	54,08	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084124	N03AX09	lamotrigin	EPITRIGINE	oralna disperzibilna tableta	30 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	288,90	0,3 g	57,78	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084120	N03AX09	lamotrigin	EPITRIGINE	oralna disperzibilna tableta	30 po 100 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	532,80	0,3 g	53,28	50,00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084700	N03AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Cilag AG	Švajcarska	306,50	0,3 g	131,36	50,00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084701	N03AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Cilag AG	Švajcarska	620,40	0,3 g	132,94	50,00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084702	N03AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Cilag AG	Švajcarska	1.226,00	0,3 g	131,36	50,00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084716	N03AX11	topiramet	TIRAMAT	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	562,70	0,3 g	112,54	50,00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084717	N03AX11	topiramet	TIRAMAT	film tableta	blister, 60 po 50 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	1.329,40	0,3 g	132,94	50,00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084715	N03AX11	topiramet	TIRAMAT	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	2.627,20	0,3 g	131,36	50,00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	721,80	1,8 g	86,62	50,00	Epilepsija (G40).	
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	721,80	1,8 g	86,62	50,00	Epilepsija (G40).	

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084821	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 250 mg	UCB Pharma SA	Belgija	710,10	1,5 g	71,01	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1. 2. 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084820	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 500 mg	UCB Pharma SA	Belgija	1.299,50	1,5 g	64,98	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1. 2. 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084822	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	UCB Pharma SA	Belgija	2.512,80	1,5 g	62,82	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1. 2. 3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3084823	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)	Nextpharma SAS	Francuska	6.241,50	1,5 g	312,08	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084831	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 250 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	710,10	1,5 g	71,01	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084832	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.299,50	1,5 g	64,98	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084833	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.512,80	1,5 g	62,82	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084834	N03AX14	levetiracetam	TINALVO	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	710,10	1,5 g	71,01	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084835	N03AX14	levetiracetam	TINALVO	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	1.299,50	1,5 g	64,98	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084836	N03AX14	levetiracetam	TINALVO	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	2.512,80	1,5 g	62,82	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084516	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 750 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	3.509,50	1,5 g	116,98	50,00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refraktnim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3. i 4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.095,50	0,3 g	149,68	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	3.151,20	0,3 g	112,54	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	6.302,40	0,3 g	112,54	50,00	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1085320	N04AA02	bipenden	MENDILEX	tableta	blister, 50 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	169,80	10 mg	16,98	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra.
1085212	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	tableta	boca staklena, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	Galenika a.d., Srbija u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Srbija	2.125,70	0,6 g	63,77	50,00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085307	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR ROCHE	tableta	bočica, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	2.125,70	0,6 g	63,77	50,00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085302	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR HBS	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	bočica, 30 po (100 mg + 25 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	345,00	0,6 g	69,00	50,00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085350	N04BB01	amantadin sulfat	PK MERZ	tableta	30 po 100 mg	Merz Pharmaceuticals GmbH	Nemačka	440,70	0,2 g	29,38	50,00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1149040	N04BC01	bromokriptin	BROMOKRIPTIN	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	274,80	40 mg	146,56	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili endokrinologa.
1070056	N05AA01	hlorpromazin	LARGACTIL	film tableta	plastična fiola, 50 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	97,70	300 mg	23,45	50,00		
1070850	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	112,60	10 mg	45,04	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070851	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	348,20	10 mg	27,86	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070841	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	465,70	8 mg	12,42	50,00		
1070840	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	plastična bočica, 25 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	229,50	8 mg	36,72	50,00		
1070800	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	blister, 25 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	229,50	8 mg	36,72	50,00		
1070801	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	465,70	8 mg	12,42	50,00		
1070018	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	852,60	10 mg	56,84	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070017	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.705,40	10 mg	56,85	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070087	N05AH03	olanzapin	TREANA D	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	795,80	10 mg	56,84	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070088	N05AH03	olanzapin	TREANA D	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.591,70	10 mg	56,85	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070027	N05AH03	olanzapin	SIZAP	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	852,60	10 mg	56,84	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070028	N05AH03	olanzapin	SIZAP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	1.705,40	10 mg	56,85	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070025	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	795,80	10 mg	56,84	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070023	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	1.591,70	10 mg	56,85	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070024	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 15 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	2.652,80	10 mg	63,16	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070015	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	795,80	10 mg	56,84	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070016	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	1.591,70	10 mg	56,85	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070979	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 5 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	795,80	10 mg	56,84	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070978	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 7,5 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	1.326,40	10 mg	63,16	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070975	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 10 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	1.591,70	10 mg	56,85	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070976	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 15 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	2.652,80	10 mg	63,16	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070977	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	3.537,00	10 mg	63,16	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070093	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	852,60	10 mg	56,84	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070092	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	1.705,40	10 mg	56,85	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070920	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	159,20	5 mg	39,80	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070921	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	257,90	5 mg	32,24	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070922	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	429,80	5 mg	35,82	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070923	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	707,40	5 mg	44,21	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070034	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	159,20	5 mg	39,80	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070035	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	257,90	5 mg	32,24	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070036	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	429,80	5 mg	35,82	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070037	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	707,40	5 mg	44,21	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070063	N05AX08	risperidon	TORENDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	257,90	5 mg	32,24	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070066	N05AX08	risperidon	TORENDON	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	429,80	5 mg	35,82	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070935	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	159,20	5 mg	39,80	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070928	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	257,90	5 mg	32,24	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070929	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	429,80	5 mg	35,82	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070004	N05AX08	risperidon	SPERIDAN	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	159,20	5 mg	39,80	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070001	N05AX08	risperidon	SPERIDAN	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	257,90	5 mg	32,24	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070002	N05AX08	risperidon	SPERIDAN	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	429,80	5 mg	35,82	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070003	N05AX08	risperidon	SPERIDAN	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	707,40	5 mg	44,21	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070670	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	257,90	5 mg	32,24	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31), 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	rastvor za oralnu upotrebu	boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.667,30	5 mg	133,37	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9), 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79), 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1), 6. Poremećaji ponašanja (F91).	Za indicaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Za indicaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza“ posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
2070936	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 30 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.235,80	5 mg	205,97	50,00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9), 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79), 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1), 6. Poremećaji ponašanja (F91).	Za indicaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Za indicaciju pod tačkom 3, 4, 5. i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza“ posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
N002592	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	rastvor za rektalnu primenu	5 po 5 mg/2,5 ml	Apoteka-galenska laboratorija	Republika Srbija	452,50	10 mg	181,00	50,00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071121	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	96,80	10 mg	6,45	50,00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071122	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	145,10	10 mg	4,84	50,00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071701	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	96,80	10 mg	6,45	50,00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071702	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	145,10	10 mg	4,84	50,00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071786	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	tableta	blister, 30 po 5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	96,80	10 mg	6,45	50,00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1072762	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE	film tableta	blister, 100 po 10 mg	Remedica Ltd.	Kipar	194,40	75 mg	14,58	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072763	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLINE	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	90,30	75 mg	9,03	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072730	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	127,90	0,1 g	17,05	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072731	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	272,80	0,1 g	18,19	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072700	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	kapsula, tvrda	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	357,40	20 mg	11,91	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indicaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indicaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072930	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	357,40	20 mg	11,91	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42), 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indicaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indicaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072062	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	119,10	20 mg	11,91	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072061	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	238,30	20 mg	11,92	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072067	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	297,90	20 mg	11,92	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072060	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	595,70	20 mg	11,91	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072915	N06AB05	paroksetin	ACTAPAX	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	225,20	20 mg	7,51	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072916	N06AB05	paroksetin	ACTAPAX	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	536,30	20 mg	11,92	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072907	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	225,20	20 mg	7,51	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072909	N06AB05	paroksetin	PAROKSETIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 30 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	536,30	20 mg	11,92	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072790	N06AB06	sertralín	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L	Italija	170,20	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072791	N06AB06	sertralín	ZOLOFT	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Haupt Pharma Latina S.R.L	Italija	340,40	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072851	N06AB06	sertralín	SETALOFT	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	170,20	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072850	N06AB06	sertralín	SETALOFT	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	340,40	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072724	N06AB06	sertralín	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	170,20	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072723	N06AB06	sertralín	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	340,40	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072644	N06AB06	sertralín	TRAGAL	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	170,20	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072643	N06AB06	sertralín	TRAGAL	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	340,40	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072635	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	170,20	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072636	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	340,40	50 mg	6,08	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072627	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	166,90	10 mg	11,92	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072625	N06AB10	escitalopram	LATA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	233,60	10 mg	8,34	50,00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno-kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1073190	N06BA04	metifenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica, 30 po 18 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3.362,30	30 mg	186,79	50,00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. dr. C.Brajiović" - Beograd, 4. Klinički centar Vojvodine, 5. Klinički centar Niš, 6. Klinički centar Kragujevac.
1073191	N06BA04	metifenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica, 30 po 36 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	4.019,40	30 mg	111,65	50,00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja dečijeg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili dečijeg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju " Prof. dr. C.Brajiović" - Beograd, 4. Klinički centar Vojvodine, 5. Klinički centar Niš, 6. Klinički centar Kragujevac.
1088055	N07AA02	piridostigmin	MESTINON	obložena tableta	bočica, 150 po 60 mg	ICN Polfa Rzeszow S.A.; Legacy Pharmaceuticals Switzerland GmbH	Poljska; Švajcarska	3.196,40	0,18 g	63,93	50,00		
1075091	N07BB01	disulfiram	ESPERAL	tableta	20 po 500 mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Portugalija; Mađarska	151,30	0,2 g	3,03	50,00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
2087310	N07BC02	metadon	METADON	kapi	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	144,30	25 mg	36,08	50,00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Snižavanje snažnog bola (bola uzrokovanoj karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2087505	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	144,30	25 mg	36,08	50,00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087510	N07BC02	metadon	METADON MOLTENI	oralni rastvor	bočica plastična, 1 po 20 ml (1 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	26,50	25 mg	33,13	50,00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087515	N07BC02	metadon	METADON MOLTENI	oralni rastvor	bočica plastična, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Societa Di Esercizio S.P.A.	Italija	132,70	25 mg	33,18	50,00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1029080	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	tableta	20 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	124,00	2 g	49,60	50,00	1. Infekcije trihomonasom (A59), 2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05), 3. Amebiasia (A06), 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29).	
1029082	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	tableta	20 po 400 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	208,20	2 g	52,05	50,00	1. Infekcije trihomonasom (A59), 2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05), 3. Amebiasia (A06), 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29).	
1029083	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL D	tableta	20 po 400 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	208,20	2 g	52,05	50,00	1. Infekcije trihomonasom (A59), 2. Infekcije usta (peri i paradentalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05), 3. Amebiasia (A06), 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29).	
3028300	P02CA01	mebendazol	SOLTRIK	oralna suspenzija	bočica, 1 po 30 ml (100 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	129,10	0,2 g	43,03	50,00		
7110311	R01AD09	mometazon	NASONEX	sprej za nos, suspenzija	bočica sa raspršivačem, 1 po 140 doza (0,05%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	859,90	200 mcg	24,57	50,00		Samo za decu na osnovu mišljenja deceg alergologa ili deceg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110033	R01AD12	flutikazonfuroat	AVAMYS	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 doza (27,5 mcg/doza)	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	733,70	110 mcg	24,46	50,00		Samo za decu na osnovu mišljenja deceg alergologa ili deceg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7114462	R03AC02	salbutamol	SPALMOTIL	rastvor za raspršivanje	bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	196,90	10 mg	39,38	50,00	Bronhijalna astma (J45).	
7114550	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 10 ml (200 doza po 0,1 mg)	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Pojjska	287,40	0,8 mg	11,50	50,00	Bronhijalna astma (J45).	

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114685	R03AC02	salbutamol	ECOSAL		kontejner pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 200 doza (100 mcg/doza)	Ivax Pharmaceuticals	Češka	287,40	0,8 mg	11,50	50,00	Bronhijalna astma (J45).	
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free		inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija	Republika Srbija	2.049,50	100 mcg	68,32	50,00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER		kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.051,20	24 mcg	70,08	50,00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER		kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2.102,20	24 mcg	70,07	50,00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114725	R03AK03	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL N		inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (0,05 mg + 0,021 mg) doza	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	786,60	6 inh.	23,60	50,00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114129	R03AK03	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL		bočica od tamnog stakla, 1 po 20 ml (0,5 mg/ml + 0,25 mg/ml)	Istituto De Angeli S.R.L.	Italija	384,90	-	-	50,00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114670	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS		diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	2.338,80	2 inh.	77,96	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114671	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS		diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	3.033,40	2 inh.	101,11	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114672	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS		diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	3.991,70	2 inh.	133,06	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114710	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER		inhaler, 1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	1.727,70	4 inh.	115,18	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114711	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER		inhaler, 1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2.118,10	4 inh.	141,21	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER		1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	3.991,70	2 inh.	133,06	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114562	R03BA01	beklometazon	BECLOFORTE CFC-FREE INHALER		inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija	Republika Srbija	729,70	800 mcg	11,68	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER		inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	647,90	800 mcg	25,92	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu i trudnice. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114574	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER		inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.851,10	800 mcg	37,02	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu i trudnice. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114576	R03BA02	budesonid	PULMICORT		suspenzija za raspršivanje, ampula, 20 po 2 ml (0,25 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.126,20	800 mcg	90,10	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114577	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0,5 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.655,70	800 mcg	66,23	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114597	R03BA05	flutikazon propionate	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija	Republika Srbija	907,40	0,6 mg	90,74	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114595	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija	Republika Srbija	786,00	0,6 mg	62,88	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114596	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija	Republika Srbija	1.559,50	0,6 mg	62,38	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO 160	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	sprej bočica sa dozerom, 1 po 60 doza (160 mcg/doza)	Nycomed GmbH	Nemačka	1.741,60	0,16 mg	29,03	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO 80	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Nycomed GmbH	Nemačka	3.088,10	0,16 mg	51,47	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
3114460	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	oralni rastvor	boca, 1 po 200 ml (2 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	198,20	12 mg	29,73	50,00		
1114461	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	tableta	blister, 60 po 2 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	175,00	12 mg	17,50	50,00		
1114220	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula retard	blister, 40 po 125 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	132,00	0,4 g	10,56	50,00		
1114221	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula retard	blister, 40 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	320,80	0,4 g	12,83	50,00		
1114503	R03DA05	aminofilin	AMINOFILIN Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 350 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	206,80	0,6 g	17,73	50,00		
1114640	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	1.052,60	10 mg	75,19	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	1.052,60	10 mg	37,59	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
3114644	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	granule	kesica, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.170,30	10 mg	104,49	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114646	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.170,30	10 mg	104,49	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1114552	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.170,30	10 mg	104,49	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114553	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.052,60	10 mg	75,19	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.052,60	10 mg	37,59	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114561	R03DC03	montelukast	MONTELUKAST PHARMAS	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	1.052,60	10 mg	75,19	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114560	R03DC03	montelukast	MONTELUKAST PHARMAS	tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	1.052,60	10 mg	37,59	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114647	R03DC03	montelukast	TELUKA	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.170,30	10 mg	104,49	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114648	R03DC03	montelukast	TELUKA	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.052,60	10 mg	75,19	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.052,60	10 mg	37,59	50,00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
7112250	R05CB13	dornaza alfa	PULMOZYME	rastvor za raspršivanje	6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	11.729,80	2,5 mg	1.954,97	50,00	Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).	Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starosne dobi od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.
4090121	S01AA01	hioramfenikol	CHLORAMPHENICOL	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	123,20	-	-	50,00		
4090815	S01AA01	hioramfenikol	HLORAMKOL	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	123,20	-	-	50,00		
4090816	S01AA01	hioramfenikol	HLORAMFENIKOL ALKALOID	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	123,20	-	-	50,00		
7090801	S01AA11	gentamicin	GENTOKULIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (0,3%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	163,20	-	-	50,00		
4150250	S01AA30	bacitracin, neomicin	ENBECIN	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	94,50	-	-	50,00		
7090010	S01AX13	ciprofloksacin	MAROCEN	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0,3%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	192,50	-	-	50,00	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
4090620	S01BA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	138,20	-	-	50,00		
7094033	S01EB01	pilocarpin	MIOKARPIN	kapi za oči	bočica, 1 po 10 ml 2%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	143,80	0,4 ml	5,75	50,00		
7096055	S01EC03	dorzolamid	ULOM	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (2%)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company, Pliva Hrvatska	Mađarska; Hrvatska	315,10	0,3 ml	18,91	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096070	S01EC03	dorzolamid	OPTODROP	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	315,10	0,3 ml	18,91	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096060	S01EC04	brinzolamid	AZOPT	kapi za oči	5 ml (10 mg/ml)	Alcon-Couvreur	Belgija	781,30	0,2 ml	31,25	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093071	S01ED01	timolol	GLAUMOL	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0,5%	Galenika a.d.	Republika Srbija	139,10	0,2 ml	5,56	50,00	Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093020	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0.5%	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml 0,5%	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	278,20	0,2 ml	5,56	50,00	Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099170	S01ED51	timolol, latanoprost	XALACOM	kapi za oči, rastvor	1 po 2,5 ml (5 mg/ml + 50 mcg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	738,10	0,1 ml	29,52	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099180	S01ED51	dorzolamid, timolol	COSOPT	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 5 ml (2% + 0,5%)	Laboratories Merck Sharp & Dohme-Chibret	Francuska	436,50	0,2 ml	17,46	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099085	S01ED51	timolol, dorzolamid	ULOM PLUS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (5 mg/ml + 20 mg/ml)	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	361,80	0,2 ml	14,47	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099185	S01ED51	dorzolamid, timolol	TIMOGLAUCON	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml + 5 mg/ml)	Aeropharm GmbH	Nemačka	361,80	0,2 ml	14,47	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099140	S01EE01	latanoprost	XALATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml 0,005%	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	486,80	0,1 ml	19,47	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099001	S01EE01	latanoprost	LANOPROGAL	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	376,90	0,1 ml	15,08	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099171	S01EE01	latanoprost	VISUS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	376,90	0,1 ml	15,08	50,00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
N002303	V06DX..	bezglutensko brašno	MIX B I MIX C BRAŠNO	prašak	1 kg	Dr Schar GmbH	Italija	585,00	-	-	50,00	Celijakna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 5 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003582	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRIDRINK	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	168,40	-	-	50,00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (G25.3) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003590	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRISON	rastvor za enteralnu ishranu	boca, 500 ml (1 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	335,60	-	-	50,00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (G25.3) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003814	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NEOCATE LCP	prah	limenka, 400 g	SHS International Ltd.	Velika Britanija	4.185,07	-	-	50,00	1. Intolerancija proteina kravljeg mleka 2. Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	329,40	20 mg	21,96	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122858	A02BC01	omeprazol	ZEPROM	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	307,40	20 mg	21,96	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122846	A02BC01	omeprazol	ORTANOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceutical s.d.d.	Republika Srbija	307,40	20 mg	21,96	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122857	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	307,40	20 mg	21,96	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122936	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	307,40	20 mg	21,96	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122935	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZOL	gastrorezistentna kapsula, tvrda	boca, 15 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	329,40	20 mg	21,96	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122750	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Takeda GmbH	Nemačka	150,60	40 mg	10,76	20%	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122752	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Takeda GmbH	Nemačka	124,90	40 mg	17,84	85%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122750	A02BC02	pantoprazol	CONTROLOC	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Takeda GmbH	Nemačka	150,60	40 mg	10,76	85%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122866	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	104,10	40 mg	14,87	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	125,50	40 mg	8,96	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122772	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	104,10	40 mg	14,87	80%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122774	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL PHARMAS	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	125,50	40 mg	8,96	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122915	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	104,10	40 mg	14,87	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122916	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	208,20	40 mg	14,87	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	125,50	40 mg	8,96	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezistentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	251,00	40 mg	8,96	80%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122160	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	380,00	30 mg	27,14	85%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122161	A02BC03	lansoprazol	SABAX	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	439,00	30 mg	31,36	85%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122162	A02BC03	lansoprazol	LARONA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	bočica plastična, 28 po 30 mg	Jadran Galenski Laboratorij d.d.	Hrvatska	760,00	30 mg	27,14	85%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122163	A02BC03	lansoprazol	LARONA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	bočica plastična, 28 po 15 mg	Jadran Galenski Laboratorij d.d.	Hrvatska	439,00	30 mg	31,36	85%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122859	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	121,10	30 mg	25,95	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	242,30	30 mg	25,96	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	484,60	30 mg	25,96	75%	1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122883	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 7 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	163,20	30 mg	17,49	75%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	326,20	30 mg	17,48	75%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezistentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Slovenija	652,30	30 mg	17,47	75%	1. Za eradikaciju <i>Helicobacter pylori</i> infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), 2. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 meseca (K25; K26; K28), 3. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 nedelje terapije (K21).	Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. Za indikaciju pod tačkom 3. nakon gore navedenog perioda lečenja (2 nedelje) nastavak terapije do 8 nedelja u toku 12 meseci na osnovu mišljenja: a) gastroenterologa ili b) mišljenja specijaliste abdominalnog hirurga uz nalaz gornje endoskopije.
3127425	A06AD11	laktuloza	DUPHALAC	oralni rastvor	boca plastična, 1 po 500 ml (667 g/l)	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	482,80	6,7 g	9,70	20%	Portosistemske encefalopatije (K72).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
5129472	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	supozitorija	strip, 10 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	655,90	1,5 g	196,77	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129474	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 50 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1.455,70	1,5 g	87,34	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129475	A07EC02	mesalazin	SALOFALK 500	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 500 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2.911,30	1,5 g	87,34	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1129110	A07EC02	mesalazin	ASACOL	gastrorezistentna tableta	blister, 100 po 400 mg	farmaceutska družba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma	Slovenija	1.940,50	1,5 g	72,77	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1129130	A07EC02	mesalazin	PENTASA	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 100 po 500 mg	Ferring International Center SA	Švajcarska	2.727,60	1,5 g	81,83	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129131	A07EC02	mesalazin	PENTASA	supozitorija	blister, 28 po 1 g	Ferring International Center SA	Švajcarska	3.447,30	1,5 g	184,68	20%	1. Crohnova bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1043106	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	blister, 50 po 500 mg	Merck Sante S.A.S; Merck S.L.; Merck KGaA; Merck KGaA & Co. WERK SPITTAL	Francuska; Španija; Nemačka; Austrija	149,50	2 g	11,96	25%		
1042063	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	681,40	60 mg	22,71	50%		
1042161	A10BB09	gliklazid	DIAPREL MR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 60 mg	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.	Irska; Francuska; Poljska	1.362,80	60 mg	22,71	50%		
1050100	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 50 po 0,25 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	516,90	1 mcg	41,35	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3), 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1050102	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 0,5 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	525,50	1 mcg	35,03	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3). 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050101	A11CC03	alfakalcidol	ALPHA D3	kapsula, meka	bočica, 30 po 1 mcg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd; Pharmachemie B.V.	Izrael; Holandija	948,60	1 mcg	31,62	25%	1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), 2. Renalna osteodistrofija (N25.0), 3. Osteomalacija kod vitamin D rezistentnog rahitisa (E83.3). 4. Glukokortikoidima indukovana osteoporoza (M81.4).	Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa.
1050121	A11CC04	kalcitriol	ROCALTROL	kapsula, meka	blister, 100 po 0,25 mcg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.479,60	1 mcg	59,18	25%	Renalna osteodistrofija (N25.0).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa.
1063220	B01AA07	acenokumarol	SINKUM 4	tableta	blister, 20 po 4 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	114,20	5 mg	7,14	45%		
1068220	B01AC04	klopidogrel	PLAVIX	film tableta	28 po 75 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	464,70	75 mg	16,60	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1068502	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	464,70	75 mg	16,60	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1068221	B01AC04	klopidogrel	ANTIAGREX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	464,70	75 mg	16,60	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1068239	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	464,70	75 mg	16,60	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1068243	B01AC04	klopidogrel	CARDOGREL	film tableta	blister, 30 po 75 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceutical s.d.d. Slovenija	Republika Srbija	498,00	75 mg	16,60	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1068551	B01AC04	klopidogrel	CLOPIDIX	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	464,70	75 mg	16,60	50%		1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta, a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. 2. Kod pacijenata u sekundarnoj prevenciji infarkta miokarda i mozga kod osoba koje su rezistentne na acetilsalicilnu kiselinu (koji su imali jedan ili više vaskularnih događaja), a na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1068520	B01AC30	klopidogrel, acetilsalicilna kiselina	DUOPLAVIN	film tableta	blister, 28 po (75 mg + 100 mg)	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	1.194,00	1 tableta	42,64	60%	1. Prevencija aterotrombotičkih događaja na osnovu mišljenja interniste za period od 12 meseci nakon preležanog akutnog infarkta miokarda. 2. Kod bolesnika sa anginom pectoris i za prevenciju tromboze stenta 12 meseci nakon ugradnje stenta sa oslobađanjem leka i mesec dana nakon ugradnje stenta bez leka, na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta.	
1060140	B03AA02	gvožđe II fumarat	HEFEROL	kapsula, tvrda	blister, 30 po 350 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	310,40	0,2 g	17,99	15%		
1060072	B03AB05	gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks	FERRUM SANDOZ	tableta za žvakanje	30 po 100 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	346,20	90 mg	10,39	15%		
1060075	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	tableta za žvakanje	blister, 30 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	346,20	90 mg	10,39	15%		
7102621	C01DA02	glicerilnitrinat (nitroglicerini)	NITROLINGUAL	sublingvalni sprej	boca sa pumpom za doziranje, 12,2 ml/ 200 doza (0,4 mg/doza)	G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG	Nemačka	543,00	2,5 mg	16,97	75%		

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1109131	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	220,70	40 mg	4,20	55%	Bolesnici sa anginom pectoris (I20) koji imaju simptome i pored uzimanja pune medikamentne terapije koja sadrži različite kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata, beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE inhibitora i antilipidnih lekova.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109129	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 35 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	110,40	40 mg	4,21	55%	Bolesnici sa anginom pectoris (I20) koji imaju simptome i pored uzimanja pune medikamentne terapije koja sadrži različite kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata, beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE inhibitora i antilipidnih lekova.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109130	C01EB15	trimetazidin	TRIMECARD	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 35 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	110,40	40 mg	4,21	55%	Bolesnici sa anginom pectoris (I20) koji imaju simptome i pored uzimanja pune medikamentne terapije koja sadrži različite kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata, beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE inhibitora i antilipidnih lekova.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109133	C01EB15	trimetazidin	TRIMECARD	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	220,70	40 mg	4,20	55%	Bolesnici sa anginom pectoris (I20) koji imaju simptome i pored uzimanja pune medikamentne terapije koja sadrži različite kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata, beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE inhibitora i antilipidnih lekova.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1109100	C01EB15	trimetazidin	TRIMETAZIDIN PHARMAS	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 60 po 35 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	220,70	40 mg	4,20	55%	Bolesnici sa anginom pectoris (I20) koji imaju simptome i pored uzimanja pune medikamentne terapije koja sadrži različite kombinacije antiagregacionih lekova, nitrata, beta blokatora, kalcijumskih antagonista, ACE inhibitora i antilipidnih lekova.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	158,90	2 g	63,56	50%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103481	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,2 mg	Abbott Healthcare SAS	Francuska	280,50	0,3 mg	15,03	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103482	C02AC05	moksonidin	PHYSIOTENS	film tableta	blister, 28 po 0,4 mg	Abbott Healthcare SAS	Francuska	430,10	0,3 mg	11,52	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103090	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.2	film tableta	blister, 30 po 0,2 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	300,50	0,3 mg	15,03	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103092	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.3	film tableta	blister, 30 po 0,3 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	443,50	0,3 mg	14,78	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103093	C02AC05	moksonidin	MOXOGAMMA 0.4	film tableta	blister, 30 po 0,4 mg	Worwag Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	460,80	0,3 mg	11,52	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103892	C02AC06	rilmidenin	TENAXUM	tableta	blister, 30 po 1 mg	Les Laboratoires Servier Industrie	Francuska	704,80	1 mg	23,49	60%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103765	C02CA04	doksazosin	ALPHAPRES	tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	169,90	4 mg	22,65	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103766	C02CA04	doksazosin	ALPHAPRES	tableta	blister, 30 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	288,10	4 mg	19,21	60%		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili urologa.
1103046	C03BA11	indapamid	INDAPRES SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	304,40	1 tableta	10,15	75%		
1103051	C03BA11	indapamid	RAWEL SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	304,40	1 tableta	10,15	75%		
1107018	C07AA07	sotalol	DAROB MITE	tableta	blister, 50 po 80 mg	Abbott GmbH & Co. KG	Nemačka	428,70	0,16 g	17,15	50%	Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1107810	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 47,5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	229,60	0,15 g	22,96	40%	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107814	C07AB02	metoprolol sukcinat	METOPROLOL XL SANDOZ	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 95 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	274,50	0,15 g	13,73	40%	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107633	C07AB12	nebivolol	BINEVOL	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	316,50	5 mg	10,55	35%		
1107645	C07AB12	nebivolol	NEBACOP	tableta	blister, 28 po 5 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	295,40	5 mg	10,55	35%		
1107634	C07AB12	nebivolol	NEVOTENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Zdravlje a.d	Republika Srbija	316,50	5 mg	10,55	35%		
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	128,30	37,5 mg	12,83	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107660	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	119,80	37,5 mg	12,84	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107661	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	28 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	205,10	37,5 mg	10,99	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	119,80	37,5 mg	12,84	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	128,30	37,5 mg	12,83	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	219,70	37,5 mg	10,99	50%	Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1402821	C08CA02	felodipin	PLENDIL	tableta sa produženim oslobađanjem	bočica plastična, 30 po 5 mg	AstraZeneca AB	Švedska	322,50	5 mg	10,75	35%	1. Angina pectoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1103916	C09AA04	perindopril	PREXANIL	tableta	30 po 5 mg	Les Laboratoires Servier; Servier (Ireland) Industries; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	466,20	4 mg	12,43	45%		
1103915	C09AA04	perindopril	PREXANIL	tableta	30 po 10 mg	Les Laboratoires Servier; Servier (Ireland) Industries; Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA	Francuska; Irska; Poljska	600,30	4 mg	8,00	45%		
1103935	C09AA04	perindopril	NOPRITEX	tableta	blister, 30 po 4 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	255,60	4 mg	8,52	35%		
1103929	C09AA04	perindopril	NOPRITEX	tableta	blister, 30 po 8 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	329,10	4 mg	5,49	35%		
1103955	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	255,60	4 mg	8,52	35%		
1103956	C09AA04	perindopril	RANBAPRIL	tableta	blister, 30 po 8 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	329,10	4 mg	5,49	35%		
1103856	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	255,60	4 mg	8,52	35%		

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103857	C09AA04	perindopril	PERIGARD	tableta	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	329,10	4 mg	5,49	35%		
1103512	C09AA04	perindopril	RELIKA	tableta	blister, 30 po 2 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	153,90	4 mg	10,26	35%		
1103731	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	187,30	15 mg	14,05	55%		
1103732	C09AA06	kvinapril	HEMOKVIN	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA	Republika Srbija	221,80	15 mg	8,32	25%		
1103702	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	268,30	2,5 mg	8,94	55%		
1103704	C09AA08	cilazapril	PRILAZID	film tableta	kontejner za tablete, 30 po 5 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	477,80	2,5 mg	7,96	55%		
1103883	C09AA08	cilazapril	ZOBOX	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	477,80	2,5 mg	7,96	55%		
1103882	C09AA08	cilazapril	ZOBOX	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	268,30	2,5 mg	8,94	55%		
1103810	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	305,40	15 mg	16,36	50%		
1103811	C09AA09	fosinopril	MONOPRIL	tableta	blister, 28 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	442,20	15 mg	11,84	50%		
1103814	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL-TEVA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Izrael	327,20	15 mg	16,36	50%		
1103815	C09AA09	fosinopril	FOSINOPRIL-TEVA	tableta	blister, 30 po 20 mg	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Izrael	473,70	15 mg	11,84	50%		
1103940	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 0,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	163,20	2 mg	23,31	60%		

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103941	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 2 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	399,20	2 mg	14,26	60%		
1103942	C09AA10	trandolapril	TRANDOLAPRIL PHARMAS	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	515,70	2 mg	9,21	60%		
1103467	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableta	blister, 28 po 30 mg	Menarini Von Heyden GmbH; A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Nemačka; Italija	688,70	30 mg	24,60	75%	Esencijalna arterijska hipertenzija (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1401260	C09BA04	perindopril, indapamid	NOPRITEX PLUS	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	233,40	1 tableta	7,78	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401261	C09BA04	perindopril, indapamid	NOPRITEX PLUS	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	375,80	1 tableta	12,53	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401251	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (2 mg + 0,625 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	233,40	1 tableta	7,78	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401252	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (4 mg + 1,25 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	375,80	1 tableta	12,53	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401255	C09BA04	perindopril, indapamid	CO-PRENESSA	tableta	blister, 30 po (8 mg + 2,5 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	592,40	1 tableta	19,75	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401917	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI LD	film tableta	kontejner, 30 po (2,5 mg + 0,625 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD	Francuska; Irska	291,80	1 tableta	9,73	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401606	C09BA04	perindopril, indapamid	PREXANIL COMBI	film tableta	kontejner, 30 po (5 mg + 1,25 mg)	Les Laboratoires Servier Industrie; Servier (Ireland) Industries LTD	Francuska; Irska	644,10	1 tableta	21,47	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401190	C09BA04	perindopril, indapamid	PERIGARD PLUS	tableta	blister, 30 po (4 mg+1,25 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	375,80	1 tableta	12,53	35%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401030	C09BA06	kvinapril, hidrohloriazid	HEMOKVIN PLUS	film tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	248,70	1 tableta	12,44	20%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401055	C09BA06	kvinapril, hidrohloriazid	KVINAPRIL/HIDRO HLORTIAZID	film tableta	blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company	Mađarska	348,10	1 tableta	12,43	20%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401400	C09BA08	cilazapril, hidrohloriazid	PRILAZID PLUS	film tableta	blister, 30 po (5 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	803,40	1 tableta	26,78	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401401	C09BA08	cilazapril, hidrohlortiazid	INHIBACE PLUS	film tableta	blister, 28 po (5 mg + 12,5 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	749,70	1 tableta	26,78	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401236	C09BA09	fosinopril, hidrohlortiazid	MONOPRIL PLUS	tableta	blister, 28 po (20 mg + 12,5 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	484,10	1 tableta	17,29	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103884	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	439,60	1 tableta	14,65	25%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103455	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM FORTE	tableta	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	698,90	1 tableta	23,30	25%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103785	C09BB03	lizinopril, amlodipin	LISONORM	tableta	blister, 30 po (20 mg + 5 mg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	518,50	1 tableta	17,28	25%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103112	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	691,70	1 tableta	23,06	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103114	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (5 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	763,90	1 tableta	25,46	60%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103115	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 5 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	853,80	1 tableta	28,46	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103116	C09BB04	perindopril, amlodipin	PREXANOR	tableta	kontejner plastični, 30 po (10 mg + 10 mg)	Servier (Ireland) Industries Ltd.; Les Laboratoires Servier Industrie	Irska; Francuska	925,90	1 tableta	30,86	45%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403021	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN MITE	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (2,5 mg + 2,5 mg)	Chinoïn Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	420,90	1 tableta	15,03	40%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1403020	C09BB05	ramipril, felodipin	TRIAPIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po (5 mg+ 5 mg)	Chinoïn Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd.	Mađarska	448,90	1 tableta	16,03	25%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103150	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	152,80	50 mg	5,46	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103151	C09CA01	losartan	ERYNORM	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	546,50	50 mg	9,76	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103899	C09CA01	losartan	LOSARTAN PHARMAS	film tableta	blister, 28 po 50 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	152,80	50 mg	5,46	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103594	C09CA01	losartan	LOSAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	163,80	50 mg	5,46	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103000	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	163,80	50 mg	5,46	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103001	C09CA01	losartan	LOTAR	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	585,60	50 mg	9,76	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103909	C09CA01	losartan	RASOLTAN	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	152,80	50 mg	5,46	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103792	C09CA01	losartan	LORISTA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	152,80	50 mg	5,46	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103003	C09CA01	losartan	AVELOSARTAN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	163,80	50 mg	5,46	35%	1. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103446	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	416,40	80 mg	14,87	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103445	C09CA03	valsartan	VALSACOR	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	569,20	80 mg	10,16	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103780	C09CA03	valsartan	TENIVAL	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	416,40	80 mg	14,87	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103781	C09CA03	valsartan	TENIVAL	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	569,20	80 mg	10,16	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103438	C09CA03	valsartan	VALSARTAN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 80 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	416,40	80 mg	14,87	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103439	C09CA03	valsartan	VALSARTAN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 160 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	569,20	80 mg	10,16	50%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103401	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.051,00	0,15 g	35,03	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103403	C09CA04	irbesartan	IRBENIDA	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.401,60	0,15 g	23,36	80%	Hipertenzija kod pacijenata sa diabetes mellitusom tip 2 kod dijabetične nefropatije (I10).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1103890	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	blister, 28 po 40 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	389,10	40 mg	13,90	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103891	C09CA07	telmisartan	MICARDIS	tableta	28 po 80 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG; Delpharm Reims	Nemačka; Francuska	670,50	40 mg	11,97	70%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103889	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	347,30	40 mg	11,58	55%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1103789	C09CA07	telmisartan	TELMITENS	tableta	blister, 30 po 80 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	598,60	40 mg	9,98	55%	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija sa EF manjom od 40 % kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore (najčešće zbog upornog suvog kašlja) (I50).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401914	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LOSAR PLUS	film tableta	blister, 30 po (50 mg + 12,5 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	300,50	1 tableta	10,02	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401560	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	ERYNORM PLUS	film tableta	blister, 28 po (50 mg+12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	280,40	1 tableta	10,01	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401120	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LORISTA H	film tableta	blister, 28 po (50 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	280,40	1 tableta	10,01	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401126	C09DA01	losartan, hidrohloriazid	LORISTA H 100	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	776,20	1 tableta	27,72	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401121	C09DA01	losartan, hidrolortiazid	LORISTA HD	film tableta	blister, 28 po (100 mg + 25 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d., Slovenija	Republika Srbija	531,90	1 tableta	19,00	35%	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 i I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401926	C09DA03	valsartan, hidrolortiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	586,80	1 tableta	20,96	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401925	C09DA03	valsartan, hidrolortiazid	VALSACOMBI	film tableta	blister, 28 po (160 mg + 25 mg)	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	586,80	1 tableta	20,96	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401650	C09DA03	valsartan, hidrolortiazid	TENIVAL PLUS	film tableta	blister, 28 (80 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	460,20	1 tableta	16,44	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401651	C09DA03	valsartan, hidrolortiazid	TENIVAL PLUS	film tableta	blister, 28 (160 mg + 12,5 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	586,80	1 tableta	20,96	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401652	C09DA03	valsartan, hidrolortiazid	TENIVAL PLUS	film tableta	blister, 28 (160 mg + 25 mg)	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	586,80	1 tableta	20,96	50%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1401662	C09DA04	irbesartan, hidrohlortiazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (150 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.051,40	1 tableta	35,05	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401663	C09DA04	irbesartan, hidrohlortiazid	IRBENIDA PLUS	film tableta	blister, 30 po (300 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.401,60	1 tableta	46,72	80%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1401053	C09DA07	telmisartan, hidrohlortiazid	MICARDIS PLUS	tableta	28 po (80 mg + 12,5 mg)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	1.024,80	1 tableta	36,60	70%	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste.
1104510	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	91,90	30 mg	13,79	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104511	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	20 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	160,50	30 mg	12,04	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	128,70	30 mg	13,79	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	224,70	30 mg	12,04	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	368,60	30 mg	9,87	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	137,90	30 mg	13,79	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	240,70	30 mg	12,04	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	394,80	30 mg	9,87	80%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovljenog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	267,50	30 mg	13,38	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	594,40	30 mg	14,86	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104485	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	267,50	30 mg	13,38	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104486	C10AA03	pravastatin	PRALIP	tableta	blister, 30 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	594,40	30 mg	14,86	75%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	451,80	20 mg	7,53	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	451,80	20 mg	7,53	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104601	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceutical s.d.d. Slovenija	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104600	C10AA05	atorvastatin	TULIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceutical s.d.d. Slovenija	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104555	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104556	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104557	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	451,80	20 mg	7,53	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104790	C10AA05	atorvastatin	HIPOLIP	film tableta	blister, 30 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.683,60	20 mg	14,03	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104605	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	224,80	20 mg	14,99	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104606	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	397,00	20 mg	13,23	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104607	C10AA05	atorvastatin	ATORVASTATIN PHARMAS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	451,80	20 mg	7,53	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	396,20	10 mg	28,30	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	664,70	10 mg	23,74	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	1.095,20	10 mg	19,56	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	1.910,40	10 mg	17,06	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	712,30	10 mg	23,74	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.173,60	10 mg	19,56	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104720	C10AA07	rosuvastatin	ROVESTA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	664,70	10 mg	23,74	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104721	C10AA07	rosuvastatin	ROVESTA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.095,20	10 mg	19,56	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104722	C10AA07	rosuvastatin	ROVESTA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.910,40	10 mg	17,06	85%	1. Akutni infarkt miokarda (I21) kao hronična terapija nakon preležanog akutnog infarkta miokarda kao prevencija ponovnog infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga (I63) - samo za pacijente koji su imali infarkt mozga kao prevencija ponovnog infarkta mozga.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste ili neurologa/neuropsihijatra.
1104232	C10AB05	fenofibrat	FENOLIP	kapsula, tvrda	blister, 30 po 160 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	537,20	0,2 g	22,38	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ako nakon tromesečne dijetе trigliceridi u krvi nisu manji od 4.6 mmol/l.
1155512	D05BB02	acitretin	NEOTIGASON	kapsula, tvrda	blister, 30 po 25 mg	Cenexi SAS; DSM Fine Chemicals Austria Nfg. GmbH & Co KG	Francuska; Austrija	3.449,60	35 mg	160,98	50%	Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovani za lečenje psoriasis guttata.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja.
1155511	D05BB02	acitretin	NEOTIGASON	kapsula, tvrda	blister, 100 po 10 mg	Cenexi SAS; DSM Fine Chemicals Austria Nfg. GmbH & Co KG	Francuska; Austrija	5.452,50	35 mg	190,84	50%	Psorijaza (L40.0; L40.1; L40.2; L40.3; L40.5; L40.8; L40.9). Nije indikovani za lečenje psoriasis guttata.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa i kao nastavak bolničkog lečenja.
4150400	D06AX07	gentamicin	GENTAMICIN	mast	tuba, 1 po 15 g 0,1% (1 mg/1 g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	122,50	-	-	50%		
4139180	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	mast	tuba, 1 po 5 g (50 mg/g) 5 %	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	266,50	-	-	50%		
4139160	D06BB03	aciklovir	ACIKLOVIR	krem	tuba, 1 po 5 g 5 %	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	266,50	-	-	50%		
4152104	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	krem	tuba, 20 g (0,5 mg/1 g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	268,30	-	-	75%		
4152100	D07AB10	alklometazon	AFLODERM	mast	tuba, 20 g (0,5 mg/1 g)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	268,30	-	-	75%		

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
4153440	D07AC13	mometazon	ELOCOM	krem	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	282,50	-	-	80%		
4153441	D07AC13	mometazon	ELOCOM	mast	tuba, 1 po 15 g (0,1%)	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	282,50	-	-	80%		
9150024	D09AA02	fusidinska kiselina	STANICID	impregnirana kompres	aluminijumsk a folija, 10 po 30 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	277,20	-	-	50%		
1155442	D10BA01	izotretinoin	ROACCUTANE	kapsula, meka	blister, 30 po 10 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.049,20	30 mg	104,92	25%	Akne conglobata (L70.1).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
6137312	G01AA51	nistatin, neomicin, polimiksin b	POLYGYNAX	vaginalna kapsula, meka	blister, 12 po (100000 i.j. + 35000 i.j. + 35000 i.j.)	Innothera Chouzy	Francuska	585,60	-	-	70%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137320	G01AF05	ekonazol	ECALIN	vagitorija	3 po 150 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	224,40	0,1 g	49,87	85%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137510	G01AF12	fentikonazol	LOMEXIN	vaginalna kapsula	1 po 600 mg	Catalent Italy S.P.A.	Italija	294,20	0,1 g	49,03	85%	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1149080	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 3 po 25 mcg i 3 po 50 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	425,90	75 mcg	141,97	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1149081	G02CB04	kvinagolid	NORPROLAC	tableta	blister, 30 po 75 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	2.464,00	75 mcg	82,13	75%	Hiperprolaktinemija (E22.1)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1135300	G03AA10	gestoden, etinilestradiol	LINDYNETTE 20	obložena tableta	blister, 1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)	Gedeon Richter PLC	Mađarska	364,80	0,75 tabl.	13,03	75%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1135277	G03AA12	drospirenol, etinilestradiol	YAZ	film tableta	blister, 28 po (3 mg + 0,02 mg) (24 + 4 placebo)	Schering GmbH & Co. Produktions KG	Nemačka	864,60	1 tableta	30,88	85%	Hormonska kontracepcija (Z30).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1049210	G03CX01	tibolon	LIVIAL	tableta	28 po 2,5 mg	N.V. Organon	Holandija	1.478,20	2,5 mg	52,79	75%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048293	G03DB01	didrogesteron	DUPHASTON	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Abbott Biologicals B.V.	Holandija	455,00	10 mg	22,75	70%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048790	G03FA17	drospirenol, estradiol	ANGELIQ	film tableta	28 po (2 mg +1 mg)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	1.223,30	1 tableta	43,69	85%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiol	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	1 po 21 (11 belih + 10 smeđih)	Schering GmbH & Co. Produktions KG	Nemačka	248,80	0,75 tabl.	8,89	25%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Schering AG	Francuska; Nemačka	2.185,40	0,1 g	87,42	25%	Maligni tumor prostate (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1048176	G03HB01	ciproteron, etinilestradiol	DIANE-35	obložena tableta	blister, 1 po 21 (2 mg + 0,035 mg)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	395,70	0,75 tabl.	14,13	15%	1. Idiopatski hirzutizam (L68). Kod žena generativne dobi uz dismenoreju; 2. Ozbiljne akne koje ne reaguju na antimikrobnu terapiju (L70).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048720	G03HB01	ciproteron, estradiol	CLIMEN	obložena tableta	blister, 1 po 21 (1 mg + 2 mg)	Delpharm Lille Sas	Francuska	606,10	0,75 tabl.	21,65	70%	Menopauza (N95).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1139173	G04BD07	tolterodin	DETRUSITOL	film tableta	blister, 28 po 2 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	988,00	4 mg	70,57	70%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139022	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	973,00	5 mg	97,30	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139020	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	2.919,10	5 mg	97,30	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1139021	G04BD08	solifenacin	VESICARE	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Astellas Pharma Europe B.V.	Holandija	2.984,90	5 mg	49,75	80%	1. Iritabilna bešika (N39.4); 2. Urinarna inkontinencija (N39.3).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili neurologa.
1134230	G04CA02	tamsulosin	TAMSOL	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	376,60	0,4 mg	12,55	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134240	G04CA02	tamsulosin	BETAMSAL	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	376,60	0,4 mg	12,55	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134260	G04CA02	tamsulosin	TAMSULOSIN PHARMAS	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,4 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	376,60	0,4 mg	12,55	25%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134205	G04CB01	finasterid	PROSCAR	tableta	28 po 5 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	368,70	5 mg	13,17	60%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134228	G04CB01	finasterid	BENEPROST	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	329,10	5 mg	10,97	50%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134212	G04CB01	finasterid	FINASTERID PHARMAS	film tableta	blister, 28 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	307,30	5 mg	10,98	50%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.
1134306	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	kapsula, meka	blister, 30 po 0,5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	976,40	0,5 mg	32,55	80%	Benigna hiperplazija prostate (N40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0040240	H05AA02	teriparatid	FORTEO	rastvor za injekciju, pen sa uloškom	28 doza po 20 mcg/80 mcl	Lilly France S.A.S.	Francuska	35.954,70	20 mcg	1.284,10	35%	1. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod pacijenata u postmenopauzi koje su imale bar jedan prelom uzrokovan traumom malog intenziteta uz verifikovanu osteoporozu (osteodenzitometrijski nalaz DEXA T vrednost $\leq -2,5$ SD na kuku ili lumbalnoj kičmi), 2. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod pacijenata u postmenopauzi sa verifikovanim prelomom kod kojih je nakon upotrebe bisfosfonata tokom najmanje godinu dana lečenja došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA T u odnosu na vredost pre početka lečenja.	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1021600	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	435,70	1 g	116,19	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021601	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	808,70	1 g	80,87	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021607	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	408,00	1 g	33,31	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021566	J01CR02	amoksicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	404,40	1 g	80,88	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1021567	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	291,40	1 g	33,30	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021560	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	606,50	1 g	80,87	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1021632	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	SmithKline Beecham Pharmaceuticals	Velika Britanija	408,00	1 g	33,31	50%	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	403,00	0,5 g	80,60	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	515,00	0,5 g	51,50	50%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34), 4. Lajmska bolest (A69.2).	
1321950	J01DC10	cefprozil monohidrat	CEFZIL	tableta	10 po 500 mg	Corden Pharma Latina S.P.A.	Italija	1.301,00	1 g	260,20	85%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34).	

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.198,70	0,4 g	119,87	65%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	599,30	0,4 g	119,86	65%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321627	J01DD08	cefiksim	CEFEXIN	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	1.198,70	0,4 g	119,87	65%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321521	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	296,20	0,4 g	118,48	65%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1321523	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	592,50	0,4 g	118,50	65%	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	386,90	0,3 g	77,38	50%	Infekcije mokraćnih puteva (N34).	
2325625	J01FA09	klaritromicin	KLACID	granule za oralnu suspenziju	boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	294,40	0,5 g	98,13	20%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325056	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	film tableta	14 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	205,10	0,5 g	29,30	50%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	334,00	0,5 g	23,86	50%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	185,60	0,5 g	26,51	50%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	371,00	0,5 g	26,50	50%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	400,80	0,5 g	28,63	60%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	222,60	0,5 g	31,80	60%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	332,70	0,3 g	66,54	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	219,60	0,3 g	43,92	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	332,70	0,3 g	66,54	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	219,60	0,3 g	43,92	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
3325100	J01FA10	azitromicin	ZMAX	granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (2 g/60 ml)	Pfizer Pharmaceutical s LLC	Portoriko	633,80	0,3 g	95,07	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d, Slovenija	Republika Srbija	219,60	0,3 g	43,92	80%	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Nagonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	241,50	1,2 g	80,50	25%		
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	453,70	1,2 g	75,62	25%		
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.131,90	1,2 g	75,46	25%		
1329350	J01MA01	ofloksacin	VISIREN	tableta	10 po 200 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	454,60	0,4 g	90,92	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329371	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	film tableta	blister, 10 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	642,30	0,5 g	64,23	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329380	J01MA12	levofloksacin, hemihidrat	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	385,20	0,5 g	77,04	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329381	J01MA12	levofloksacin, hemihidrat	LOFOCIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	642,30	0,5 g	64,23	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329455	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	385,20	0,5 g	77,04	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329456	J01MA12	levofloksacin	FORTECA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	642,30	0,5 g	64,23	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom <i>Mycoplasma pneumoniae</i> (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329103	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 7 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	269,60	0,5 g	77,03	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329104	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	385,20	0,5 g	77,04	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329102	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 7 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	449,60	0,5 g	64,23	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329105	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	642,30	0,5 g	64,23	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329506	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 250 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	269,60	0,5 g	77,03	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1329505	J01MA12	levofloksacin	LEFLOGAL	film tableta	blister, 7 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	449,60	0,5 g	64,23	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329382	J01MA12	levofloksacin	LEVOKSACIN	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	385,20	0,5 g	77,04	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1329383	J01MA12	levofloksacin	LEVOKSACIN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Ivančić i sinovi d.o.o.	Republika Srbija	642,30	0,5 g	64,23	25%	1. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7); 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39); 3. Akutni bakterijski sinuzitis (J01); 4. Akutna bakterijska egzacerbacija hroničnog bronhitisa (J41); 5. Vanbolnička pneumonija (J13-J15).	
1132320	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEM	kapsula	20 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	363,50	0,8 g	72,70	25%		
1132300	J01MB04	pipemidinska kiselina	PIPEGAL	kapsula	20 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	363,50	0,8 g	72,70	25%		
1327356	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 1 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	142,60	0,2 g	190,13	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa.
1327355	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	142,60	0,2 g	81,49	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa.
1327401	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	blister, 7 po 50 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	142,60	0,2 g	81,49	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa.
1327400	J02AC01	flukonazol	FLUKOZOL	kapsula, tvrda	kontejner, 1 po 150 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	142,60	0,2 g	190,13	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1327402	J02AC02	itakonazol	KANAZOL	kapsula, tvrda	kontejner plastični, 10 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	658,70	0,2 g	131,74	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1327507	J02AC02	itakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 4 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	263,50	0,2 g	131,75	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1327505	J02AC02	itakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 15 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	988,10	0,2 g	131,75	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1327506	J02AC02	itakonazol	OMICRAL	kapsula, tvrda	blister, 28 po 100 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	1.844,40	0,2 g	131,74	30%	1. Tinea corporis disseminata (B35.4), 2. Onychomycosis-pulsna terapija (B35.1), 3. Tinea capitis rezistentna na druge oblike terapije (B35.0), 4. Pityriasis versicolor (B36.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa.
1037200	L02BB01	flutamid	FLUTASIN	tableta	90 po 250 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	2.825,20	0,75 g	94,17	20%	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analozima) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039330	L02BG04	letrozol	FEMARA	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	1.901,80	2,5 mg	63,39	20%	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovoditi terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014301	L04AA13	leflunomid	ARAVA	film tableta	bočica, 30 po 20 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	4.407,70	20 mg	146,92	10%	1. Aktivni reumatoidni artritis (M05 i M06) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije; 2. Aktivni psorijazni artritis (M07) - kod odraslih bolesnika kod kojih je primena metotreksata dovela do neželjenih događaja (gastrična nepodnošljivost, hepatotoksičnost, hematološka toksičnost, alergijske reakcije i drugo) ili metotreksat ne pokazuje odgovarajuću efikasnost u dozama većim ili jednakim 15 mg nedeljno u toku najmanje šest meseci terapije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1082121	M03BX07	tetrazepam	TETRAZEPAM-MIP	tableta	blister, 20 po 50 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	301,40	50 mg	15,07	90%	Terapija bolnih mišićnih spazama (M53; M54; M79.1).	Lek se propisuje na osnovu mišljenja neurologa ili psihijatra ili neuropsihijatra ili fizijatra ili reumatologa ili ortopeda.
1059079	M05BA04	alendronska kiselina	BONAP	tableta	blister, 4 po 70 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	579,40	10 mg	20,69	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck.
1059908	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 4 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	579,40	10 mg	20,69	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck.
1059909	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 8 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.158,80	10 mg	20,69	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck.
1059907	M05BA04	alendronska kiselina	ALEFOSS	tableta	blister, 12 po 70 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.738,30	10 mg	20,69	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1059903	M05BA04	alendronska kiselina	FOROSA	film tableta	blister, 4 po 70 mg	Ufar d.o.o.	Republika Srbija	579,40	10 mg	20,69	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck.
1059092	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	film tableta	blister, 1 po 150 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	621,00	5 mg	20,70	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck.
1059090	M05BA06	ibandronska kiselina	IBANDRONAT PHARMAS	film tableta	blister, 1 po 150 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	621,00	5 mg	20,70	35%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck.
1059121	M05BB03	alendronska kiselina, holekalciferol	FOSAVANCE	tableta	blister, 4 po (70 mg + 5600 i.j.)	Merck Sharp & Dohme S.P.A.	Italija	869,50	10 mg	31,05	50%	Za lečenje osteoporoze kod pacijenata posle menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (M80; M81).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste (internista ili reumatolog ili fizijatar ili ortoped ili ginekolog) kada je osteoporoza verifikovana DEXA T vrednost u L 1- 4 $\leq -2,5$ ili $\leq -2,5$ u Total/Neck.
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	689,20	1,2 mg	39,38	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolioimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (tricklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.378,40	1,2 mg	39,38	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepressivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.399,70	1,2 mg	45,71	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kausalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepressivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.309,80	1,2 mg	33,00	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepressivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087805	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transedermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 5,78 mg/10,5 cm²)	Hexal AG	Nemačka	683,20	1,2 mg	28,37	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepressivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087808	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 11,56 mg/21 cm ²)	Hexal AG	Nemačka	1.366,30	1,2 mg	28,37	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepressivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087802	N02AB03	fentanil	FENTANYL SANDOZ MAT	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 23,12 mg/42 cm ²)	Hexal AG	Nemačka	2.289,60	1,2 mg	23,77	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepressivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm ²)	Actavis Nordic A/S	Danska	683,20	1,2 mg	39,75	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepressivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm ²)	Actavis Nordic A/S	Danska	1.366,30	1,2 mg	39,75	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepressivi, nesteroidni antireumatici, neopiodni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm ²)	Actavis Nordic A/S	Danska	2.318,00	1,2 mg	44,96	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm ²)	Actavis Nordic A/S	Danska	2.289,60	1,2 mg	33,30	75%	Za lečenje teškog neuropatskog bola: -nespecifična neuralgija (M79.2), -postherpetička i postraumatska neuralgija (G53.0), - trigeminalna neuralgija (G50) - dijabetička amiotrofija (G73.0), - bolna oftalmoplegija (H47.0), - kaulalgija (R52.1), - spondilodiscitis (M50.1; M51.1), - dermatopolimiozitis (M33; M63) koji se tokom dvomesečne primene drugih analgetičkih sredstava (triciklički antidepresivi, nesteroidni antireumatici, neopioidni analgetici, kortikosteroidi, antiepileptici) pokazao rezistentnim uz participaciju osiguranika 75%.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste neurologa/neuropsihijatra.
1086876	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 2 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	167,70	50 mg	83,85	50%	Migrena (G43).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1086878	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 6 po 50 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	503,20	50 mg	83,87	50%	Migrena (G43).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1086877	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 2 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	244,90	50 mg	61,23	50%	Migrena (G43).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1086879	N02CC01	sumatriptan	SUMATRIPTAN	tableta	blister, 6 po 100 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	734,80	50 mg	61,23	50%	Migrena (G43).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	721,80	1,8 g	86,62	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	721,80	1,8 g	86,62	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1084736	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.095,50	0,3 g	149,68	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1084738	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	3.151,20	0,3 g	112,54	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1084745	N03AX16	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	6.302,40	0,3 g	112,54	85%	Neuropatski bol (G50; G51; G53 - G63).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085271	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tableta	bočica plastična, 100 po (100 mg + 25 mg + 200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	8.152,60	0,45 g	366,87	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085272	N04BA03	levodopa, karbidopa, entakapon	STALEVO	film tableta	bočica plastična, 100 po (150 mg + 37,5 mg + 200 mg)	Orion Corporation Orion Pharma	Finska	8.152,60	0,45 g	244,58	50%	Kod pacijenata sa Parkinsonovom bolešću, kod dugogodišnjeg rezistentnog pacijenta na primarnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju po predlogu lekara tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1085344	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 2 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	708,90	6 mg	75,95	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085348	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 4 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	1.380,30	6 mg	73,94	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085349	N04BC04	ropinirol	REQUIP MODUTAB	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 28 po 8 mg	SmithKline Beecham Pharmaceuticals; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	2.402,60	6 mg	64,36	30%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085360	N04BC04	ropinirol	REPIROL	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	654,90	6 mg	65,49	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085361	N04BC04	ropinirol	REPIROL	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 4 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.274,80	6 mg	63,74	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085362	N04BC04	ropinirol	REPIROL	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 8 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.219,10	6 mg	55,48	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085355	N04BC04	ropinirol	NYPERO	film tableta	blister, 21 po 0,5 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	316,20	6 mg	180,69	20%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085290	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	365,50	2,5 mg	121,83	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085291	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta	blister, 30 po 1 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1.444,30	2,5 mg	120,36	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085081	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 10 po 0,375 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	300,70	2,5 mg	200,47	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085082	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 0,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	1.551,40	2,5 mg	172,38	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085084	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 1,5 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3.133,80	2,5 mg	174,10	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085083	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 3 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	6.266,80	2,5 mg	174,08	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085294	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 2,25 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	4.701,00	2,5 mg	174,11	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085295	N04BC05	pramipeksol	MIRAPEXIN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 3,75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	7.834,50	2,5 mg	174,10	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085292	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	329,00	2,5 mg	109,67	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085293	N04BC05	pramipeksol	OPRYMEA	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	1.299,90	2,5 mg	108,33	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1086297	N04BC05	pramipeksol	PANARAK	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	329,00	2,5 mg	109,67	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1086296	N04BC05	pramipeksol	PANARAK	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.299,90	2,5 mg	108,33	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085068	N04BC05	pramipeksol	PRAMIPEKSOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 0,18 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	329,00	2,5 mg	109,67	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085069	N04BC05	pramipeksol	PRAMIPEKSOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 0,7 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	1.299,90	2,5 mg	108,33	25%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085080	N04BD02	rasagilin	AZILECT	tableta	blister, 28 po 1 mg	Teva Pharmaceutical s Europe B.V.	Holandija	7.148,50	1 mg	255,30	75%	Novodijagnostifikovani pacijenti oboleli od Parkinsonove bolesti (G20), najduže tokom prvih pet godina trajanja bolesti.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1085284	N04BX02	entakapon	COMTAN	film tableta	bočica staklena, 30 po 200 mg	Novartis Pharmaceutical s UK Ltd.	Velika Britanija	2.265,70	1 g	377,62	60%	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1070961	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula	30 po 40 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	2.711,00	80 mg	180,73	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070650	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 60 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	3.040,40	80 mg	135,13	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070651	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	kapsula, tvrda	30 po 80 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	4.778,50	80 mg	159,28	65%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1070970	N05AF05	zukupentiksol	CLOPIXOL	film tableta	kontejner za tablete, 50 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	605,90	30 mg	36,35	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070971	N05AF05	zukupentiksol	CLOPIXOL	film tableta	kontejner za tablete, 50 po 25 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	1.478,30	30 mg	35,48	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070965	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	tableta	blister, 50 po 100 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1.019,40	0,3 g	61,16	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070963	N05AH02	klozapin	CLOZAPINE	tableta	blister, 50 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	295,40	0,3 g	70,90	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070022	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	50 po 100 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	1.019,40	0,3 g	61,16	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070020	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	tableta	blister, 50 po 25 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	295,40	0,3 g	70,90	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070606	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	1.019,40	0,3 g	61,16	20%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070605	N05AH02	klozapin	LEPONEX	tableta	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.	Velika Britanija	320,00	0,3 g	76,80	30%	1. Šizofrenija (F20.0 - F20.9) i drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika uz periodični monitoring leukocitarne formule, prema uputstvu proizvođača. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G20-G22)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa
1070944	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 50 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	2.392,10	0,4 g	318,95	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070939	N05AH04	kvetiapin	SEROQUEL XR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 60 po 400 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	14.604,20	0,4 g	243,40	70%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070945	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 25 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	755,30	0,4 g	201,41	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070946	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	1.944,10	0,4 g	129,61	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070947	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	2.813,90	0,4 g	125,06	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070948	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 200 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	2.110,30	0,4 g	70,34	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070949	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX	film tableta	blister, 60 po 300 mg	Pharmanova d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija	Republika Srbija	2.472,90	0,4 g	54,95	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070859	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 25 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	755,30	0,4 g	201,41	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070858	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 100 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	1.944,10	0,4 g	129,61	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070857	N05AH04	kvetiapin	KVETIAPIN PHARMAS	film tableta	blister, 60 po 200 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	2.110,30	0,4 g	70,34	55%	1. Šizofrenija i drugi psihotični poremećaji (F20-F29) 2. Manične, depresivne i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	rastvor za oralnu upotrebu	boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.667,30	5 mg	133,37	25%	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2070936	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 30 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.235,80	5 mg	205,97	25%	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Za indikacije pod 1. i 2. samo za osobe starije od 18 godina, Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1071710	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM	tableta	30 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	104,10	2,5 mg	8,68	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071711	N05BA06	lorazepam	LORAZEPAM	tableta	20 po 2,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	115,40	2,5 mg	5,77	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071720	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	66,70	10 mg	14,82	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071721	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM	tableta	blister, 30 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	89,20	10 mg	9,91	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071722	N05BA08	bromazepam	BROMAZEPAM	tableta	blister, 20 po 6 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	81,80	10 mg	6,82	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1071624	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	66,70	10 mg	14,82	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071626	N05BA08	bromazepam	LEXILIUM	tableta	blister, 30 po 3 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Makedonija	89,20	10 mg	9,91	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071320	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 1,5 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	66,70	10 mg	14,82	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071322	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	89,20	10 mg	9,91	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071324	N05BA08	bromazepam	LEXAURIN	tableta	blister, 30 po 6 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	122,80	10 mg	6,82	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071750	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 0,25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	58,10	1 mg	7,75	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1071751	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 0,50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	94,80	1 mg	6,32	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071752	N05BA12	alprazolam	KSALOL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	192,70	1 mg	6,42	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1077260	N05CD02	nitrazepam	NIPAM	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	60,10	5 mg	6,01	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1077196	N05CD02	nitrazepam	CERSON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	60,10	5 mg	6,01	90%		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071461	N05CD08	midazolam	FLORMIDAL	tableta	30 po 15 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	742,10	15 mg	24,74	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077151	N05CF02	zolpidem	STILNOX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	88,20	10 mg	4,41	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077301	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	86,80	10 mg	8,68	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077300	N05CF02	zolpidem	SANVAL	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	88,20	10 mg	4,41	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1077302	N05CF02	zolpidem	BELBIEN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	88,20	10 mg	4,41	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077311	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	86,80	10 mg	8,68	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077313	N05CF02	zolpidem	LUNATA	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	88,20	10 mg	4,41	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077401	N05CF03	zaleplon	ZAN	kapsula, tvrda	blister, 14 po 5 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	141,20	10 mg	20,17	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1077400	N05CF03	zaleplon	ZAN	kapsula, tvrda	blister, 14 po 10 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	276,60	10 mg	19,76	90%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072740	N06AA04	klomipramin	ANAFRANIL	obložena tableta	30 po 25 mg	Novartis Farma S.P.A.	Italija	279,30	0,1 g	37,24	75%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072910	N06AB05	paroksetin	SEROXAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Glaxo Wellcome Production; S.C. Europharm S.A.	Francuska; Rumunija	250,20	20 mg	8,34	15%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072613	N06AB10	escitalopram	CIPRALEX	film tableta	blister, 28 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	280,30	10 mg	10,01	20%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072141	N06AG02	moklobemid	AURORIX	film tableta	60 po 150 mg	Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S	Nemačka; Francuska	1.104,50	0,3 g	36,82	65%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1072782	N06AG02	moklobemid	AURORIX	film tableta	blister, 30 po 300 mg	Meda Pharma GmbH & Co.KG; Cenexi S.A.S; F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Nemačka; Francuska, Švajcarska	1.401,90	0,3 g	46,73	65%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072750	N06AX03	mianserin	TOLVON	film tableta	blister, 30 po 30 mg	N.V. Organon	Holandija	561,00	60 mg	37,40	65%	1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072631	N06AX05	trazodon	TRITTICO Retard	tableta sa produženim oslobađanjem	20 po 150 mg	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco S.P.A.	Italija	480,70	0,3 g	48,07	75%	1. Depresija (F32) 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1072705	N06AX11	mirtazapin	CALIXTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	301,50	30 mg	10,05	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072860	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blister, 30 po 15 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	303,00	30 mg	20,20	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072861	N06AX11	mirtazapin	REMIRTA	film tableta	blister, 30 po 30 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	301,50	30 mg	10,05	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089141	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 150 mg	Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG	Nemačka	1.179,60	300 mg	78,64	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1089140	N06AX12	bupropion	WELLBUTRIN XR	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	bočica, 30 po 300 mg	Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG	Nemačka	2.018,90	300 mg	67,30	85%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33.0; F33.1; F33.2; F33.4, F33.8; F33.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072600	N06AX14	tianeptin	COAXIL	obložena tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Les Laboratoires Servier	Francuska	500,70	37,5 mg	50,07	60%	1. Akutna depresivna epizoda (F32); 2. Rekurentna depresivna epizoda (F33).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072857	N06AX16	venlafaksin	VELAHIBIN	film tableta	blister, 28 po 37,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	311,20	0,1 g	29,64	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072858	N06AX16	venlafaksin	VELAHIBIN	film tableta	blister, 28 po 75 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	342,30	0,1 g	16,30	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072992	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 75 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	342,30	0,1 g	16,30	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072990	N06AX16	venlafaksin	ALVENTA	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 28 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	567,80	0,1 g	13,52	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072489	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 37,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	333,50	0,1 g	29,64	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072488	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	366,70	0,1 g	16,30	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072487	N06AX16	venlafaksin	VENLAX	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 150 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	608,40	0,1 g	13,52	50%	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1), 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Posttraumatski stresni poremećaji (F43.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079030	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	964,50	7,5 mg	51,67	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079031	N06DA02	donepezil	YASNAL	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1.221,20	7,5 mg	32,71	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079051	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	964,50	7,5 mg	51,67	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1079050	N06DA02	donepezil	TREGONA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.221,20	7,5 mg	32,71	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079501	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	964,50	7,5 mg	51,67	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079500	N06DA02	donepezil	DONEPEZIL ALVOGEN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.221,20	7,5 mg	32,71	60%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088012	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 1,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	3.247,30	9 mg	695,85	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088013	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 3 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	3.247,30	9 mg	347,93	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088014	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 4,5 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	3.247,30	9 mg	231,95	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1088015	N06DA03	rivastigmin	EXELON	kapsula, tvrda	blister, 28 po 6 mg	Novartis Farmaceutica S.A.	Španija	3.247,30	9 mg	173,96	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
2088016	N06DA03	rivastigmin	EXELON	oralni rastvor	bočica, 1 po 120 ml (2 mg/ml)	Novartis Pharma Services	Francuska	8.103,70	9 mg	303,89	75%	1. Alzheimerova bolest (G30; F00). 2. Demencija u Parkinsonovoj bolesti (F02.3)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
9088225	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	vrećica, 30 po 1 kom, 4,6 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	4.350,00	9 mg	283,70	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
9088226	N06DA03	rivastigmin	EXELON	transdermalni flaster	vrećica, 30 po 1 kom, 9,5 mg/24 h	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	4.350,00	9 mg	137,37	60%	Blago do umereno teška demencija Alchajmerovog tipa (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079020	N06DX01	memantin	EBIXA	film tableta	28 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	2.000,10	20 mg	142,86	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079022	N06DX01	memantin	EBIXA	film tableta	56 po 10 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	4.000,20	20 mg	142,86	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079027	N06DX01	memantin	EBIXA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	H. Lundbeck A/S	Danska	5.714,60	20 mg	204,09	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1079045	N06DX01	memantin	MEMANTIN TEVA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	2.143,00	20 mg	142,87	75%	Alzheimerova bolest (G30; F00).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1182030	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE	film tableta	blister, 7 po 50 mg	Haupt Pharma Wolftrathshausen GmbH	Nemačka	804,20	50 mg	114,89	75%	Održavanje opijatske zavisnosti (F11).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.
1182031	N07BB04	naltrekson	NALTREXONE	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Haupt Pharma Wolftrathshausen GmbH	Nemačka	3.216,50	50 mg	114,88	75%	Održavanje opijatske zavisnosti (F11).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1182051	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	382,20	8 mg	218,40	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - KC Niš- Klinika za psihijatriju - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
1182052	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	sublingvalna tableta	blister, 7 po 8 mg	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.424,80	8 mg	203,54	50%	Lečenje zavisnosti od opijata (F11).	Za supstituciju, lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za detoksikaciju, lek se uvodi i detoksikacija sprovodi isključivo u sledećim zdravstvenim ustanovama: - KC Kragujevac- Klinika za psihijatriju - KC Vojvodine- Klinika za psihijatriju - KC Niš- Klinika za psihijatriju - Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti u Beogradu.
7110022	R01AD01	beklometazon	BECONASE	sprej za nos, suspenzija	1 po 200 doza (50 mcg/doza)	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.	Poljska	359,80	0,4 mg	14,39	35%		
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Ltd. Velika Britanija	Republika Srbija	2.049,50	100 mcg	68,32	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45), 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4,5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.051,20	24 mcg	70,08	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	2.102,20	24 mcg	70,07	35%	1. Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju za indikacije pod tačkama 1. i 2. na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114670	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (100 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	2.338,80	2 inh.	77,96	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114671	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (250 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.033,40	2 inh.	101,11	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114672	R03AK06	flutikazon, salmeterol	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeljen	diskus, 1 po 60 doza (500 mcg/doza + 50 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	3.991,70	2 inh.	133,06	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1≤60% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114710	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (80 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	1.727,70	4 inh.	115,18	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114711	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (160 mcg + 4,5 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2.118,10	4 inh.	141,21	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	3.991,70	2 inh.	133,06	35%	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih kod kojih je postbronhodilatatorni FEV1<50% (J44).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije. Za indikaciju pod tačkom 2. mišljenje mora da sadrži vrednost postbronhodilatatornog FEV1.
7114246	R03AK07	beklometazon, formoterol	FOSTER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	pod pritiskom sa ventilom za doziranje, 1 po 180 doza (100 mcg/doza)	Chiesi Pharmaceutical s GmbH	Austrija	4.646,50	4 inh.	103,26	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	647,90	800 mcg	25,92	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114574	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (400 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.851,10	800 mcg	37,02	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO 160	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	sprej bočica sa dozerom, 1 po 60 doza (160 mcg/doza)	Nycomed GmbH	Nemačka	1.741,60	0,16 mg	29,03	20%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO 80	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	sprej-boca sa dozerom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	Nycomed GmbH	Nemačka	3.088,10	0,16 mg	51,47	20%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
7114730	R03BB04	tiotropium-bromid	SPIRIVA	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	blister, 30 po 18 mcg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	3.267,40	18 mcg	108,91	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114732	R03BB04	tiotropijum-bromid	SPIRIVA RESPIMAT	rastvor za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 potisaka (30 doza) (2.5 mcg/potisak)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	3.251,10	5 mcg	108,37	35%	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Merck Sharp & Dohme	Holandija	1.052,60	10 mg	37,59	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	1.052,60	10 mg	37,59	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114560	R03DC03	montelukast	MONTELUKAST PHARMAS	tableta	blister, 28 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	1.052,60	10 mg	37,59	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.052,60	10 mg	37,59	35%	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.
1119220	R03DX07	roflumilast	DAXAS	film tableta	blister, 30 po 500 mcg	Nycomed GmbH	Nemačka	4.042,10	0,5 mg	134,74	60%	Hronična opstruktivna bolest pluća, kao dodatna terapija, kod odraslih za teške i veoma teške (III ili IV stadijum) oblike bolesti sa čestim egzacerbacijama (dve ili više godišnje) (J44).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili interniste u službi pulmologije.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3058293	R06AX13	loratadin	LORATADIN	sirup	1 po 120 ml (5 mg/5 ml)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	231,10	10 mg	19,26	50%	1. Alergijski rinitis (J30.1-J30.4), 2. Hronična vazomotorna urtikarija (L 50.8)	Samo za decu stariju od 2 godine.
3114450	R06AX17	ketotifen	GALITIFEN	sirup	1 po 100 ml (1 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	154,60	2 mg	15,46	50%		Samo za decu stariju od 2 godine.
4090290	S01AD03	aciclovir	ZOVIRAX	mast za oči	tuba, 1 po 4,5 g (30 mg/g)	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	747,20	-	-	50%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7090852	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	kapi za oči	1 po 5 ml (3 mg/ml)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	247,30	-	-	75%	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
4090851	S01AX11	ofloksacin	FLOXAL	mast za oči	1 po 3 g (3 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	371,20	-	-	75%	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjuktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
7099200	S01BC01	indometacin	INDOCOLLYRE	kapi za oči	1 po 5 ml (1 mg/ml)	Laboratoire Chauvin S.A.; Dr Gerhard Mann, Chem. - Pharm. Fabrik GMBH	Francuska; Nemačka	500,50	-	-	75%		
7099150	S01BC03	diklofenak	UNICLOPHEN 0.1%	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,1%)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka Republika	470,80	-	-	75%		
7090790	S01CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za uši/oči, rastvor	bočica staklena, 5 ml (0,1% + 0,35%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	104,90	-	-	50%		
7090791	S01CA01	deksametazon, neomicin	DEXAMETHASON-NEOMYCIN	kapi za uši/oči, rastvor	bočica staklena, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	204,40	-	-	50%		
7090813	S01CA01	deksametazon, neomicin	NEODEKSACIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 10 ml (0,1% + 0,35%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	204,40	-	-	50%		
4090921	S01CA01	deksametazon, gentamicin	DEXAMYTREX	mast za oči	tuba, 1 po 3 g (0,3 mg/g + 5 mg/g)	Dr Gerhard Mann Chem. Pharm. Fabrik GmbH	Nemačka	260,20	-	-	50%		
7094070	S01EA05	brimonidin	ALPHAGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml 0,2%	Allergan Pharmaceutical s Ireland	Irska	354,10	0,2 ml	14,16	40%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7094080	S01EA05	brimonidin	BRIMONAL 0,2%	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0,2%)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	590,20	0,2 ml	11,80	25%		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A1 - Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099090	S01ED51	timolol, bimatoprost	GANFORT	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapljikom, 1 po 3 ml (5 mg/ml + 300 mcg/ml)	Allergan Pharmaceutical s Ireland	Irska	1.460,40	0,1 ml	48,68	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099145	S01EE03	bimatoprost	LUMIGAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapljikom, 1 po 3 ml, 0,01%	Allergan Pharmaceutical s Ireland	Irska	1.311,60	0,1 ml	43,72	25%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099190	S01EE04	travoprost	TRAVATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapljikom, 2,5 ml 40 mcg/ml	Alcon-Couvreur N.V.	Belgija	1.201,60	0,1 ml	48,06	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099195	S01EE05	tafluprost	SAFLUTAN	kapi za oči, rastvor	kontejner jednodozni, 30 po 0,3 ml (15 mcg/ml)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.439,20	0,3 ml	47,97	35%	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0128432	A02BA02	ranitidin	RANISAN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (10 mg/1 ml)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	193,10	0,3 g	231,72	-		
0128620	A02BA02	ranitidin	RANITIDIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	193,10	0,3 g	231,72	-		
0122120	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 40 mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica, LDA	Portugalija	328,40	20 mg	164,20	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122751	A02BC02	pentoprazol	CONTROLOC	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 40 mg	Takeda GmbH	Nemačka	242,00	40 mg	242,00	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122927	A02BC02	pentoprazol	NOLPAZA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 40 mg	Laboratorios Alcala Farma S.L.; Krika Tovarna Zdravil d.d.	Španija; Slovenija	242,00	40 mg	242,00	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122928	A02BC02	pentoprazol	NOLPAZA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 40 mg	Laboratorios Alcala Farma S.L.; Krika Tovarna Zdravil d.d.	Španija; Slovenija	1.210,00	40 mg	242,00	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122812	A02BC05	esomeprazol	NEXIUM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 40 mg	AstraZeneca AB	Švedska	541,30	30 mg	405,98	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0122813	A02BC05	esomeprazol	NEXIUM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 40 mg	AstraZeneca AB	Švedska	5.412,70	30 mg	405,95	-	STAC; Za lečenje akutnog nevariksnog krvarenja sa ograničenjem do tri dana (prvi dan do 6 ampula, a sledeća dva dana do 4 ampule na dan).	
0123140	A03BB01	hioscini-butilbromid	BUSCOPAN	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 1 ml (20 mg/1 ml)	Boehringer Ingelheim Espana S.A.	Španija	193,90	60 mg	96,95	-		
1123141	A03BB01	hioscini-butilbromid	BUSCOPAN	obložena tableta	blister, 20 po 10 mg	Delpharm Reims	Francuska	301,30	60 mg	90,39	-		
0123560	A03DA02	pitofenon, fenipiveninijum-bromid, metamilzol-natrijum	BARALGETAS	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (10 mg + 0,1 mg + 2500mg)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	111,20	-	-	-		
0124302	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 10 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	169,90	30 mg	50,97	-		
0124530	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 mg/2 ml	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1.585,40	16 mg	1.288,32	-	Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemo ili radioterapiju.	
0124573	A04AA02	granisetron	GRANISETRON-TEVA	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 1 ml, 1 mg/1 ml	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company	Mađarska	1.421,00	3 mg	852,80	-	STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemo ili radioterapiju.	
0124570	A04AA02	granisetron	GRANISETRON-TEVA	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 3 ml, 3 mg/3 ml	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company	Mađarska	2.249,30	3 mg	449,86	-	STAC; Lek se uvodi u terapiju kod povraćanja uz hemo ili radioterapiju.	
0124574	A04AA05	palonosetron	ALOXI	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd; PharmaSwiss d.o.o.	Irska; Republika Srbija	5.055,10	0,25 mg	5.055,10	-	STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa	
1124587	A04AD12	aprepitant	EMEND	kapsula, tvrda	blister, 1 po 125 mg, 2 po 80 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	5.777,00	95 mg	1.925,67		STAC; Prevencija akutne i odložene mučnine i povraćanja kod odraslih, koji su povezani sa izrazito emetogenom hemioterapijom karcinoma zasnovanom na cisplatinu u toku tri dana hemioterapije kod svakog ciklusa.	
0127452	A05BA...	ornitinaspartat	HEPA-MERZ	rastvor za infuziju	10 po (5 g/10 ml)	Merz Pharma GmbH	Nemačka	6.406,20	-	-	-	STAC	
3125300	A06AD65	makrogol 4000	FORTTRANS	prašak za oralni rastvor	kesica, 4 po 74 g	Beaufour Ipsen Industrie	Francuska	728,10	-	-	-	STAC; Hospitalna priprema pacijenata za kolonoskopiju i irigografiju.	
5129473	A07EC02	mesalazin	SALOFALK	rektalna suspenzija	bočica, 7 po 60 ml (4 g/60 ml)	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	3.115,80	1,5 g	166,91	-	Lečenje ulceroznog kolitisa (K51) kao monoterapija ili u kombinaciji sa kortikosteroidom.	
0051750	A11DA01	tiamin	VITAMIN B1 ALKALOID	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 1 ml (100 mg/1 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.905,10	50 mg	19,05	-		
0052184	A11EA...	vitamini B-kompleksa	BEVIPLEX	injekcija	5 po 2 ml (40 mg + 4 mg + 5 mg + 100 mg + 10 mg + 0,004 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	437,40	-	-	-		
0051845	A11GA01	askorbinska kiselina	VITAMIN C	injekcija	50 po 500 mg/5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.783,30	0,2 g	14,27	-		
0051351	A11HA02	pidoksil (vitamin B6)	BEDOXIN	injekcija	50 po 50 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	616,00	0,16 g	39,42	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0050150	A11JA..	retinol, fitomenadiol, ergokalciferol, tokoferol	VITALIPID N INFANT	koncentrat za emulziju za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)	Fresenius Kabi AB	Švedska	2.750,80	-	-	-	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Lek se primenjuje samo kod dece do 11 godina starosti.	
0050151	A11JA..	retinol, fitomenadiol, ergokalciferol, tokoferol	VITALIPID N ADULT	koncentrat za emulziju za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (194,1 mcg/ml + 15 mcg/ml + 0,5 mcg/ml + 0,91 mg/ml)	Fresenius Kabi AB	Švedska	2.187,80	-	-	-	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90).	
1174015	A16AA..	alfa-okso-(R,S)-izoleucin, kalcijumova so, alfa-okso-leucin, kalcijumova so, alfa-okso-fenilalanin, kalcijumova so, alfa-okso-valin, kalcijumova so, alfa-hidroksi-(R,S)-metionin, kalcijumova so, lizin, treonin, triptofan, histidin, tirozin	KETOSTERIL	film tableta	blister, 100 po (67 mg + 101 mg + 68 mg + 86 mg + 59 mg + 75 mg + 53 mg + 23 mg + 38 mg + 30 mg)	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Beijing; Fresenius Kabi Pharmaceutical Co. Ltd; Labesfal-Laboratorios Almiro S.A.	Nemačka; Kina; Portugalija	6.269,30	-	-	-	Prevenција i terapija ostećenja nastalih usled poremećaja metabolizma proteina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji uz smanjeni unos proteina putem hrane od 40g/dan (za odrasle) i manje, tj. kod pacijenata sa brzinom glomerularne filtracije (GFR) između 5 i 15 ml/min. Neophodna je primena Ketosteril tableta sve dok je GFR ispod 25 ml/min.	
0062035	B01AB01	heparin	HEPARIN	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5000 i.j./0,25 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	359,00	10000 i.j.	143,60	-		
0062036	B01AB01	heparin	HEPARIN	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5000 i.j./1 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	359,00	10000 i.j.	143,60	-		
0062037	B01AB01	heparin	HEPARIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 25000 i.j./5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	2.906,20	10000 i.j.	116,25	-		
0062039	B01AB01	heparin-natrijum	HEPARIN PANPHARMA	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 5 ml (25000 i.j./5 ml)	Panpharma u saradnji sa Rotexmedica GmbH, Nemačka	Francuska	2.906,20	10000 i.j.	116,25	-		
0062161	B01AB02	antitrombin III	ANTITROMBIN III BAXTER	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)	Baxter AG	Austrija	24.321,30	2100 i.j.	102.149,46	-	Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.	
0062162	B01AB02	antitrombin III	ANTITROMBIN III BAXTER	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	1 po 20 ml (1000 i.j./20 ml)	Baxter AG	Austrija	48.642,30	2100 i.j.	102.148,83	-	Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.	
0062170	B01AB02	antitrombin III	KYBERNIN P 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	libočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j.	CSL Behring GmbH	Nemačka	24.321,30	2100 i.j.	102.149,46	-	Profilaksa i lečenje tromboembolijskih komplikacija urođenog nedostatka antitrombina III.	
0062210	B01AB04	dalteparin-natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 10 po 2500 i.j./0,2 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	1.578,10	2500 i.j.	157,81	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanje srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA) 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoce i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062211	B01AB04	dalteparin-natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špic, 10 po 5000 i.j./0.2 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	2.923,90	2500 i.j.	146,20	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062212	B01AB04	dalteparin-natrijum	FRAGMIN	rastvor za injekciju/infuziju	napunjen injekcioni špic, 10 po 10000 i.j./1 ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	4.546,40	2500 i.j.	113,66	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062200	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špic, 2 po 20 mg (2000 i.j./0,2 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	390,80	2000 i.j.	195,40	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062201	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špic, 2 po 40 mg (4000 i.j./0,4 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	718,30	2000 i.j.	179,58	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođne leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062202	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špic, 2 po 60 mg (6000 i.j./0,6 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	941,90	2000 i.j.	156,98	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062203	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špic, 2 po 80 mg (8000 i.j./0,8 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	1.069,80	2000 i.j.	133,73	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062205	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špic sa iglom, 10 po 0,2 ml (2000 i.j./0,2 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	1.954,00	2000 i.j.	195,40	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062206	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špic sa iglom, 10 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)	Sanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	3.591,60	2000 i.j.	179,58	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062207	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,8 ml (6000 i.j./0,8 ml)	Sanoŕi Winthrop Industrie, Chinoŕin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	4.709,40	2000 i.j.	156,98	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajavanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062208	B01AB05	enoksaparin	CLEXANE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 10 po 0,8 ml (8000 i.j./0,8 ml)	Sanoŕi Winthrop Industrie; Chinoŕin Pharmaceutical Chemical Works Co.Ltd.	Francuska; Mađarska	5.348,90	2000 i.j.	133,72	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajavanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom. 6. U lečenju pacijenata sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI).	
0062300	B01AB06	nadroparin kalcijum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 10 po 0,3 ml (2850 i.j./0,3 ml)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1.793,90	2850 i.j.	179,39	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajavanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0062400	B01AB06	nadroparin kalcijum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 10 po 0,4 ml (3800 i.j./0,4 ml)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1.853,60	2850 i.j.	139,02	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajavanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pectoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0062302	B01AB06	nadroparin kalcijum	FRAXIPARINE	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 10 po 0,6 ml (5700 i.j./0,6 ml)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	2.693,60	2850 i.j.	134,68	-	1. Pre i postoperativna profilaksa tromboembolije kod visokorizičnih hirurških intervencija, ukupno do 35 dana 2. Lečenje tromboza dubokih vena u ambulantnim uslovima do postizanja terapijskog INR (2,0-3,0) uz paralelnu primenu oralnih antikoagulanasa na predlog specijaliste, u bolničkim uslovima i duže, u zavisnosti od procene odgovarajućeg specijaliste 3. Profilaksa kod bolesnika sa značajno povećanim rizikom od nastanka venske tromboembolije koji su privremeno imobilizirani zbog akutne bolesti (zatajivanja srca, respiratorne insuficijencije, teških infekcija) 4. Lečenje nestabilne angine pektoris, non Q infarkta miokarda i u sklopu protokola perkutanih koronarnih intervencija (PCI/PTCA). 5. Profilaksa venske tromboembolijske bolesti kod trudnica sa visokim rizikom tokom trudnoće i 6 nedelja postpartalno; Profilaksa ponovljenih gubitaka ploda kod trudnica sa prethodnim habitualnim pobačajima i utvrđenim naslednom trombofilijom ili antifosfolipidnim sindromom.	
0064052	B01AD01	streptokinaza	STREPTASE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1500000 i.j.	CSL Behring GmbH	Nemačka	11.879,70	1,5 M.i.j.	11.879,70	-		STAC
0064130	B01AD02	alteplaza	ACTILYSE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	liobočica sa rastvaračem, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	45.502,90	0,1 g	91.005,80	-		STAC
0064060	B01AD11	tenekteplaza	METALYSE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	107.562,00	40 mg	86.049,60	-		
1069615	B01AE07	dabigatraneteksilat	PRADAXA	kapsula, tvrda	blister, 10 po 75 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	1.421,20	220 mg	416,89	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
1069613	B01AE07	dabigatraneteksilat	PRADAXA	kapsula, tvrda	blister, 10 po 110 mg	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Nemačka	1.430,60	220 mg	286,12	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
0062420	B01AX05	fondaparinuks-natrijum	ARIXTRA	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 10 po 0,5 ml (2,5 mg/0,5 ml)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	4.739,40	2,5mg	473,94	-	1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (JA/NSTEMI) kod pacijenata kod kojih nije indikovano urgentno (manje 120 minuta) invazivno lečenje (PCI). 2. Infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se leče tromboliticima ili koji u početku ne smeju da dobiju drugi oblik reperfuzivne terapije.	
1069600	B01AX06	rivaroksaban	XARELTO	film tableta	blister, 10 po 10 mg	Bayer Healthcare AG	Nemačka	2.861,60	10 mg	286,16	-	Prevenција venske tromboembolije kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena.	STAC
0065040	B02AA02	traneksaminska kiselina	TRANEXAMIC MEDOCHEMIE	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 5 ml (500 mg/5 ml)	Medochemie Ltd.	Kipar	489,70	2 g	195,88	-	1. Lokaina fibrinoliza - kratkotrajna primena u profilaksi i lečenju kod pacijenata koji su pod velikim rizikom od krvarenja tokom i posle operacije kod prostatektomije, konizacije cerviksa i hirurških procedura i dentalnih ekstrakcija kod bolesnika sa hemofilijom; 2. Sistemska fibrinoliza - hemoragijske komplikacije povezane sa trombolitičkom terapijom i krvarenje povezano sa diseminovanom intravaskularnom koagulacijom, kod koje je predominantna aktivacija fibrinolitičkog sistema.	
0050970	B02BA01	fitomenadion (vitamin K1)	KONAKION MM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 mg/1 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	217,80	20 mg	87,12	-		
0050974	B02BA01	fitomenadion (vitamin K1)	KONAKION MM	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 mg/0,2 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	263,70	20 mg	527,40	-		
9067081	B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	BERIPLAST P Combi-Set 1ml	prašak i rastvarač za lepak za tkivo	bočica, 4 po 1 ml (90 mg+ 60 U + 1000 KIU + 500 i.j.+ 5,9 mg)/ml	CSL Behring GmbH	Nemačka	10.539,60	-	-	-		STAC
9067082	B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	BERIPLAST P Combi-Set 3ml	prašak i rastvarač za lepak za tkivo	bočica, 4 po 3 ml (270 mg+ 180 U + 3000 KIU + 1500 i.j.+ 17,7 mg)/3 ml	CSL Behring GmbH	Nemačka	30.916,30	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066014	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofilni faktor VII)	OCTANATE 250	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 po 5 ml (50 i.j./ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.	Austrija; Švedska; Francuska	13.863,80	500 i.j.	27.727,60	-		
0066012	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofilni faktor VII)	OCTANATE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 po (500 i.j.)/10 ml	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	25.413,30	500 i.j.	25.413,30	-		
0066013	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofilni faktor VII)	OCTANATE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H; Octapharma AB; Octapharma S.A.S.	Austrija; Švedska; Francuska	50.614,40	500 i.j.	25.307,20	-		
0066102	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofilni faktor VII)	EMOCLOT	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	liobočica sa rastvaračem, 1 po 500 i.j./10 ml rastv.	Kedrion S.P.A.	Italija	25.413,30	500 i.j.	25.413,30	-		
0066103	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofilni faktor VII)	EMOCLOT	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	liobočica sa rastvaračem, 1 po 1000 i.j./10 ml rastv.	Kedrion S.P.A.	Italija	50.747,60	500 i.j.	25.373,80	-		
0066610	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofilni faktor VII)	BERIATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	13.862,80	500 i.j.	27.725,60	-		
0066611	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofilni faktor VII)	BERIATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	25.413,30	500 i.j.	25.413,30	-		
0066612	B02BD02	koagulacioni faktor VII (antihemofilni faktor VII)	BERIATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)	ZLB Behring GmbH	Nemačka	50.747,60	500 i.j.	25.373,80	-		
0066630	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	HAEMOCTIN SDH	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica, 1 po 250 i.j. (50 i.j./ml + 5ml vode za inj.)	Biotech Pharma GmbH	Nemačka	13.862,80	500 i.j.	27.725,60	-		
0066631	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	HAEMOCTIN SDH	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica, 1 po 500 i.j. (50 i.j./ml + 10ml vode za inj.)	Biotech Pharma GmbH	Nemačka	25.413,30	500 i.j.	25.413,30	-		
0066632	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	HAEMOCTIN SDH	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica, 1 po 1000 i.j. (100 i.j./ml + 10 ml vode za inj.)	Biotech Pharma GmbH	Nemačka	50.747,60	500 i.j.	25.373,80	-		
0066907	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	KOATE-DVI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml)	Grifols Therapeutics INC.	SAD	13.862,80	500 i.j.	27.725,60	-		
0066908	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	KOATE-DVI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml)	Grifols Therapeutics INC.	SAD	25.413,30	500 i.j.	25.413,30	-		
0066906	B02BD02	koagulacioni faktor VII, humani	KOATE-DVI	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)	Grifols Therapeutics INC.	SAD	50.747,60	500 i.j.	25.373,80	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066905	B02BD02	oktokog alfa (humani faktor koagulacije VIII, rekombinantni)	KOGENATE BAYER	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liubočica sa rastvaračem u špricu sa bio-set priborom, 1 po 2,5 ml (500 i.j./2,5 ml)	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.	Italija	25.413,30	500 i.j.	25.413,30	-		
0066903	B02BD02	oktokog alfa	KOGENATE BAYER	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liubočica sa rastvaračem u špricu sa bio-set priborom, 1 po 2,5 ml (250 i.j./2,5 ml)	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.	Italija	13.862,80	500 i.j.	27.725,60	-		
0066901	B02BD02	oktokog alfa	KOGENATE BAYER	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liubočica sa rastvaračem u špricu sa bio-set priborom, 1 po 2,5 ml (1000 i.j./2,5 ml)	Bayer Healthcare Manufacturing S.R.L.	Italija	50.747,60	500 i.j.	25.373,80	-		
0066909	B02BD02	oktokog alfa	RECOMBIMATE 250	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liubočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (250 i.j./10 ml)	Baxter S.A.	Belgija	13.862,80	500 i.j.	27.725,60	-		
0066910	B02BD02	oktokog alfa	RECOMBIMATE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liubočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)	Baxter S.A.	Belgija	25.413,30	500 i.j.	25.413,30	-		
0066911	B02BD02	oktokog alfa	RECOMBIMATE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liubočica sa rastvaračem (komplet BAXJECT II), 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml)	Baxter S.A.	Belgija	50.747,60	500 i.j.	25.373,80	-		
0066770	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (250 i.j./4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	13.862,80	500 i.j.	27.725,60			
0066771	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (500 i.j./4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	25.413,30	500 i.j.	25.413,30			
0066772	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (1000 i.j./4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	50.747,60	500 i.j.	25.373,80			
0066773	B02BD02	moroktokog alfa	REFACTO AF	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i napunjeni injekcioni špric, 1 po 4 ml (2000 i.j./4 ml)	Wyeth Farma S.A.	Španija	101.495,20	500 i.j.	25.373,80			
0066044	B02BD03	antiinhibitorski kompleks faktora VIII	FEIBA NF	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	1 po 20 ml (500 i.j./20 ml)	Baxter AG	Austrija	47.306,70	10000 i.j.	946.134,00	-	Za dokazane inhibitore na koagulacioni faktor VIII i faktor IX, na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.	
0066007	B02BD04	koagulacioni faktor IX	OCTANINE F	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po (500 i.j.)5 ml	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	22.972,20	350 i.j.	16.080,54	-		
0066010	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	AIMAFIX	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	liubočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (500 i.j./10 ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	22.972,20	350 i.j.	16.080,54	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066171	B02BD04	humani faktor koagulacije IX	IMMUNINE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	1 po 600 i.j./5 ml	Baxter AG	Austrija	27.566,60	350 i.j.	16.080,52	-		
0066008	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	BERININ P	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (600 i.j./5 ml)	CSL Behring GmbH	Nemačka	27.566,60	350 i.j.	16.080,52	-		
0066502	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	HAEMONINE 250	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (50 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	11.486,10	350 i.j.	16.080,54	-		
0066501	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	HAEMONINE 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (100 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	22.972,20	350 i.j.	16.080,54	-		
0066500	B02BD04	koagulacioni faktor IX, humani	HAEMONINE 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	45.944,40	350 i.j.	16.080,54	-		
0066200	B02BD06	faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (VWF:Rco),(antih emofilni faktor VIII)	HAEMATE P 250	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 250i.j./5ml+600i.j./5ml	CSL Behring GmbH	Nemačka	18.240,90	7200 i.j.	525.337,92	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066201	B02BD06	faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (VWF:Rco),(antih emofilni faktor VIII)	HAEMATE P 500	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 500i.j./10ml+1200i.j./10ml	CSL Behring GmbH	Nemačka	36.481,80	7200 i.j.	525.337,92	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066202	B02BD06	faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (VWF:Rco),(antih emofilni faktor VIII)	HAEMATE P 1000	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1000i.j./15ml+2400i.j./15ml	CSL Behring GmbH	Nemačka	72.963,50	7200 i.j.	525.337,20	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066700	B02BD06	faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof)	WILATE 450	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 5 ml (450 i.j./5 ml + 400 i.j./5 ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	36.481,80	7200 i.j.	525.337,92	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066701	B02BD06	faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (VWF:RCof)	WILATE 900	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	liobočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 10 ml (900 i.j./10 ml + 800 i.j./10 ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	72.963,50	7200 i.j.	525.337,20	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066153	B02BD06	faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (VWF:Rco),(antih emofilni faktor VIII)	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 po (250 i.j.+ 125 i.j.) sa 5 ml rastvarača	Baxter AG	Austrija	12.652,60	7200 i.j.	364.394,88	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066154	B02BD06	faktor VIII, von Willebrand-ov faktor (VWF:Rco),(antih emofilni faktor VIII)	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 po (500 i.j.+ 250 i.j.) sa 5 ml rastvarača	Baxter AG	Austrija	25.305,20	7200 i.j.	364.394,88	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0066210	B02BD06	koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (VWF-Rcof)	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (250 i.j./5 ml + 190 i.j./5 ml)	Baxter AG	Austrija	12.652,60	7200 i.j.	364.394,88	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066212	B02BD06	koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (VWF-Rcof)	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5 ml (500 i.j./5 ml + 375 i.j./5 ml)	Baxter AG	Austrija	25.305,20	7200 i.j.	364.394,88	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066211	B02BD06	koagulacioni faktor VIII, humani, von Willebrand-ov faktor (VWF-Rcof)	IMMUNATE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 po 10 ml (1000 i.j./10 ml + 750 i.j./10 ml)	Baxter AG	Austrija	50.610,40	7200 i.j.	364.394,88	-	Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa kongenitalnom (hemofilija A) ili stečenom deficijencijom faktora VIII, Von Willebrandova bolest sa deficijencijom faktora VIII.	
0066602	B02BD08	eptakog alfa (aktivirani)	NOVOSEVEN	prašak i rastvarač za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem 1 po 1,1 ml (1 mg/1,1 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	69.526,50	2500000 i.j.	1.529,58	-	Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, te urođeni deficit faktora VII na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.	
0060250	B03AC02	gvožđe (II) hidroksid saharoza kompleks	FERROVIN	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 100 mg/5 ml	Rafarm S.A.	Grčka	4.937,80	0,1 g	987,56	-		STAC
0051560	B03BA03	hidrokskobalam in	OH12	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2500 mcg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	361,10	20 mcg	0,58	-		
0179350	B05AA01	albumin	HUMAN ALBUMIN OCTAPharma 5%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 250 ml 5%	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	4.561,50	-	-	-	STAC; Nadoknada volumenta; druga linija terapije (kada je primena artificialnih koloida kontraindikovana ili kada je postignuta maksimalna doza za koloida); opekotine; hiperbilirubinemija kod neonatusa i terapijska zamena plazme.	
0179351	B05AA01	albumin	HUMAN ALBUMIN OCTAPharma 20%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 50 ml 20%	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	3.648,00	-	-	-		STAC
0179315	B05AA01	albumin	HUMAN ALBUMIN 20% BAXTER	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml 20%	Baxter AG	Austrija	3.648,00	-	-	-		STAC
0179323	B05AA01	albumin	UMAN ALBUMIN	rastvor za infuziju	1 po 50 ml 20%	Kedron S.P.A.	Italija	3.648,00	-	-	-		STAC
0179046	B05AA01	albumin, humani	LJUDSKI ALBUMIN 20%	rastvor za infuziju	1 po 10 ml 20%	Institut za transfuziju krvi Srbije	Republika Srbija	729,50	-	-	-		STAC
0179048	B05AA01	albumin, humani	LJUDSKI ALBUMIN 20%	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (20%)	Institut za transfuziju krvi Srbije	Republika Srbija	3.648,00	-	-	-		STAC
0179190	B05AA01	albumin	HUMAN ALBUMIN 20% BEHRING	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (20%)	CSL Behring GmbH	Nemačka	3.648,00	-	-	-		STAC
0179360	B05AA01	albumin, humani	ALBIOMIN 20%	rastvor za infuziju	staklena bočica, 1 po 50 ml (20%)	Biofest Pharma GmbH	Nemačka	3.648,00	-	-	-		STAC
0179345	B05AA07	hidroksietilskrob, natrijum hlorid	HETASORB 6%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml (60 g/l + 9 g/l)	Hemoform a.d.	Republika Srbija	424,30	-	-	-		STAC
0179346	B05AA07	hidroksietil skrob, natrijum hlorid	HETASORB 10%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml (100 g/l + 9 g/l)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	694,50	-	-	-		STAC
0179355	B05AA07	hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina	TETRASPAN 6%	rastvor za infuziju	boca plastična, 10 po 500 ml (60 g/l + 6.252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3.266 g/l + 671 mg/l)	B.Braun Medical SA	Švajcarska	6.516,50	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0179356	B05AA07	hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina	TETRASPAN 6%	rastvor za infuziju	kesa, 20 po 250 ml (50 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)	B.Braun Medical SA	Švajcarska	8.283,30	-	-	-		STAC
0179357	B05AA07	hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina	TETRASPAN 6%	rastvor za infuziju	kesa, 20 po 500 ml (50 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)	B.Braun Medical SA	Švajcarska	13.033,00	-	-	-		STAC
0179358	B05AA07	hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina	TETRASPAN 10%	rastvor za infuziju	kesa, 20 po 250 ml (100 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)	B.Braun Medical SA	Švajcarska	10.829,70	-	-	-		STAC
0179359	B05AA07	hidroksietilskrob, natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-acetat, jabučna kiselina	TETRASPAN 10%	rastvor za infuziju	kesa, 20 po 500 ml (100 g/l + 6,252 g/l + 298,4 mg/l + 367,5 mg/l + 203,3 mg/l + 3,266 g/l + 671 mg/l)	B.Braun Medical SA	Švajcarska	13.782,70	-	-	-		STAC
0174030	B05BA01	alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacijska sirsćetna kiselina, treonin, triptofan, valin	HEPASOL 8%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (4,84 g/l + 10,72 g/l + 0,52 g/l + 0,88 g/l + 5,82 g/l + 2,8 g/l + 10,4 g/l + 13,09 g/l + 6,88 g/l + 1,1 g/l + 5,73 g/l + 2,24 g/l + 4,42 g/l + 4,4 g/l + 0,7 g/l + 10,08 g/l)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	554,70	-	-	-		STAC
0174041	B05BA01	aminokiseline	VAMINOLACT	rastvor za infuziju	12 po 100 ml	Fresenius Kabi	Austrija	12.968,00	-	-	-		STAC
0174037	B05BA01	alanin, prolin, glicin, arginin, Na-glicerilfosfat, jabučna kiselina	AMINOSOL 10% E	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	630,00	-	-	-		STAC
0174036	B05BA01	leucin, alanin, arginin, glicin, prolin, lizin...	AMINOSOL 15%	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	667,80	-	-	-		STAC
0174035	B05BA01	aminokiseline	AMINOSOL 10%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	441,00	-	-	-		STAC
0171110	B05BA02	sojino ulje, fosfolipidi, glicerol	LIPOVENOES 10% PLR	emulzija za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	18.140,00	-	-	-		STAC
0171291	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	rastvor za infuziju	10 po 100 ml (plastika)	Fresenius Kabi AB	Švedska	4.793,20	-	-	-		STAC
0171287	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	rastvor za infuziju	1 po 250 ml (plastika) 20%	Fresenius Kabi AB	Švedska	968,40	-	-	-		STAC
0171289	B05BA02	ulje soje prečišćeno	INTRALIPID	rastvor za infuziju	1 po 500 ml (plastika) 20%	Fresenius Kabi AB	Švedska	1.281,40	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171310	B05BA02	ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%	emulzija za infuziju	boca, 10 po 100 ml (100 g/l + 100 g/l)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	4.647,70	-	-	-		STAC
0171311	B05BA02	ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%	emulzija za infuziju	boca, 10 po 250 ml (100 g/l + 100 g/l)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	10.146,30	-	-	-		STAC
0171312	B05BA02	ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca	LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%	emulzija za infuziju	boca, 10 po 500 ml (100 g/l + 100 g/l)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	12.701,90	-	-	-		STAC
0173220	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 5%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (5%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	62,50	-	-	-		
0173225	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (10%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	77,50	-	-	-		
0173500	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 5%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (5%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	62,50	-	-	-		
0173501	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (10%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	77,50	-	-	-		
0173130	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 5%	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	62,50	-	-	-		
0173131	B05BA03	glukoza	GLUCOSI INFUNDIBILE 10%	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	77,50	-	-	-		
0173306	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5%	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 100 ml (50 g/l)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemačka; Španija	1.128,50	-	-	-		
0173900	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESENIUS	rastvor za infuziju	boca staklena, 49 po 100 ml (5%)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	2.764,80	-	-	-		
0173901	B05BA03	glukoza	GLUCOSE 5% FRESENIUS	rastvor za infuziju	boca staklena, 20 po 500 ml (5%)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	1.249,20	-	-	-		
0173550	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 100 ml (5%)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija	56,40	-	-	-		
0173551	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 250 ml (5%)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija	60,20	-	-	-		
0173552	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (5%)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija	62,50	-	-	-		
0173553	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 5%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 1000 ml (5%)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija	140,90	-	-	-		
0173554	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 250 ml (10%)	Bieffe Medital S.A.	Španija	75,40	-	-	-		
0173556	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (10%)	Bieffe Medital S.A.	Španija	77,50	-	-	-		
0173557	B05BA03	glukoza	GLUKOZA 10%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 1000 ml (10%)	Bieffe Medital S.A.	Španija	170,40	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0174040	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, acetilcistein, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, glicin, alanin, prolin, serin, glajalna sirćelna kiselina	AMINOSTERIL N-Hepa 8%	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	10.222,60	-	-	-		STAC
0171300	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	5 po 1026 ml (900 kcal)	Fresenius Kabi	Austrija	9.838,30	-	-	-		STAC
0171301	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, ulje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	4 po 1540 ml (1400 kcal)	Fresenius Kabi	Austrija	10.889,50	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171306	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, uje soje	KABIVEN	emulzija za infuziju	3 po 2566 ml (2300 kcal)	Fresenius Kabi	Švedska	16.236,70		-			STAC
0171303	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, uje soje	KABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	4 po 1440 ml (1000 kcal)	Fresenius Kabi	Austrija	10.789,40		-			STAC
0171305	B05BA10	glukoza, alanin, arginin, aspartanska kiselina, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, kalcijum-hlorid, natrijum-glicerofosfat, magnezijum-sulfat, kalijum-hlorid, natrijum-acetat, uje soje	KABIVEN PERIPHERAL	emulzija za infuziju	3 po 2400 ml (1700 kcal)	Fresenius Kabi	Švedska	11.346,60		-			STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171121	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N4-550E	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 2000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)	Baxter S.A.	Belgija	15.081,30	-	-	-		STAC
0171120	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N4-550E	emulzija za infuziju	kesa, 6 po 1000 ml (11,39g/l + 6,33g/l + 5,67g/l + 2,64g/l + 3,3g/l + 4,02g/l + 3,19g/l + 2,2g/l + 3,08g/l + 3,74g/l + 2,75g/l + 2,31g/l + 0,99g/l + 0,22g/l + 3,19g/l + 2,45g/l + 5,36g/l + 2,98g/l + 1,12g/l + 200g/l + 0,74g/l + 100g/l)	Baxter S.A.	Belgija	15.743,70	-	-	-		STAC
0171122	B05BA10	alanin, arginin, glicin, histidin, izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum-glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N6-900E	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 2000 ml (17,6g/l + 9,78g/l + 8,76g/l + 4,09g/l + 5,1g/l + 6,21g/l + 4,93g/l + 3,4g/l + 4,76g/l + 5,78g/l + 4,25g/l + 3,57g/l + 1,53g/l + 0,34g/l + 4,93g/l + 6,12g/l + 5,36g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 300g/l + 0,74g/l + 200g/l)	Baxter S.A.	Belgija	17.669,10	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171123	B05BA10	alanin, arginin,glicin,histi din,izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum- glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum- hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N7- 1000E	emulzija za infuziju	kesa, 6 po 1000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,8g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,38g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	Baxter S.A.	Belgija	17.770,30	-	-	-		STAC
0171124	B05BA10	alanin, arginin,glicin,histi din,izoleucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin, valin, natrijum-acetat, natrijum- glicerofosfat, kalijum-hlorid, magnezijum- hlorid, glukoza, kalcijum-hlorid, maslinovo i sojino ulje, mešavina	OLICLINOMEL N7- 1000E	emulzija za infuziju	kesa, 4 po 2000 ml (20,7g/l + 11,5g/l + 10,3g/l + 4,8g/l + 6g/l + 7,3g/l + 5,8g/l + 4g/l + 5,8g/l + 6,8g/l + 5g/l + 4,2g/l + 1,8g/l + 0,4g/l + 5,8g/l + 6,12g/l + 5,38g/l + 4,47g/l + 1,12g/l + 400g/l + 0,74g/l + 200g/l)	Baxter S.A.	Belgija	16.511,50	-	-	-		STAC
0174203	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum- acetat, natrijum- hidroksid, kalijum- acetat, magnezijum- hlorid, dinatrijum- fosfat	AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 500 ml (5g/l, 8,9g/l, 6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l, 4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l, 11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l, 12g/l, 5,8g/l, 7,2g/l, 5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l, 2,858g/l, 0,38g/l, 2,453g/l, 0,508g/l, 3,581g/l	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	7.215,90	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0174202	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, tirozin, natrijum-acetat, natrijum-hidroksid, kalijum-acetat, magnezijum-hlorid, dinatrijum-fosfat	AMINOPLASMAL B.BRAUN 10% E	rastvor za infuziju	boca staklena, 6 po 1000 ml (5g/l, 8,9g/l, 6,85g/l, 4,4g/l, 4,7g/l, 4,2g/l, 1,6g/l, 6,2g/l, 11,5g/l, 3g/l, 10,5g/l, 12g/l, 5,8g/l, 7,2g/l, 5,5g/l, 2,3g/l, 0,4g/l, 2,858g/l, 0,36g/l, 2,453g/l, 0,508g/l, 3,581g/l	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	8.661,90	-	-	-		STAC
0171320	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PERI	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1250 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g/l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	13.973,50	-	-	-		STAC
0171321	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PERI	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1875 ml (1,872 g/l + 2,504 g/l + 2,272 g/l + 1,568 g/l + 2,808 g/l + 1,456 g/l + 0,456 g/l + 2,08 g/l + 2,16 g/l + 1,352 g/l + 3,88 g/l + 1,32 g/l + 1,2 g/l + 2,8 g/l + 2,72 g/l + 2,4 g/l + 0,64 g/l + 0,865 g/l + 0,435 g/l + 2,354 g/l + 0,515 g/l + 0,353 g/l + 70,4 g/l + 0,936 g/l + 5,28 g/l + 20 g/l + 20 g/l	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	16.768,10	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171322	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PERI	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 2500 ml (1.872 g/l + 2.504 g/l + 2.272 g/l + 1.568 g/l + 2.808 g/l + 1.456 g/l + 0.456 g/l + 2.08 g/l + 2.16 g/l + 1.352 g/l + 3.88 g/l + 1.32 g/l + 1.2 g/l + 2.8 g/l + 2.72 g/l + 2.4 g/l + 0.64 g/l + 0.865 g/l + 0.435 g/l + 2.354 g/l + 0.515 g/l + 0.353 g/l + 70.4 g/l + 0.936 g/l + 5.28 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	21.239,70	-	-	-		STAC
0171323	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID PLUS	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1250 ml (2.256 g/l + 3.008 g/l + 2.728 g/l + 1.88 g/l + 3.368 g/l + 1.744 g/l + 0.544 g/l + 2.496 g/l + 2.592 g/l + 1.624 g/l + 4.656 g/l + 1.584 g/l + 1.44 g/l + 3.368 g/l + 3.264 g/l + 2.88 g/l + 0.781 g/l + 0.402 g/l + 0.222 g/l + 2.747 g/l + 0.686 g/l + 0.47 g/l + 132 g/l + 1.872 g/l + 5.264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	16.835,20	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171324	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, uje soje	NUTRIFLEX LIPID PLUS	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1875 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	20.121,80	-	-	-		STAC
0171325	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, uje soje	NUTRIFLEX LIPID PLUS	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 2500 ml (2,256 g/l + 3,008 g/l + 2,728 g/l + 1,88 g/l + 3,368 g/l + 1,744 g/l + 0,544 g/l + 2,496 g/l + 2,592 g/l + 1,624 g/l + 4,656 g/l + 1,584 g/l + 1,44 g/l + 3,368 g/l + 3,264 g/l + 2,88 g/l + 0,781 g/l + 0,402 g/l + 0,222 g/l + 2,747 g/l + 0,686 g/l + 0,47 g/l + 132 g/l + 1,872 g/l + 5,264 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	26.829,00	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171326	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID SPECIAL	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1250 ml (3,284 g/l + 4,384 g/l + 3,98 g/l + 2,736 g/l + 4,916 g/l + 2,54 g/l + 0,8 g/l + 3,604 g/l + 3,78 g/l + 2,368 g/l + 6,792 g/l + 2,312 g/l + 2,1 g/l + 4,908 g/l + 4,76 g/l + 4,2 g/l + 1,171 g/l + 0,378 g/l + 0,25 g/l + 3,689 g/l + 0,91 g/l + 0,623 g/l + 158,4 g/l + 2,496 g/l + 7,024 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	20.540,90	-	-	-		STAC
0171327	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRIFLEX LIPID SPECIAL	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 1875 ml (3,284 g/l + 4,384 g/l + 3,98 g/l + 2,736 g/l + 4,916 g/l + 2,54 g/l + 0,8 g/l + 3,604 g/l + 3,78 g/l + 2,368 g/l + 6,792 g/l + 2,312 g/l + 2,1 g/l + 4,908 g/l + 4,76 g/l + 4,2 g/l + 1,171 g/l + 0,378 g/l + 0,25 g/l + 3,689 g/l + 0,91 g/l + 0,623 g/l + 158,4 g/l + 2,496 g/l + 7,024 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	21.484,20	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0171328	B05BA10	izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, arginin, histidin, alanin, glicin, aspartanska kis, glutaminska kis, prolin, serin, natrijum-hidroksid, natrijum-hlorid, natrijum-acetat, kalijum-acetat, magnezijum-acetat, kalcijum-hlorid, glukoza, natrijum-dihidrogenfosfat, cink-acetat, trigliceridi, srednje dužine lanca, ulje soje	NUTRI/FLEX LIPID SPECIAL	emulzija za infuziju	kesa, 5 po 2500 ml (3,284 g/l + 4,384 g/l + 3,98 g/l + 2,736 g/l + 4,916 g/l + 2,54 g/l + 0,8 g/l + 3,604 g/l + 3,78 g/l + 2,368 g/l + 6,792 g/l + 2,312 g/l + 2,1 g/l + 4,908 g/l + 4,76 g/l + 4,2 g/l + 1,171 g/l + 0,378 g/l + 0,25 g/l + 3,689 g/l + 0,91 g/l + 0,623 g/l + 158,4 g/l + 2,496 g/l + 7,024 g/l + 20 g/l + 20 g/l)	B.Braun Melsungen AG	Nemačka	29.064,80	-	-	-		STAC
0175260	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)	rastvor za infuziju	boca plasticka, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	73,40	-	-	-		
0175400	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid	RINGEROV RASTVOR	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	73,40	-	-	-		
0175515	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMP. (Ringerov rastv)	rastvor za infuziju	boca plasticka, 1 po 500 ml (8,6 g/l+0,3 g/l+ 0,33 g/l)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	73,40	-	-	-		
0175331	B05BB01	natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid	RINGEROV RASTVOR	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (8,6 g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Velika Britanija; Belgija	73,40	-	-	-		
0175330	B05BB01	natrijum hlorid, kalcijum hlorid, kalijum hlorid	RINGEROV RASTVOR	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 1000 ml (8,6 g/l + 0,33 g/l + 0,3 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Velika Britanija; Belgija	161,20	-	-	-		
0175410	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, natrijum laktat	HARTMANOV RASTVOR	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	80,60	-	-	-		
0175185	B05BB01	natrijum-hlorid, kalcijum-hlorid, natrijum-laktat	HARTMANOV RASTVOR	rastvor za infuziju	boca, 1 po 500 ml (6,02 g/l + 0,373 g/l + 0,294 g/l + 3,25 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	80,60	-	-	-		
0175420	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat	HARTMANOV RASTVOR	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Velika Britanija; Belgija	80,60	-	-	-		
0175421	B05BB01	natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat	HARTMANOV RASTVOR	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 1000 ml (6 g/l + 0,4 g/l + 0,27 g/l + 3,2 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Velika Britanija; Belgija	128,80	-	-	-		
0400430	B05BC01	manitol	MANITOL	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml 20%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	151,10	-	-	-		
0400431	B05BC01	manitol	MANITOL	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml 10%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	163,20	-	-	-		
9175213	B05CX10	manitol, sorbitol	ISPIROL	rastvor za ispiranje bešike	kesa, 5 l (5,4 g/l + 27 g/l)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.315,70	-	-	-		
9175730	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (13,6 g/l+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z.o.o.	SAD; Irska; Poljska	798,30	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9175731	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2500 ml (13,6 g/l+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z o.o.	Irska; Poljska	919,00	-	-	-		
9175732	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 5000 ml (13,6 g/l+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z o.o.	SAD; Irska; Poljska	1.273,70	-	-	-		
9175733	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (22,7 g/l+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z o.o.	SAD; Irska; Poljska	798,30	-	-	-		
9175734	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2500 ml (22,7 g/l+5,38 g/l+4,48 g/l+0,184 g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z o.o.	Irska; Poljska	919,00	-	-	-		
9175735	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 5000 ml (22,7g/l+5,38g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)	Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z o.o.	SAD; Irska; Poljska	1.273,70	-	-	-		
9175736	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (38,6g/l+5,38g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)	Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z o.o.	SAD; Irska; Poljska	798,30	-	-	-		
9175737	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2500 ml (38,6g/l+5,38g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)	Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z o.o.	Irska; Poljska	919,00	-	-	-		
9175738	B05D...	glukoza, natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	DIANEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 5000 ml (38,6g/l+5,38g/l+4,48g/l+0,184g/l+0,051g/l)	Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.; Baxter Manufacturing Sp.z o.o.	SAD; Irska; Poljska	1.273,70	-	-	-		
9175739	B05D...	tirozin, triptofan, fenilalanin, treonin, serin, prolin, glicin, alanin, valin, metionin, zoleucin, leucin, lizin, histidin, arginin, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, natrijum-laktat, natrijum-hlorid	NUTRINEAL PD4	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (0,3g/l+0,27g/l+0,57g/l+0,646g/l+0,51g/l+0,595g/l+0,51g/l+0,951g/l+1,393g/l+0,85g/l+0,85g/l+1,02g/l+0,955g/l+0,714g/l+1,071g/l+0,184g/l+0,0508g/l+4,48g/l+5,38g/l)	Baxter Healthcare S.A.	Irska	1.538,90	-	-	-		
9175741	B05D...	ikodekstrin, natrijum-hlorid, natrijum(S)-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid	EXTRANEAL	rastvor za peritonealnu dijalizu	plastična kesa 1 po 2000 ml (75g/l+5,4g/l+4,5g/l+0,257g/l+0,051 g/l)	Baxter Healthcare Corporation; Baxter Healthcare S.A.	SAD; Irska	2.241,30	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9175716	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 1.5% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.517,10	-	-	-		
9175717	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 2.3% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.517,10	-	-	-		
9175718	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 4.25% glukoze,1.25 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42.5 g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.517,10	-	-	-		
9175743	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 1.5% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.517,10	-	-	-		
9175744	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 2.3% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.517,10	-	-	-		
9175745	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	BALANCE 4.25% glukoze,1.75 mmol/l kalcijuma	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.64g/l + 3.925g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.517,10	-	-	-		
9175720	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 17 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.269,40	-	-	-		
9175722	B05D..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 18 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.269,40	-	-	-		
9175724	B05D..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 19 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.269,40	-	-	-		
9175753	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 2 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 15g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.440,30	-	-	-		
9175755	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 3 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.440,30	-	-	-		
9175757	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 4 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2000 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.440,30	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9175754	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 2 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 15g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.089,20	-	-	-		
9175756	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 3 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.089,20	-	-	-		
9175758	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 4 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	3.089,20	-	-	-		
9175721	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 17 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 15g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.836,70	-	-	-		
9175723	B05D..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 18 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.786g/l + 7.847g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 42.5g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.836,70	-	-	-		
9175725	B05D..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 19 Stay safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 4 po 2500 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.1838g/l + 0.1017g/l + 22.73g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.836,70	-	-	-		
9175117	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 2 Sleep safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 15 g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.615,10	-	-	-		
9175119	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 3 Sleep safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 42.5 g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.615,10	-	-	-		
9175118	B05DB..	natrijum-hlorid, natrijum-laktat, kalcijum-hlorid, magnezijum-hlorid, glukoza	CAPD 4 Sleep safe	rastvor za peritonealnu dijalizu	kesa, 2 po 5000 ml (5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573g/l + 0.1017g/l + 22.73 g/l)	Fresenius Medical Care Deutschland GmbH	Nemačka	2.615,10	-	-	-		
0175150	B05XA01	kalcijum hlorid	KALIUM CHLORID FRESENIUS	koncentrat za rastvor za infuziju	20 po 20 ml (1 mmol/ml)	Fresenius Kabi Norge	Norveška	972,70	-	-	-		
0133110	B05XA02	natrijum hidrogenkarbonat	NATRIUMBICARBONAT FRESENIUS	rastvor za infuziju	bočica, 10 po 100 ml	Fresenius Kabi Austria GmbH	Austrija	2.488,40	-	-	-		
0175510	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml 9g/l	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	66,90	-	-	-		
0175180	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml 9g/l	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	66,90	-	-	-		
0175240	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	rastvor za infuziju	boca plastična, 1 po 500 ml 0.9%	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	66,90	-	-	-		
0175516	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 250 ml (9g/l)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	54,70	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0175312	B05XA03	natrijum hlorid	SODIUM CHLORIDE 0,9%	rastvor za infuziju	boca plastična, 20 po 100 ml (9g/l)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Pharmaceuticals S.A.; B. Braun Medical SA	Nemačka; Rumunija; Španija	1.082,50	-	-	-		
0175582	B05XA03	natrijum hlorid	SODIUM CHLORIDE	rastvor za infuziju	boca staklena, 49 po 100 ml (9g/l)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	2.650,40	-	-	-		
0175581	B05XA03	natrijum hlorid	SODIUM CHLORIDE	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 500 ml (9g/l)	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Italija	66,90	-	-	-		
0170350	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 100 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija	54,10	-	-	-		
0170351	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 250 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija	54,70	-	-	-		
0170352	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 500 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija	66,90	-	-	-		
0170353	B05XA03	natrijum hlorid	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE 0,9%	rastvor za infuziju	kesa, 1 po 1000 ml (9 g/l)	Bieffe Medital S.A.; Bieffe Medital SPA; Baxter Healthcare LTD; Baxter S.A.	Španija; Italija; Velika Britanija; Belgija	150,90	-	-	-		
0174050	B05XB02	alanil glutamin	DIIPEPTIVEN	koncentrat za rastvor za infuziju	boca, 10 po 100 ml (20 g/100 ml)	Fresenius Kabi Austria GMBH	Austrija	34.281,00	-	-	-		STAC
0052720	B05XC...	askorbinska kiselina, nikotinamid	SOLUVIT N	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 10 ml	Fresenius Kabi AB	Švedska	3.320,20	-	-	-		STAC
0100250	C01AA05	digoksin	DILACOR	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 6 po 2 ml (0,25 mg/2ml)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	164,20	0,25 mg	27,37	-		
0101441	C01BD01	amjodaron	SEDACORON	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 3 ml (150 mg/3ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	346,20	0,2 g	92,32	-		
0101355	C01BD01	amjodaron	CORDARONE	rastvor za injekciju	ampula, 6 po 3 ml (150 mg/3 ml)	Sano Winthrop Industrie	Francuska	415,40	0,2 g	92,31	-		
0105146	C01CA04	dopamin	DOPAMIN ADMEDA 50	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Haupt Pharma Wulffing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH	Nemačka	490,90	0,5 g	981,80	-		
0105401	C01CA07	dobutamin	DOBUTAMIN ADMEDA 250	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 50 ml (250 mg/50 ml)	Haupt Pharma Wulffing GmbH, Nemačka za Admeda Arzneimittel GmbH	Nemačka	481,00	0,5 g	962,00	-		
0105031	C01CA24	epinefrin (adrenalin)	ADRENALIN HCL 1:1000	injekcija	50 po 1 mg/1 ml	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	2.165,60	0,5 g	21.656,00	-		
0102182	C01DA02	gliceriltrinitrat (nitroglicerini)	NIRMIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 1,6 ml (1 mg/1,6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	887,00	-	-	-		
0102180	C01DA02	gliceriltrinitrat (nitroglicerini)	NIRMIN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 50 po 1,6 ml (5 mg/1,6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.147,50	-	-	-		
0103290	C02CA06	urapidil	EBRANTIL 25	injekcija	5 po 25 mg/5 ml	Nycomed GmbH	Nemačka	1.660,30	50 mg	664,12	-		STAC
0103291	C02CA06	urapidil	EBRANTIL 50	injekcija	5 po 50 mg/10 ml	Nycomed GmbH	Nemačka	1.660,30	50 mg	332,06	-		STAC
0400411	C03CA01	furosemid	FUROSEMIDE IVANČIĆ	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (10 mg/ml)	Sopharma PLC	Bugarska	345,60	40 mg	69,12	-		
0400040	C03CA02	bumetanid	YURINEX	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (0,5 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	105,00	1 mg	21,00	-		
0107497	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	255,10	0,15 g	1.530,60	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0402102	C08CA06	nimodipin	NIMOTOP S	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml/10 mg	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	1.298,50	50 mg	129,85	-		STAC; Samo za lečenje bolesnika sa subarahnoidalnim krvarenjem.
0402721	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 2 ml (5 mg/2 ml)	Alkaloid a.d.	Makedonija	449,70	0,24 g	2.158,56	-		
1103462	C09AA15	zofenopril	ZOFECARD	film tableti	blister, 28 po 7,5 mg	Menarini Von Heyden GmbH; A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.	Nemačka; Italija	329,80	30 mg	47,11	-	1. Esencijalna hipertenzija: Lek je indikovani u terapiji blage do umerene esencijalne hipertenzije. 2. Akutni infarkt miokarda: Lek je indikovani u terapiji koja je započeta u prvih 24 sata kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, sa ili bez znakova i simptoma srčane insuficijencije, koji su hemodinamski stabilni i ne primaju trombolitičku terapiju.	
4156151	D08AG02	povidon jod	POVIDON JOD	pena za kožu	kontejner plastični, 1 po 500 ml (7,5%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	407,40	-	-	-		
4156150	D08AG02	povidon jod	POVIDON JOD	rastvor za kožu	kontejner plastični, 1 po 500 ml (10%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	407,40	-	-	-		
4156152	D08AG02	povidon jod	POVIDON JOD	pena za kožu	kontejner plastični, 1 po 5000ml (7,5%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	4.074,00	-	-	-		
7156163	D08AG02	povidon	BETADINE	rastvor za kožu	bočica 1 po 1000 ml (10 %)	Alkaloid a.d. u saradnji sa Mundipharma AG, Švajcarska	Republika Makedonija	814,80	-	-	-		
0141132	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	injekcija	50 po 0,1 mg/1 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	563,10	0,2 mg	22,52	-		
0141135	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	injekcija	50 po 0,2 mg/1 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.134,50	0,2 mg	22,69	-		
4143125	G02AD02	dinoproston (PGE2)	PREPIDIL GEL	endocervikalni gel	napunjeni injekcioni špric, 1 po 3 g (0,5 mg/3g)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	1.875,60	0,5 mg	312,60	-		STAC
6143120	G02AD02	dinoproston (PGE2)	PROSTIN E2	vaginalna tableti	4 po 3 mg	Sanico N.V.	Belgija	3.931,30	0,5 mg	163,80	-		STAC
0143043	G02AD04	karboprost (PGM15)	PROSTIN 15M	rastvor za injekciju	1 po 0,25 mg/ml	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	1.084,90	2,5 mg	10.849,00	-		STAC
0142102	G02CA03	fenoterol	PARTUSISTEN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 10 ml (0,5 mg/10 ml)	Boehringer Ingelheim Espana S.A.	Španija	634,60	-	-	-		
0048619	G03BA03	testosteron enantat	TESTOSTERON DEPO	injekcija	5 po 250 mg/ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	718,10	18 mg	10,34	-		
0048468	G03DA03	hidroksiprogesteron	PROGESTERON DEPO	rastvor za injekciju	5 po 250 mg/ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	557,70	10 mg	4,46	-		
4137040	G03DA04	progesteron	CRINONE	vaginalni gel	apikator, 1 po 15 (90 mg/1,125 g)	Fleet Laboratories Ltd.	Velika Britanija	3.623,30	90 mg	241,55	-	1. Za lečenje neplodnosti nastale usled neadekvatne lutealne faze (N97). 2. U toku invitro oplodnje (N97).	
0044143	G03GA01	horiogonadotropin	PREGNYL	injekcija	3 po 1500 i.j. sa rastv.	N.V. Organon	Holandija	406,00	250 i.j.	22,56	-		Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.
0044142	G03GA01	horiogonadotropin	PREGNYL	injekcija	3 po 5000 i.j. sa rastv.	N.V. Organon	Holandija	1.030,80	250 i.j.	17,18	-		Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.
0044144	G03GA01	horiogonadotropin	PREGNYL	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	10 ampula sa rastvaračem, 1 po 1 ml (5000 i.j./1ml)	N.V. Organon	Holandija	343,60	250 i.j.	17,18	-		Po preporuci endokrinologa i ginekologa, kao dijagnostik i terapeutik.
0044086	G03GA02	menotrofin	MENOPUR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	10 bočica po (75 i.j.) sa 10 amp. po 1ml rastvarača	Ferring GmbH	Nemačka	18.161,40	30 i.j.	726,46	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0044400	G03GA02	menotrofin	MERIONAL	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	10 bočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1ml (75 i.j. FSH/75 i.j. LH)	IBSA Institut Biochemique S.A.	Švajcarska	1.821,50	30 i.j.	728,60	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0044412	G03GA04	urofollitropin	FOSTIMON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	10 bočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (75 i.j./ml)	IBSA Institut Biochemique S.A.	Švajcarska	1.161,20	75 i.j.	1.161,20	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje). 2. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044250	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	libočica sa rastvaračem u špricu, 1 po 75 i.j./ml	Merck Serono S.P.A.	Italija	2.652,20	75 i.j.	2.652,20	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0044251	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 300	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (300 i.j./0,5 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	10.883,90	75 i.j.	2.720,98	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0044252	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 450	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,75 ml (450 i.j./0,75 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	16.228,70	75 i.j.	2.704,78	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0044253	G03GA05	folitropin alfa	GONAL-F 900	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 1,5 ml (900 i.j./1,5 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	32.425,50	75 i.j.	2.702,13	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0044226	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	injekcija	1 po 0,5 ml (50 i.j./0,5 ml)	N.V. Organon	Holandija	1.797,80	75 i.j.	2.696,70	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0044227	G03GA06	folitropin beta	PUREGON	injekcija	1 po 0,5 ml (100 i.j./0,5 ml)	N.V. Organon	Holandija	3.406,90	75 i.j.	2.555,18	-	1. Sekundarni hipogonadotropizam (hipotalamusno i/ili pituitarno oštećenje); 2. Infertilitet u žena udružen sa hroničnom anovulacijom u sindromu policističnih ovarijuma kod žena koje su rezistentne na prethodnu primenu metformina i klomifen citrata. 3. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili ginekologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0140150	H01BB02	oksitocin	OXYTOCIN SYNTHETIC	injekcija	100 po 10 i.j./ml	Gedeon Richter	Mađarska	2.438,30	15 i.j.	38,57	-		STAC
0140115	H01BB02	oksitocin	SYNTOCINON	rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 100 po 5 i.j./ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	2.424,10	15 i.j.	72,72	-		STAC
0049190	H01CB02	oktreotid	SANDOSTATIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 1 ml (0,1 mg/ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	3.736,60	0,7 mg	5.231,24	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0); 3. Terapija akutnog varicealnog krvarenja iz variksa jednjaka i želuca u bolničkim uslovima (B5.0); 4. Terapija pankreasne fistule nakon operacije na pankreasu koja ne reaguje na endoskopsku hemostazu u bolničkim uslovima (K86.2; K86.3; K86.8; K86.9).	
0049195	H01CB02	oktreotid	SANDOSTATIN LAR	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 10 mg/2,5 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	52.509,20	0,7 mg	3.675,64	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	
0049196	H01CB02	oktreotid	SANDOSTATIN LAR	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 20 mg/2,5 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	90.510,90	0,7 mg	3.167,88	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	
0049197	H01CB02	oktreotid	SANDOSTATIN LAR	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 30 mg/2,5 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	117.610,50	0,7 mg	2.744,25	-	1. Gastro-entero-pankreasni neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C15-C26.9; D10-D13.9; D37.0-D37.9); 2. Akromegalija (D35.2; E22.0).	
0049231	H01CB03	lanreotid	SOMATULINE AUTOGEL	injekcija, špic	napunjen injekcioni špic, 1 po 60 mg	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	74.102,90	3 mg	3.705,15	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)	
0049232	H01CB03	lanreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špic, 1 po 90 mg	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	79.980,50	3 mg	2.666,02	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)	
0049233	H01CB03	lanreotid	SOMATULINE AUTOGEL	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špic, 1 po 120 mg	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	109.388,50	3 mg	2.734,96	-	Neuroendokrini tumori, kao nastavak bolničkog lečenja (C00-C45; C47-C80; D00-D16.9; D24; D26-D32.9; D34-D44.9; E05.8; E22; E24; E27; Q85.0-Q85.9)	

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0047286	H02AB01	betametazon	DIPROPHOS	injekcija	5 po (2 mg + 5 mg)/ml	Schering Plough	Belgija	1.433,90	1,5 mg	61,45	-		
0047140	H02AB02	deksametazon	DEXASON	rastvor za injekciju	ampula, 25 po 1 ml (4 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	688,50	1,5 mg	10,33	-		
0047219	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD SOLU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	libočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 2 ml (125 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	190,80	20 mg	30,53	-		
0047220	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD SOLU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	libočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 7,8 ml (500 mg/7,8 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	629,60	20 mg	25,18	-		
0047218	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD SOLU	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	libočica sa rastvaračem u ampuli, 15 po 1 ml (40 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.426,30	20 mg	47,54	-		
0047212	H02AB04	metilprednizolon	LEMOD DEPO	suspenzija za injekciju	bočica, 10 po 1 ml (40 mg/1 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.109,00	20 mg	55,45	-		
0047173	H02AB04	metilprednizolon	NIRYPAN SOLUBILE	injekcija	15 po 20 mg sa rastv.	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	765,40	20 mg	51,03	-		
0047174	H02AB04	metilprednizolon	NIRYPAN SOLUBILE	injekcija	15 po 40 mg sa rastv.	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	1.426,30	20 mg	47,54	-		
0047120	H02AB09	hidrokortizon	HIDROKORTIZON	liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu	libočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 2 ml (100 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	125,30	30 mg	37,59	-		
0047121	H02AB09	hidrokortizon	HIDROKORTIZON	liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu	libočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 4 ml (500 mg/4 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	327,10	30 mg	19,63	-		
0047122	H02AB09	hidrokortizon	HIDROKORTIZON	liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvaračem za parenteralnu upotrebu	dvodelna bočica, 1 po 2 ml (100 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	109,90	30 mg	32,97	-		
1050012	H05BX02	parikalcitol	ZEMPLAR	kapsula, meka	blister, 28 po 1 mcg	Aesica Queenborough Ltd.	Velika Britanija	9.687,20	2 mcg	691,94	-	Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatiroidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml. Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
1050010	H05BX02	parikalcitol	ZEMPLAR	kapsula, meka	blister, 28 po 2 mcg	Aesica Queenborough Ltd.	Velika Britanija	19.323,30	2 mcg	690,12	-	Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatiroidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml. Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0050140	H05BX02	parikalcitol	ZEMPLAR	rastvor za injekciju	ampula 5 po 1 ml (5 mcg/ ml)	Abbvie S.R.L.	Italija	10.550,90	2 mcg	844,07	-	Sekundarni hiperparatiroidizam kod bolesnika koji su na hroničnom programu dijalize (hemodijaliza i peritonealna dijaliza) i to bolesnici koji nisu odgovorili na prethodnu standardnu terapiju (kalcitriol, vezači fosfata, hipokalcemijski dijalizni rastvor i dijeta siromašna fosforom) sa umerenim hiperparatiroidizmom koji imaju trajno povišen IPTH>500-800 pg/ml. Kontraindikacije: koncentracija Ca veća od 2,6 mmol/l ili proizvod CaxP>5 mmol/l.	Lek se uvodi u terapiju u dijaliznim centrima.
0029781	J01AA12	tigeciklin	TYGACIL	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 10 po 50 mg	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	51.569,20	0,1 g	10.313,84	-		**
0021108	J01CA01	ampicilin	PAMECIL	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd.	Kipar	721,30	2 g	144,26	-		
0021109	J01CA01	ampicilin	PAMECIL	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 100 po 1 g	Medochemie Ltd.	Kipar	7.213,20	2 g	144,26	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođne leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0021940	J01CA01	ampicilin	AMPICILLIN 1000 mg	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 100 po 1000 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	5.851,50	2 g	117,03	-		
0020056	J01CE30	benzilpenicilin, prokainbenzilpenicilin	PANCILLIN	prašak za suspenziju za injekciju	bočica, 50 po 800000 i.j. (600000 i.j. + 200000 i.j.)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.386,70	6000000 i.j.	477,34	-		
0021357	J01CR01	ampicilin, sulbaktam	AMPISULCILLIN	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 1,5 g (1000mg + 500mg)	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	1.722,00	2 g	344,40	-		STAC
0021565	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	5 po (1000 mg+ 200 mg)	Lek farmacevtska društva d.d.	Slovenija	975,10	3 g	585,06	-		STAC
0021650	J01CR02	amoksisicilin, klavulanska kiselina	MEDOCLAV	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	5 po (1000 mg+ 200 mg)	Medochemie Ltd.	Kipar	975,10	3 g	585,06	-		STAC
0021998	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	TAZOCIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 12 po (4 g + 0,5 g)	Wyeth Lederle S.P.A.	Italija	5.218,70	14 g	1.522,12	-		**
0021995	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	PIPTAZ	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica 12 po (4 g + 0,5g)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5.218,70	14 g	1.522,12	-		**
0021959	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	ACIPIRIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po (4 g + 0,5 g)	Laboratorio Reig Jofre S.A.	Španija	434,90	14 g	1.522,15	-		**
0021971	J01CR05	piperacilin, tazobaktam	PIPERACILLIN/TAZOBACTAM AUROBINDO	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 12 po 4,5 g	Aurobindo Pharma Ltd.	Indija	5.218,70	14 g	1.522,12	-		**
0321961	J01DB04	cefazolin	GALECEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 50 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	5.378,30	3 g	322,70	-		
0321030	J01DB04	cefazolin	PRIMACEPH	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	50 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5.378,30	3 g	322,70	-		
0321829	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 2 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.838,90	3 g	275,84	-		
0321854	J01DB04	cefazolin	CEFAZOLIN PHARMANOVA	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 1 g	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	537,80	3 g	322,68	-		
0321027	J01DC02	cefuroksim	NILACEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 750 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija	Republika Srbija	101,50	3 g	406,00	-		
0321026	J01DC02	cefuroksim	NILACEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1500 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija	Republika Srbija	176,00	3 g	352,00	-		
0321025	J01DC02	cefuroksim	CEFUROKSIM	prašak za rastvor za injekciju	1 po 1500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	176,00	3 g	352,00	-		
0321024	J01DC02	cefuroksim	CEFUROKSIM	prašak za rastvor za injekciju	1 po 750 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	101,50	3 g	406,00	-		
0321401	J01DC02	cefuroksim	DICEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 750 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5.076,00	3 g	406,08	-		
0321404	J01DC02	cefuroksim	DICEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	8.797,50	3 g	351,90	-		
0321640	J01DC02	cefuroksim	XORIM	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Sandoz GmbH	Austrija	1.015,20	3 g	406,08	-		
0321643	J01DC02	cefuroksim	XORIM	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 1500 mg	Sandoz GmbH	Austrija	1.759,50	3 g	351,90	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321882	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.015,20	3 g	406,08	-		
0321883	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg/50 ml	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.759,50	3 g	351,90	-		
0321884	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg/100 ml	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.759,50	3 g	351,90	-		
0321955	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 750 mg	Medochemie Ltd.	Kipar	1.015,20	3 g	406,08	-		
0321874	J01DC02	cefuroksim	CEFUROXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1500 mg	Medochemie Ltd.	Kipar	1.759,50	3 g	351,90	-		
0321140	J01DD01	cefotaksim	TOLYCAR	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 0,5 g	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	100,10	4 g	800,80	-		STAC
0321142	J01DD01	cefotaksim	TOLYCAR	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 2 g	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	400,30	4 g	800,60	-		STAC
0321143	J01DD01	cefotaksim	TOLYCAR	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 20 po 0,5 g	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	2.002,00	4 g	800,80	-		STAC
0321145	J01DD01	cefotaksim	TOLYCAR	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 20 po 2 g	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	8.006,00	4 g	800,60	-		STAC
0321981	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAKSIM	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	180,10	4 g	720,40	-		STAC
0321980	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAKSIM	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 1000 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	900,50	4 g	720,40	-		STAC
0321983	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Medochemie Ltd.	Kipar	1.800,90	4 g	720,36	-		STAC
0321984	J01DD01	cefotaksim	CEFOTAXIM MEDOCHEMIE	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 100 po 1 g	Medochemie Ltd.	Kipar	18.009,00	4 g	720,36	-		STAC
0321600	J01DD02	ceftazidim	FORCAS	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija	Republika Srbija	292,80	4 g	1.171,20	-		STAC
0321601	J01DD02	ceftazidim	FORCAS	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija	Republika Srbija	155,20	4 g	1.241,60	-		STAC
0321023	J01DD02	ceftazidim	CEFTAZIDIM	prašak za rastvor za injekciju	1 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	292,80	4 g	1.171,20	-		STAC
0321603	J01DD02	ceftazidim	CEFTAZIDIM SANDOZ	prašak za rastvor za injekciju	1 po 500 mg	Sandoz GmbH	Austrija	155,20	4 g	1.241,60	-		STAC
0321602	J01DD02	ceftazidim	CEFTAZIDIM SANDOZ	prašak za rastvor za injekciju	1 po 1 g	Sandoz GmbH	Austrija	292,80	4 g	1.171,20	-		STAC
0321707	J01DD02	ceftazidim	TIZACEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	14.638,50	4 g	1.171,08	-		STAC
0321758	J01DD04	ceftriakson	AZARAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 50 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	13.162,20	2 g	526,49	-		STAC, **
0321329	J01DD04	ceftriakson	LONGACEPH	prašak za rastvor za injekciju	10 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	2.632,40	2 g	526,48	-		STAC, **
0321990	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 250 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	913,10	2 g	730,48	-		STAC ** ; izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno ampule od 250 mg.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0321993	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 50 po 250 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	4.565,70	2 g	730,51	-		STAC; ** : izuzetno u dermatologiji se mogu koristiti ambulantno ampule od 250 mg.
0321991	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	1.826,40	2 g	730,56	-		STAC; **
0321994	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 50 po 500 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	9.132,00	2 g	730,56	-		STAC; **
0321985	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 g	Zdravje a.d.	Republika Srbija	263,30	2 g	526,60	-		STAC; **
0321986	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 1 g	Zdravje a.d.	Republika Srbija	1.316,30	2 g	526,52	-		STAC; **
0321987	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 2 g	Zdravje a.d.	Republika Srbija	615,50	2 g	615,50	-		STAC; **
0321988	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON	prašak za rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 2 g	Zdravje a.d.	Republika Srbija	3.077,50	2 g	615,50	-		STAC; **
0321865	J01DD04	ceftriakson	3CEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 50 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	13.162,20	2 g	526,49	-		STAC; **
0321863	J01DD04	ceftriakson	LENDACIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 1 g	Sandoz GmbH	Austrija	2.632,40	2 g	526,48	-		STAC; **
0321996	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAXON-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	263,30	2 g	526,60	-		STAC; **
0321997	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAXON-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	2.632,40	2 g	526,48	-		STAC; **
0321998	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAXON-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 2 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	615,50	2 g	615,50	-		STAC; **
0321999	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAXON-MIP	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 2 g	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	6.154,70	2 g	615,47	-		STAC; **
0321989	J01DD04	ceftriakson	CEFTRIAKSON PHARMANOVA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 5 po 1 g	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	1.316,30	2 g	526,52	-		STAC; **
0321914	J01DE01	cefepim	MAXICEF	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	541,70	2 g	1.083,40	-		STAC
0321631	J01DE01	cefepim	CEFIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	270,90	2 g	1.083,60	-		STAC
0321630	J01DE01	cefepim	CEFIM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	541,70	2 g	1.083,40	-		STAC
0029753	J01DH02	meropenem	MEROCID	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	3.370,90	2 g	1.348,36	-		**
0029754	J01DH02	meropenem	MEROCID	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	6.152,70	2 g	1.230,54	-		**
0029757	J01DH02	meropenem	MEROPENEM PHARMANOVA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	3.370,90	2 g	1.348,36	-		**
0029758	J01DH02	meropenem	MEROPENEM PHARMANOVA	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	6.152,70	2 g	1.230,54	-		**
0029755	J01DH02	meropenem	ITANEM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	3.370,90	2 g	1.348,36	-		**
0029756	J01DH02	meropenem	ITANEM	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1 g	Galenika a.d.	Republika Srbija	6.152,70	2 g	1.230,54	-		**

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0029658	J01DH02	meropenem	MEROPENEM PROVIDENS	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 500 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	3.370,90	2 g	1.348,36	-		**
0029759	J01DH02	meropenem	MEROPENEM PROVIDENS	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 10 po 1000 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	6.152,70	2 g	1.230,54	-		**
0029780	J01DH03	ertapenem natrijum	INVANZ	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 1 g	Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret	Francuska	4.709,80	1 g	4.709,80	-		STAC
0029506	J01DH51	imipenem, cilastatin	TIENAM I.V.	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 10 po 1g (500 mg + 500 mg)	Laboratories Merck Sharp & Dohme - Chibret	Francuska	5.432,10	2 g	2.172,84	-		**
0029507	J01DH51	imipenem, cilastatin	MIPECID	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 1000 mg (500 mg+500 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5.432,10	2 g	2.172,84	-		**
0028601	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM Roche	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 5 ml (400 mg/5 ml+80 mg/5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	2.568,10	1,92 g	1.027,24	-		
0325484	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	389,80	0,5 g	389,80	-		STAC
0325476	J01FA10	azitromicin	SUMAMED	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	1.949,20	0,5 g	389,84	-		STAC
0326041	J01FF01	klindamicin	KLINDAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (150 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.244,70	1,8 g	746,62	-		STAC
0326223	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 4 ml (600 mg/4 ml)	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.089,80	1,8 g	653,88	-		STAC
0024552	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	414,50	0,24 g	124,35	-		
0024553	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	621,80	0,24 g	124,36	-		
0024423	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (20 mg/2 ml)	Zdravije a.d.	Republika Srbija	328,20	0,24 g	393,64	-		
0024420	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Zdravije a.d.	Republika Srbija	405,80	0,24 g	243,48	-		
0024421	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)	Zdravije a.d.	Republika Srbija	414,50	0,24 g	124,35	-		
0024422	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (120 mg/2 ml)	Zdravije a.d.	Republika Srbija	621,80	0,24 g	124,36	-		
0024580	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 2 ml (80 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	414,50	0,24 g	124,35	-		
0024582	J01GB03	gentamicin	GENTAMICIN	rastvor za injekciju	10 po 2 ml (120 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	621,80	0,24 g	124,36	-		
0024282	J01GB06	amikacin	AMIKACIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 100 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	591,10	1 g	591,10	-		STAC
0024283	J01GB06	amikacin	AMIKACIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 10 po 500 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.698,00	1 g	339,60	-		STAC
0024633	J01GB06	amikacin	AMINOCIN	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 50 po 2 ml (500 mg/2 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	8.499,80	1 g	339,59	-		STAC
0329196	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROXAL	rastvor za infuziju	bočica, 5 po 100 mg/50 ml	Zdravije a.d.	Republika Srbija	926,80	0,5 g	926,80	-		STAC
0329412	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 100 mg/10 ml	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	926,80	0,5 g	926,80	-		STAC
0329403	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 5 po 10 ml (100 mg/10 ml)	Alkaloid d.o.o.	Republika Srbija	926,80	0,5 g	926,80	-		STAC
0329081	J01MA12	levofloksacin	LEVOMAX	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 100 ml (500 mg/100 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	10.971,60	0,5 g	1.097,16	-		STAC
0329101	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	rastvor za infuziju	5 po 50 ml (5 mg/ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	3.047,70	0,5 g	1.219,08	-		STAC
0329100	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	rastvor za infuziju	20 po 50 ml (5 mg/ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	12.190,70	0,5 g	1.219,07	-		STAC
0329103	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	rastvor za infuziju	5 po 100 ml (5 mg/ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	5.485,90	0,5 g	1.097,18	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0329102	J01MA12	levofloksacin	LEVOXA	rastvor za infuziju	20 po 100 ml (5 mg/ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	21.943,30	0,5 g	1.097,17	-		STAC
0329200	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID	rastvor za infuziju	bočica, 10 po 100 ml (5 mg/ml)	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	10.971,60	0,5 g	1.097,16	-		STAC
0029790	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN-MIP	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 500 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	1.121,60	2 g	897,28	-		**
0029791	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN-MIP	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 1000 mg	Chephasaar Chem. Pharm.	Nemačka	2.746,70	2 g	1.098,68	-		**
0029795	J01XA01	vankomicin	EDICIN	injekcija	1 po 500 mg	Lek farmacevtska društba d.d.	Slovenija	224,30	2 g	897,20	-		**
0029796	J01XA01	vankomicin	EDICIN	injekcija	1 po 1 g	Lek farmacevtska društba d.d.	Slovenija	549,30	2 g	1.098,60	-		**
0029294	J01XA01	vankomicin	KOVANCIN	liofilizat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 10 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.243,30	2 g	897,32	-		**
0029293	J01XA01	vankomicin	KOVANCIN	liofilizat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 10 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	5.493,40	2 g	1.098,68	-		**
0029801	J01XA01	vankomicin	VOXIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg	Vianex S.A.	Grčka	224,30	2 g	897,20	-		**
0029797	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN RIEMSER	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 1000 mg	Riemser Arzneimittel AG	Nemačka	2.746,70	2 g	1.098,68	-		**
0029798	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCIN RIEMSER	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 500 mg	Riemser Arzneimittel AG	Nemačka	1.121,60	2 g	897,28	-		**
0029001	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Xellia Pharmaceuticals Aps	Danska	224,30	2 g	897,20	-		**
0029000	J01XA01	vankomicin	VANCOMYCINE	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 1000 mg	Xellia Pharmaceuticals Aps	Danska	549,30	2 g	1.098,60	-		**
0029760	J01XA02	teikoplanin	TARGOCID	prašak za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 3 ml (200 mg/3 ml)	Gruppo Lepetit SPA	Italija	1.981,20	0,4 g	3.962,40	-		**
0029761	J01XA02	teikoplanin	TARGOCID	prašak za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 3 ml (400 mg/3 ml)	Gruppo Lepetit SPA	Italija	3.729,40	0,4 g	3.729,40	-		**
0029081	J01XD01	metronidazol	ORVAGIL	rastvor za infuziju	100 ml (500 mg/100 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	225,80	1,5 g	677,40	-		STAC
0029784	J01XD01	metronidazol	METRONIDAZOLE B. BRAUN	rastvor za infuziju	20 po 100 ml (500 mg/100 ml)	B. Braun Melsungen AG; B. Braun Medical SA	Nemačka; Španija	2.862,80	1,5 g	429,42	-		STAC
1029050	J01XX08	linezolid	ZENIX	film tableta	blister, 10 po 600 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	29.202,40	1,2 g	5.840,48	-		**
0029060	J01XX08	linezolid	ZENIX	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	978,70	1,2 g	5.872,20	-		**
0029061	J01XX08	linezolid	ZENIX	rastvor za infuziju	boca staklena, 1 po 300 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.936,20	1,2 g	5.872,40	-		**
0327312	J02AC01	flukonazol	DIFLUCAN	rastvor za infuziju	1 po 100 ml (2 mg/ml)	Pfizer PGM	Francuska	640,50	0,2 g	640,50	-		STAC
0327357	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	640,50	0,2 g	640,50	-		STAC
0327313	J02AC01	flukonazol	FLUCONAZOLE-TEVA	rastvor za infuziju	kesa, 10 po 100 ml (2 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company	Mađarska	6.404,80	0,2 g	640,46	-		STAC
0327534	J02AC03	vorikonazol	VFEND	prašak za rastvor za infuziju	1 po 200 mg	Pfizer PGM	Francuska	12.000,90	0,4 g	24.001,80	-		STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1327530	J02AC03	vorikonazol	VFEND	film tableta	blister, 10 po 50 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	9.205,60	0,4 g	7.364,48	-		STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1327532	J02AC03	vorikonazol	VFEND	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	37.965,60	0,4 g	7.593,12	-		STAC; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0327560	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	prašak za rastvor za infuziju	1 po 50 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	44.382,90	50 mg	44.382,90	-		**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0327561	J02AX04	kaspofungin	CANCIDAS	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 70 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	59.177,30	50 mg	42.269,50	-		**; Samo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0328270	J05AB01	aciclovir	ZOVIRAX	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 5 po 250 mg	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	2.574,70	4 g	8.239,04	-		**
0328251	J05AB01	aciclovir	MEDOVIR	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 10 po 250 mg	Medochemie Ltd.; Lisapharma S.P.A.	Kipar; Italija	5.149,50	4 g	8.239,20	-		**
0328252	J05AB01	aciclovir	MEDOVIR	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 100 po 250 mg	Medochemie Ltd.; Lisapharma S.P.A.	Kipar; Italija	51.494,80	4 g	8.239,17	-		**
0328260	J05AB06	ganciklovir	CYMEVENE	prašak za rastvor za infuziju	1 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	3.528,20	0,5 g	3.528,20	-		**
0328650	J05AX07	enfuvirtid	FUZEON	prašak i rastvarač za injekciju	bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 60 po 1,2 ml (90 mg/ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	156.723,20	0,18 g	5.224,11	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju samo kod onih HIV pozitivnih pacijenata koji su dugo lečeni antiretrovirusnim lekovima i kod kojih testovi genotipske rezistencije pokazuju da se kombinacije od tri antiretrovirusna leka može sastaviti samo uz upotrebu Peptida T-20.
0010200	J06AA03	antiserum protiv zmijskog otrova (konjski)	VIEKVIN	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	1.175,20	-	-	-		
0013500	J06BA02	imunoglobulin (IgG-7S), intravenski	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	7.661,50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013501	J06BA02	imunoglobulin (IgG-7S), intravenski	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	19.153,70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013502	J06BA02	imunoglobulin (IgG-7S), intravenski	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	38.307,70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013503	J06BA02	imunoglobulin (IgG-7S), intravenski	IG VENA	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 200ml (50mg/ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	76.615,40	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013510	J06BA02	imunoglobulin (IgG-7S), intravenski	OCTAGAM	rastvor za infuziju	1 po 50 ml (50 mg/ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	19.153,70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013511	J06BA02	imunoglobulin (IgG-7S), intravenski	OCTAGAM	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 100 ml (50 mg/1ml)	Octapharma Pharmazeutika Produktionsges m.b.H	Austrija	38.307,70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013602	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	19.153,30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013600	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	38.307,70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013601	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	INTRATECT	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 ml (50 mg/ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	76.612,70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013505	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (10%)	Baxter S.A.	Belgija	76.612,70	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013507	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (10%)	Baxter S.A.	Belgija	38.306,10	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013506	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku upotrebu	KIOVIG	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (10%)	Baxter S.A.	Belgija	19.153,30	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013605	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	19.146,80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013606	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	38.305,80	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013607	J06BA02	humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu	PRIVIGEN	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (100 mg/ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	76.611,50	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijaliste odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a nastavak terapije, po potrebi u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
0013447	J06BB01	Imunoglobulin anti -D (RhO)	IMMUNORHO	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 po 300 mcg sa rastv.	Kedrion S.P.A.	Italija	4.071,20	-	-	-		STAC
0013315	J06BB01	anti-D (RhO) imunoglobulin 1250 i.j. (izraženo na supstancu)	RHESONATIV	rastvor za injekciju	ampula, 1 po 2 ml (1250 i.j. / 2 ml)	Octapharma AB	Švedska	5.107,50	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0013445	J06BB01	anti-D (Rho) imunoglobulin, humani	RHOPHYLAC 300	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml (300 mcg/2 ml)	CSL Behring AG	Švajcarska	5.107,50	-	-	-		STAC
0013167	J06BB02	imunoglobulin antitetanusni	TETAGAM P	injekcija	1 po 250 i.j./1 ml	ZLB Behring GmbH	Nemačka	952,40	-	-	-		
0013434	J06BB02	imunoglobulin antitetanusni	TETANUS GAMMA	napunjen injekcioni špric	1 po 250 i.j./1 ml	Kedrion S.P.A.	Italija	798,10	-	-	-		
0013160	J06BB02	tetanus imunoglobulin, humani	ATERBULIN	injekcija	1 po 250 i.j.	Institut za transfuziju krvi Srbije	Republika Srbija	952,50	-	-	-		
0013312	J06BB04	hepatitis B imunoglobulin, humani	IMMUNO HBS	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 1 ml (180 i.j./1ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	7.685,10	-	-	-		
0013313	J06BB04	hepatitis B imunoglobulin, humani	IMMUNO HBS	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 3 ml (540 i.j./3 ml)	Kedrion S.P.A.	Italija	26.920,30	-	-	-		
0013317	J06BB04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu	HEPATECT CP	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (50 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	7.540,40	-	-	-		
0013318	J06BB04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu	HEPATECT CP	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (50 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	34.660,70	-	-	-		
0013319	J06BB04	humani hepatitis B imunoglobulin za intravensku primenu	HEPATECT CP	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 40 ml (50 i.j./ml)	Biotest Pharma GmbH	Nemačka	133.782,20	-	-	-		
0013221	J06BB05	rabies imunoglobulin (LJUDSKI) PROTIV BESNILA	IMUNOGLOBULIN (LJUDSKI) PROTIV BESNILA	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 2 ml (200 i.j./ml)	Imunološki zavod d.d.	Hrvatska	9.121,00	-	-	-		
0013250	J06BB05	rabies imunoglobulin, humani	HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN	rastvor za injekciju	1 po 1 ml (najmanje 100 i.j./1 ml)	Institut za transfuziju krvi Srbije	Republika Srbija	22.604.j.	-	-	-		
0013251	J06BB05	rabies imunoglobulin, humani	HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN	rastvor za injekciju	1 po 2 ml (najmanje 100 i.j./1 ml)	Institut za transfuziju krvi Srbije	Republika Srbija	22.604.j.	-	-	-		
0013252	J06BB05	imunoglobulin protiv besnila	HUMANI ANTIRABIJSKI IMUNOGLOBULIN	rastvor za injekciju	1 po 5 ml (najmanje 100 i.j./ml)	Institut za transfuziju krvi Srbije	Republika Srbija	22.604.j.	-	-	-		
0013286	J06BB16	palivizumab	SYNAGIS	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (50 mg)	Abbvie S.R.L.	Italija	57.478,00	-	-	-	Prevenција ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koja zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od nastanka RSV oboljenja: - deca rođena u 35. nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone; - deca mlađa od 2 godine, ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije; - deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.
0013285	J06BB16	palivizumab	SYNAGIS	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 1 ml (100 mg)	Abbvie S.R.L.	Italija	94.688,10	-	-	-	Prevenција ozbiljnih oboljenja donjih disajnih puteva koja zahtevaju hospitalizaciju i koje izaziva respiratorni sincicijalni virus (RSV) kod dece sa visokim rizikom od nastanka RSV oboljenja: - deca rođena u 35. nedelji ili ranije, koja imaju manje od 6 meseci na početku RSV sezone; - deca mlađa od 2 godine, ukoliko je u poslednjih 6 meseci bila neophodna terapija bronhopulmonalne displazije; - deca mlađa od 2 godine sa hemodinamski značajnim kongenitalnim srčanim oboljenjem.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara specijalista odgovarajuće grane medicine uz potpis načelnika i direktora klinike.
0011857	J07AG01	vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B, konjugovana	ACT-HIB	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	Sanofi Pasteur S.A.	Francuska	790,00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačnog leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0011917	J07AG01	vakcina protiv Haemofilus influenzae tip B	HIBERIX	prašak i rastvarač za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 100 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	79.003,50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011858	J07AH03	vakcina protiv meningitisa (tip A i C), polisaharidna	MENINGOCOCCAL A+C	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml + 50 mcg/0,5 ml)	Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.	Francuska; Mađarska	819,10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011147	J07AJ51	vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, adsorbovana	ALDIPETE-T	suspenzija za injekciju	bočica, 10x5ml (30 i (najmanje)+40 i (najmanje)+4 i (najmanje))/0,5 ml	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	16.309,10	-	-	-		
0011922	J07AJ52	vakcina protiv difterije, tetanusa i pertusisa (acelularna), adsorbovana	TRIPACEL	suspenzija za injekciju	bočica staklena, 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml + 5 mcg/0,5 ml + 5 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 30 i j./0,5 ml + 40 i j./0,5 ml)	Sanofi Pasteur Limited	Kanada	752,50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011856	J07AL01	vakcina protiv pneumokoka, polivalentna	PNEUMO 23	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (25 mcg/0,5 ml)	Sanofi-Aventis ZRT; Sanofi Pasteur S.A.	Mađarska; Francuska	1.033,40	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011935	J07AL02	pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana	PREVENAR 13	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 4,4 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 2,2 mcg/0,5 ml + 32 mcg/0,5 ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	4.993,20	-	-	-	Anemija sprastih ćelija, splenektomisani bolesnici, urođeni i stečeni imunološki deficit kod dece.	
0011860	J07AL52	pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana	SYNFLORIX	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric 1 po 0,5 ml (1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 3 mcg/0,5 ml + 1 mcg/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	4.976,10	-	-	-	Anemija sprastih ćelija, splenektomisani bolesnici, urođeni i stečeni imunološki deficit kod dece.	
0011840	J07AM01	vakcina protiv tetanusa, adsorbovana	TETAVAKSAL T	suspenzija za injekciju	1 po 0,5 ml (najmanje 40 i j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	184,30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011841	J07AM01	vakcina protiv tetanusa, adsorbovana	TETAVAKSAL T	suspenzija za injekciju	10 po 0,5 ml (najmanje 40 i j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	1.352,20	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0011512	J07AM01	vakcina protiv tetanusa, adsorbovana	TETAVAKSAL T	suspenzija za injekciju	10 po 5 ml (najmanje 40 i.j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	8.877,30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011017	J07AM51	vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana	DITEVAKSAL-T ZA ODRASLE	suspenzija za injekciju	10 po 5 ml (najviše 30 i.j./0,5ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	8.271,80	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011831	J07AM51	vakcina protiv difterije i tetanusa, adsorbovana	DITEVAKSAL-T	suspenzija za injekciju	10 po 5 ml (najmanje 30 i.j./0,5ml + najmanje 40 i.j./0,5 ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	8.271,80	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011185	J07AN01	vakcina protiv tuberkuloze	BCG VAKCINA, LIOFILIZOVANA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa rastvaračem u ampuli 5 po 1 ml, 1mg/mL	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	4.878,20	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011868	J07BB02	vakcina protiv gripa (inaktivisana, rascepana virusna čestica)	FLUARIX	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	1 po 0,5 ml (15 mcg + 15 mcg + 15 mcg)/doza	GlaxoSmithKline Biologicals	Nemačka	501,70	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011876	J07BB02	vakcina protiv gripa, trovalentna prečišćeni antigeni virusa influence A (H1N1) A (H3N2) i B	VAXIGRIP	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	1 po 0,5ml (15 mcg + 15 mcg + 15 mcg)/doza	Sanofi Pasteur S.A.	Francuska	501,70	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011913	J07BB02	vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana)	VAXIGRIP	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 20 po 0,5 ml (15 mcg)/doza + 15 mcg/doza + 15 mcg/doza	Sanofi Pasteur S.A.	Francuska	10.034,10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011553	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	ENGRIX B	suspenzija za injekciju	25 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	11.932,50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011551	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	ENGRIX B	suspenzija za injekciju	25 po 1 ml (20 mcg/1 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	18.617,50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011904	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 1 po 1 ml (20 mcg/ml)	LG Life Sciences	Južna Koreja	744,70	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011907	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 1 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	LG Life Sciences	Južna Koreja	477,30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011906	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 10 po 0,5 ml (10 mcg/0,5 ml)	LG Life Sciences	Južna Koreja	4.773,10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011905	J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	EUVAX B	suspenzija za injekciju	bočica, 10 po 1 ml (20 mcg/1 ml)	LG Life Sciences	Južna Koreja	7.447,10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011855	J07BD52	živi atenuirani virusi morbila, rubeole i parotitisa (vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški)	TRIMOVAX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 10 po 0,5ml (3 log CCID50 + 3,7 log CCID50 + 3 log CCID50)	Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.	Francuska; Mađarska	6.967,30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0011866	J07BD52	vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuisani virusi morčila, rubeole i parotitisa)	PRIORIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	libočica sa rastvaračem u ampuli, 1 doza i 1 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	971,90	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011909	J07BD52	vakcina protiv malih boginja, crvenke i zauški (živi atenuirani virusi morčila, rubeole i parotitisa)	PRIORIX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	libočica sa rastvaračem u ampuli, 100 po 0,5 ml (10 exp3 CCID50/0,5 ml + 10 exp3,7 CCID50/0,5 ml + 10 exp3 CCID50/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	98 043,10	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011955	J07BD52	vakcina protiv malih boginja, zauški i rubele	M-M-R-VAXPRO	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 10 po 0,5 ml (3logTCID50/0,5 ml + 4,1logTCID50/0,5 ml + 3logTCID50/0,5 ml)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	7 122,60	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
2011710	J07BF02	vakcina protiv dečije paralize (oralna)	OPVERO	oralna suspenzija	bočica, 10 po 1 ml (najmanje 10 ⁶ CCID ₅₀ /0,1ml+ najmanje 10 ⁶ CCID ₅₀ /0,1ml+ najmanje 10 ⁶ CCID ₅₀ /0,1ml)	Sanofi Pasteur S.A.	Francuska	4 512,80	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011895	J07BF03	vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana	IMOVAX POLIO	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml)	Sanofi Pasteur; Sanofi-Aventis ZRT.	Francuska; Mađarska	630,00	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011863	J07BG01	vakcina protiv besnila	VERORAB	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica sa rastvaračem u ampuli, 5 po 0,5 ml (2,5 i.j./0,5ml)	Sanofi Pasteur	Francuska	5 600,30	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011925	J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana	INFANRIX-IPV+Hib	prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju	napunjen injekcioni špric i bočica, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 8 mcg/0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 10 mcg PRP/0,5 ml i 20-40 mcg T/0,5 ml)	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.	Belgija	2 070,50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
001188	J07CA06	vakcina protiv H. influenzae tip b, adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna pertusisa i inaktivisana poliomijelitisa 1,2 i 3	PENTAXIM	prašak i suspenzija za injekciju u napunjenom špricu sa iglom	bočica i napunjeni injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 10 mcg/0,5 ml)	Sanofi Pasteur S.A.	Francuska	2.070,50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0011929	J07CA06	vakcina protiv H. influenzae tip b, adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna pertusisa i inaktivisana poliomijelitisa 1,2 i 3	PENTAXIM	prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom špricu sa dodatkom jedne ili dve igle	bočica i napunjeni injekcioni špric sa dodatkom jedne ili dve igle, 1 po 0,5 ml (30 i.j./0,5 ml + 40 i.j./0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 25 mcg/0,5 ml + 40 D.j./0,5 ml + 8 D.j./0,5 ml + 32 D.j./0,5 ml + 10 mcg/0,5 ml)	Sanofi Pasteur S.A.; Sanofi-Aventis ZRT.	Francuska; Mađarska	2.070,50	-	-	-		Prema programu obavezne imunizacije.
0031500	L01AA01	ciklofosamid	ENDOXAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 500 mg	Baxter Oncology GmbH	Nemačka	370,30	-	-	-		
0031501	L01AA01	ciklofosamid	ENDOXAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 1 g	Baxter Oncology GmbH	Nemačka	694,90	-	-	-		
0031051	L01AA06	ifosamid	HOLOXAN	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 1 g	Baxter Oncology GmbH	Nemačka	2.157,10	-	-	-		
0038031	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	5.329,80	-	-	-		
0038030	L01AX04	dakarbazin	DAKARBAZIN	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 1000 mg	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	8.288,30	-	-	-		
0034180	L01BA01	metotreksat	METHOTREXATE	rastvor za injekciju	5 po 50 mg/2 ml	Pfizer PTY. Limited	Australija	1.766,40	-	-	-		
0034181	L01BA01	metotreksat	METHOTREXATE	rastvor za injekciju	1 po 500 mg/20 ml	Pfizer PTY. Limited	Australija	2.476,50	-	-	-		
0034151	L01BA01	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml, 15 mg/1,5 ml	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	1.216,00	-	-	-		
0034153	L01BA01	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 2 ml, 20 mg/2 ml	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	1.467,20	-	-	-		
0034154	L01BA01	metotreksat	METOJECT	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 2,5 ml, 25 mg/2,5 ml	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	1.807,10	-	-	-		
0034025	L01BB04	kladribin	LITAK	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 10 mg/5 ml	Lipomed AG	Švajcarska	146.745,30	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034020	L01BB05	fludarabin	FLUDARA ◊	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	5 po 50 mg	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	18.030,90	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i nehoćinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034801	L01BB05	fludarabin	SINDARABIN ◊	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 50 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	3.606,20	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i nehoćinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034800	L01BB05	fludarabin	FLUDARABINE-TeVa ◊	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (25 mg/ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	3.606,20	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i nehoćinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034019	L01BB05	fludarabin	FLUDARABIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (50 mg/2 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	3.606,20	-	-	-	Hronična limfocitna leukemija i nehoćinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Univerzitetska dečja klinika; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034140	L01BC01	clitarabin	CYTOSAR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	libočica sa rastvaračem u ampuli 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Actavis Italy S.P.A.	Italija	241,80	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034141	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (500 mg/10 ml)	Actavis Italy S.P.A.	Italija	1.184,70	-	-	-		
0034142	L01BC01	citarabin	CYTOSAR	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 1000 mg	Actavis Italy S.P.A.	Italija	2.103,10	-	-	-		
0034350	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg/5 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	241,80	-	-	-		
0034351	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 500 mg/10 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1.184,70	-	-	-		
0034352	L01BC01	citarabin	ALEXAN Ebewe	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2.103,10	-	-	-		
0034324	L01BC02	fluorouracil	5-FLUOROURACIL "Ebewe"	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (250 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	734,50	-	-	-		
0034023	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL - TEVA	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 5 ml (50 mg/ml)	Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company	Holandija	146,90	-	-	-		
0034024	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL - TEVA	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ml)	Pharmachemie B.V.; Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company	Holandija	189,00	-	-	-		
0034165	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL	rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	189,00	-	-	-		
0034167	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL	rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 20 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	350,00	-	-	-		
0034166	L01BC02	fluorouracil	FLUOROURACIL	rastvor za injekciju/infuziju	bočica, 1 po 100 ml (50 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	1.377,30	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034210	L01BC05	gemcitabin	GEMZAR ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 200 mg	Lilly France S.A.S.	Francuska	551,30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034211	L01BC05	gemcitabin	GEMZAR ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 1000 mg	Lilly France S.A.S.	Francuska	2.606,80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034426	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE 9	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	551,30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Uroeljalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034425	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN EBEWE 9	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg/100 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2.606,80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Uroeljalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034215	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN PharmaSwiss ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	551,30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Uroeljalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili takšana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034216	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN PharmaSwiss ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.605,80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Uroeljalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili takšana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034214	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN PharmaSwiss ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 g	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	10.216,80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum III/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektibilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034220	L01BC05	gemcitabin	GITRABIN ◊	prašak za rastvor za infuziju	1 po 200 mg	Actavis Italy S.p.a.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	551,30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum III/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektibilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034221	L01BC05	gemcitabin	GI TRABIN ◊	prašak za rastvor za infuziju	1 po 1000 mg	Actavis Italy S.p.a.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	2.606,80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez se lo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034551	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL ◊	prašak za rastvor za infuziju	boćica staklena, 1 po 200 mg	Vianex S.A	Grčka	551,30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez se lo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034550	L01BC05	gemcitabin	GEMNIL ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Vianex S.A	Grčka	2.606,80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Uroelijaalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti , Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034428	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN PLIVA 200 ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 200 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company, Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Hrvatska	551,30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Uroelijaalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti , Knez selo" KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034427	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABIN PLIVA 1000 ▽	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1000 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Hrvatska	2.606,80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektibilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0034000	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABINE ▽	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 26,3 ml (38 mg/ml)	Hospira UK Limited	Velika Britanija	2.606,80	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektibilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034001	L01BC05	gemcitabin	GEMCITABINE $\diamond$	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 5,3 ml (38 mg/ml)	Hospira UK Limited	Velika Britanija	551,30	-	-	-	1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1; 2. Urotelijalni karcinom (TCC): a) neoadjuvantna terapija kod lokalno uznapredovale bolesti (klinički stadijum II/III); b) sistemska terapija u metastatskoj bolesti (klinički stadijum IV), PS 0 ili 1; 3. Karcinom dojke, metastatska bolest, posle prethodne primene antraciklina i/ili taksana i/ili kapecitabina, PS 0 ili 1; 4. Adenokarcinom pankreasa, prva linija hemioterapije, uznapredovala neresektabilna ili metastatska bolest, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez slo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0030092	L01CA01	vinblastin	VINBLASTIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	libočica sa rastvaračem u ampulu, 1 po 5 ml (10 mg/5 ml)	Gedeon Richter Ltd.	Mađarska	1.044,50	-	-	-		
0030230	L01CA02	vin kristin	SINDOVIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	1 po 1 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	381,20	-	-	-		
0030240	L01CA04	vinorelbin	VINOELBIN	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 1 ml (10 mg/ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	1.519,20	-	-	-		
0030241	L01CA04	vinorelbin	VINOELBIN	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	6.152,50	-	-	-		
0030243	L01CA04	vinorelbin	VINOELBIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1.519,20	-	-	-		
0030242	L01CA04	vinorelbin	VINOELBIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	6.152,50	-	-	-		
0030111	L01CB01	etopozid	ETOPOSID "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	637,60	-	-	-		
0030121	L01CB01	etopozid	ETOPOSIDE-TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	637,60	-	-	-		
0030122	L01CB01	etopozid	SINTOPOZID	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	637,60	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039350	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL Ebeweh	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2.769,60	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločeljski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Iib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-Ila), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039351	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL Ebeweh	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg/16,7 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	8.770,40	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločeljski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Iib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-Ila), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođne leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039352	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL Ebewe	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (150 mg/25 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	14.430,40	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr. kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIB-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KCB Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039353	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL Ebewe	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 300 mg/50 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	28.293,50	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr. kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (IIB-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KCB Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039282	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL PHARMASWISS ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.769,60	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retreatman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Ib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-Ila), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 mesec); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KCB Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039500	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL - TEVA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	2.769,60	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retreatman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločelijski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Ib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-Ila), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 mesec); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KCB Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039501	L01CD01	paklitaksel	PACLITAXEL - TEVA 	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 16,7 ml (100 mg/16,7 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	8.770,40	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetloćeljski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Ib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIb-IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez slo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039020	L01CD01	paklitaksel	SINDAXEL 	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 30 mg/ 5 ml	S.C. Sindax-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A	Rumunija; Italija	2.769,60	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetloćeljski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Ib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinskim derivatima, klinički stadijum IIb-IV, PS 0 ili 1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez slo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039021	L01CD01	paklitaksel	SINDAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 100 mg/16,67 ml	S.C. Sinden-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A	Rumunija; Italija	8.770,40	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločeljski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Ib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platiniskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039852	L01CD01	paklitaksel	PATAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 1 po 5 ml, 30 mg/5 ml	Vianex S.A.	Grčka	2.769,60	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropetije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijuma: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločeljski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Ib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka ≥ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijuma; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platiniskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC: Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039850	L01CD01	paklitaksel	PATAXEL $\emptyset$	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 1 po 16,7 ml, 100 mg/16,7 ml	Vianex S.A.	Grčka	8.770,40	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod lasean senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijskog: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločeljski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Ib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka $\geq$ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijskog; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinimskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC, Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
1039851	L01CD01	paklitaksel	PATAXEL $\emptyset$	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, staklena, 1 po 50 ml, 300 mg/50ml	Vianex S.A.	Grčka	28.293,50	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest, PS 0 ili 1 – retretman kod lasean senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu kod pacijenata bez komorbiditeta vezanih za moguća neželjena dejstva leka (npr: kod pacijenata bez preegzistirajuće neuropatije); d) adjuvantna hemioterapija kod nodus negativne bolesti, kao sekvencijalni pristup u kombinaciji sa antraciklinima, u nedeljnom režimu, u slučaju da drugi prognostički faktori doprinose visokom riziku za relaps (HER 2-3+ ili ER i PGR 0 ili G3); e) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa nedeljnog režima (12 nedelja); 2. Karcinom ovarijskog: a) primarna hemioterapija za klinički stadijum Ic i Ila, sa visokim rizikom za relaps (svetločeljski podtip) i gradus 3; b) primarna hemioterapija za uznapredovali klinički stadijum (Ib-IV); c) prva linija u relapsu bolesti, za inicijalno rani klinički stadijum (Ia-IIa), za pacijente koji nisu primali paklitaksel u postoperativnom pristupu; d) relaps bolesti u paklitaksel-senzitivnih pacijenata (vreme od prethodne primene leka $\geq$ 6 meseci); e) paklitaksel u nedeljnim intervalima kao „salvage“ hemioterapija metastatskog karcinoma ovarijskog; 3. Nemikrocelularni karcinom pluća, prva linija u kombinaciji sa platinimskim derivatima, klinički stadijum IIb/IV, PS 0 ili 1.	STAC, Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039300	L01CD02	docetaksel	TAXOTERE ◊	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 1,5 ml (20 mg/0,5 ml)	Aventis Pharma Ltd.	Velika Britanija	2.192,00	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039301	L01CD02	docetaksel	TAXOTERE ◊	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa rastvaračem u bočici, 1 po 6 ml (80 mg/2 ml)	Aventis Pharma Ltd.	Velika Britanija	8.184,20	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039304	L01CD02	docetaksel	TAXOTERE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)	Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.	Nemačka; Velika Britanija	2.192,00	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039305	L01CD02	docetaksel	TAXOTERE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)	Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.	Nemačka; Velika Britanija	8.184,20	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039310	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL 0	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1,5 ml (20 mg/0,5 ml)	S.C. Sindan Pharma S.R.L.	Rumunija	2.192,00	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retreatman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039311	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL 0	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju	bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 6 ml (80 mg/2 ml)	S.C. Sindan Pharma S.R.L.	Rumunija	8.184,20	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retreatman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039725	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL SANDOZ ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 20 mg/2 ml	Ebewe Pharma GmbH NFG KG	Austrija	2.192,00	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retreatman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indicaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indicaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indicaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039796	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL SANDOZ ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 80 mg/8 ml	Ebewe Pharma GmbH NFG KG	Austrija	8.184,20	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retreatman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indicaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indicaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indicaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039315	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL-TEVA	koncentrat i rastvor za infuziju	bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 1,28 ml (20 mg/0,72 ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company, Pharmachemie B.V.	Madarska; Holandija	2.192,00	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa; 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta; 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039316	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL-TEVA	koncentrat i rastvor za infuziju	bočica sa koncentratom i bočica sa rastvaračem, 1 po 5,12 ml (80 mg/2,88 ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company, Pharmachemie B.V.	Madarska; Holandija	8.184,20	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke, sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa; 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta; 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039727	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL ⁰	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 1 ml (20 mg/1 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	2.192,00	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti: prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039728	L01CD02	docetaxel	DOCETAXEL ⁰	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	8.184,20	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti: prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039729	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL ♂	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 7 ml (140 mg/7 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	28.066,50	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039318	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL ♂	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 2 ml (10 mg/ml)	Hospira UK Limited	Velika Britanija	2.192,00	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 i uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0,5 ng/ml).	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039319	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 8 ml (10 mg/ml)	Hospira UK Limited	Velika Britanija	8.184,20	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 (uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0.5 ng/ml).	STAC, Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039320	L01CD02	docetaksel	DOCETAXEL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 16 ml (10 mg/ml)	Hospira UK Limited	Velika Britanija	32.076,00	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatska bolest, prva linija posle antraciklina, PS 0 ili 1 (sem kod bolesnica sa kontraindikacijama za primenu antraciklina gde može biti prva linija za metastatsku bolest bez obzira na vrstu prethodne adjuvantne hemioterapije); b) metastatska bolest PS 0 ili 1 - retretman kod taksan senzitivne bolesti; c) adjuvantna hemioterapija kod nodus pozitivne bolesti, prvenstveno kod bolesnica sa veoma visokim rizikom za relaps, kao sekvencijalni pristup, u kombinaciji sa antraciklinima; d) lokalno uznapredovali karcinom dojke , sekvencijalna primena nakon prethodne primene antraciklina, u slučaju izostanka terapijskog odgovora na antracikline (SD, PD), najviše do četiri ciklusa. 2. Nemikrocelularni karcinom pluća, druga linija hemioterapije, klinički stadijum IIIB, PS 0 ili 1, posle platinskog dubleta. 3. Karcinom prostate, hormon refraktorna bolest, bez značajnih komorbiditeta, PS 0 ili 1 (uz kastracioni nivo serumskog testosterona (<0.5 ng/ml).	STAC, Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KCB Bežanijska kosa; Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0033050	L01DB01	doksorubicin	SINDROXOCIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	1 po 10 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	209,10	-	-	-		
0033051	L01DB01	doksorubicin	SINDROXOCIN	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	1 po 50 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	1.051,50	-	-	-		
0033170	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICIN - TEVA	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 10 mg	Pharmachemie B.V.	Holandija	209,10	-	-	-		
0033171	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICIN - TEVA	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 1 po 50 mg	Pharmachemie B.V.	Holandija	1.051,50	-	-	-		
0033190	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	209,10	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0033191	L01DB01	doksorubicin	DOXORUBICIN "Ebewe"	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (50 mg/25 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	1.051,50	-	-	-		
0033060	L01DB02	daunorubicin	DAUNOBLASTINA	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (20 mg/10 ml)	Actavis Italy S.P.A.	Italija	741,50	-	-	-		
0033112	L01DB03	epirubicin	FARMORUBICIN R.D.	injekcija	1 po 10 mg sa rastv.	Actavis Italy S.P.A.	Italija	279,20	-	-	-		
0033113	L01DB03	epirubicin	FARMORUBICIN R.D.	injekcija	1 po 50 mg sa rastv.	Actavis Italy S.P.A.	Italija	1.395,40	-	-	-		
0033130	L01DB03	epirubicin	EPISINDAN	liofilizat za rastvor za infuziju	1 po 10 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	279,20	-	-	-		
0033131	L01DB03	epirubicin	EPISINDAN	liofilizat za rastvor za infuziju	1 po 50 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	1.395,40	-	-	-		
0033121	L01DB03	epirubicin	EPIRUBICIN	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (2 mg/ml)	Medac GmbH	Nemačka	984,80	-	-	-		
0033122	L01DB03	epirubicin	EPIRUBICIN	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (2 mg/ml)	Medac GmbH	Nemačka	4.922,20	-	-	-		
0033123	L01DB03	epirubicin	EPIRUBICIN	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (2 mg/ml)	Medac GmbH	Nemačka	9.844,40	-	-	-		
0033241	L01DB07	mitoksantron	MITOXANTRON "Ebewe" ^o	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 mg/5 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	5.340,80	-	-	-	1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije; 2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KCB Bežanijska kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deleta Srbije „Dr Vukan Čupić“, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0033242	L01DB07	mitoksantron	MITOXANTRON "Ebewe" ^o	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 mg/10 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	10.241,80	-	-	-	1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije; 2. Sekundarna progresivna multipla skleroza.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KCB Bežanijska kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deleta Srbije „Dr Vukan Čupić“, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0033220	L01DC01	bleomicin	BLEOCIN-S	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 15000 i.j.	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	2.110,70	-	-	-		
0031330	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN "Ebewe"	rastvor za infuziju	1 po 10 mg/20 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	271,00	-	-	-		
0031332	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN "Ebewe"	rastvor za infuziju	1 po 50 mg/100 ml	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	858,20	-	-	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031251	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN	rastvor za infuziju	1 po 50 ml (1 mg/ml)	Pfizer PTY. Limited	Australija	858,20	-	-	-		
0031283	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN-TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (10 mg/20 ml)	Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Holandija, Hrvatska	271,00	-	-	-		
0031282	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN-TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (50 mg/100 ml)	Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Holandija, Hrvatska	858,20	-	-	-		
0031223	L01XA01	cisplatin	SINPLATIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (10 mg/10 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	271,00	-	-	-		
0031224	L01XA01	cisplatin	SINPLATIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.	Rumunija	858,20	-	-	-		
0031220	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (0,5 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	271,00	-	-	-		
0031221	L01XA01	cisplatin	CISPLATIN	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 100 ml (0,5 mg/ml)	Medac Gesellschaft für Klinische Spezialpräparate M.B.H	Nemačka	858,20	-	-	-		
0031240	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 15 ml (10 mg/ml)	Pfizer PTY. Limited	Australija	1.582,70	-	-	-		
0031304	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN-TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 15 ml (150 mg/15 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	1.582,70	-	-	-		
0031305	L01XA02	karboplatin	CARBOPLATIN-TEVA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 45 ml (450 mg/45 ml)	Pharmachemie B.V.	Holandija	5.419,20	-	-	-		
0031308	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	602,30	-	-	-		
0031306	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	1.582,70	-	-	-		
0031307	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	5.419,20	-	-	-		
0031309	L01XA02	karboplatin	CARBOPLASIN	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 60 ml (10 mg/ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	7.713,90	-	-	-		
0031397	L01XA03	oksaliplatin	ELOXATIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 10 ml (5 mg/ml)	Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.	Nemačka; Velika Britanija	2.543,20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031398	L01XA03	oksaliplatin	ELOXATIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 20 ml (5 mg/ml)	Sanofi - Aventis Deutschland GmbH; Aventis Pharma Ltd.	Nemačka; Velika Britanija	5.086,50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031361	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 100 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	5.086,50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031360	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 mg	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	2.543,20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031364	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN-PLIVA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company, Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Holandija; Hrvatska	2.543,20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031365	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN-PLIVA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company; Pharmachemie B.V.; Pliva Hrvatska d.o.o.	Mađarska; Holandija; Hrvatska	5.086,50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031000	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN HF ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 100 mg	Cell Pharm GMBH	Nemačka	5.086,50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođačke leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031001	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN HF ◊	prašak za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 50 mg	Cell Pharm GMBH	Nemačka	2.543,20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereselektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031367	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 10 ml (50 mg/10 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	2.543,20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereselektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031368	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (100 mg/20 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	5.086,50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereselektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031366	L01XA03	oksaliplatin	SINOXAL ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 40 ml (200 mg/40 ml)	Actavis Italy S.P.A.; S.C.Sindan-Pharma S.R.L.	Italija; Rumunija	10.172,90	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereselektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0031402	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	2.543,20	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/nereselektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0031403	L01XA03	oksaliplatin	OXALIPLATIN EBEWE ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	5.086,50	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039291	L01XX19	irinotekan	CAMPTO ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 100 mg /5 ml	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	3.008,30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039290	L01XX19	irinotekan	CAMPTO ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	1.460,40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039296	L01XX19	irinotekan	CAMPTO ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica plastična, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml)	Pfizer (Perth) PTY. Ltd.	Australija	13.192,80	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039295	L01XX19	irinotekan	IRINOTESIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	S.C. Sinden-Pharma S.R.L.	Rumunija	1.460,40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039294	L01XX19	irinotekan	IRINOTESIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	3.008,30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039355	L01XX19	irinotekan	IRINOTESIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 25 ml (100 mg/5 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	18.569,80	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039551	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Cipla LTD.	Indija	1.460,40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039550	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Cipla LTD.	Indija	3.008,30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039317	L01XX19	irinotekan	VIARITEC ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Vianex S.A.	Grčka	1.460,40	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.
0039314	L01XX19	irinotekan	VIARITEC ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Vianex S.A.	Grčka	3.008,30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresehtabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu prebivališta osiguranog lica.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođne leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039312	L01XX19	irinotekan	IRINOTECAN EBEWE		bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG	Austrija	3.008,30	-	-	-	Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/heresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Nastavak terapije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou u mestu probavilišta osiguranog lica.
0037021	L02AE02	leuprorelin	LUPRON		prasek i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (3,75 mg/ml)	Abbott Laboratories S.A.	Španija	9.444,40	0,134 mg	337,48	-	1. Endometrioza (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61)	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037020	L02AE02	leuprorelin	LUPRON		prasek i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (11,25 mg/ml)	Abbott Laboratories S.A.	Španija	28.333,10	0,134 mg	337,48	-	1. Endometrioza (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037070	L02AE03	goserelin	ZOLADEX		napunjen injekcioni špric, 1 po 3,6 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	10.388,10	0,129 mg	372,24	-	1. Endometrioza (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61); 5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci. 6. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. 4. i 5. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037071	L02AE03	goserelin	ZOLADEX LA		napunjen injekcioni špric, 1 po 10,8 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	30.629,10	0,129 mg	365,85	-	1. Endometrioza (N80); 2. Medikamentna kastracija za karcinom dojke (C50) u trajanju terapije do 36 meseci; 3. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 4. Karcinom prostate, metastatski PS 0-2 (C61); 5. Karcinom prostate, lokalizovana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 meseci.	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja konzilijuma za endokrinozavisne tumore koga čine endokrinolog, onkolog i ginekolog, a pod tačkom 3. 4. i 5. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
0037091	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE		prasek i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (3,75 mg/2 ml)	Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.	Francuska; Republika Srbija	9.527,80	0,134 mg	340,46	-	1. Endometrioza (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci , kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C61); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C61); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8) 5. Lečenje neplodnosti žene u postupku BMPO (N97).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0037092	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (11,25 mg/ 2 ml)	Ipsen Pharma Biotech; PharmaSwiss d.o.o.	Francuska; Republika Srbija	28.583,10	0,134 mg	340,46	-	1. Endometrijoza (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C81); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C81); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0037093	L02AE04	triptorelin	DIPHERELINE	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju sa produženim oslobađanjem	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 1 po 2 ml (22,5 mg/2 ml)	Ipsen Pharma Biotech	Francuska	57.166,20	0,134 mg	340,46	-	1. Endometrijoza (N80); 2. Karcinom prostate, lokalno uznapredovali, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 meseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1 (C81); 3. Karcinom prostate, metastatski PS 0 ili 2 (C81); 4. Pravi (centralni) prerani pubertet (E22.8).	STAC ; Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja tri lekara - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, pod tačkom 2. i 3. na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou, a pod tačkom 4. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0069135	L03AA02	filgrastim	NEUPOGEN	rastvor za infuziju/injekciju, špric	napunjen injekcionim špric, 1 po 0,5 ml/30000000 i.j.	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	3.430,30	0,35 mg	4.002,02	-		STAC
0069134	L03AA02	filgrastim	NEUPOGEN	rastvor za infuziju/injekciju, špric	napunjen injekcionim špric, 1 po 0,5 ml/48000000 i.j.	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	5.425,90	0,35 mg	3.956,39	-		STAC
0069137	L03AA02	filgrastim	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špric, 5 po 0,2 ml (12Mj/0,2ml)	Hospira Enterprises B.V.	Holandija	11.174,70	0,35 mg	6.518,58	-		STAC
0069138	L03AA02	filgrastim	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špric, 5 po 0,5 ml (30Mj/0,5ml)	Hospira Enterprises B.V.	Holandija	17.151,60	0,35 mg	4.002,04	-		STAC
0069139	L03AA02	filgrastim	NIVESTIM	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špric, 5 po 0,5 ml (48Mj/0,5ml)	Hospira Enterprises B.V.	Holandija	27.129,30	0,35 mg	3.956,36	-		STAC
0069130	L03AA02	filgrastim	ZARZIO	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špric, 1 po 0,5 ml (30 Mj/0,5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	3.430,30	0,35 mg	4.002,02	-		STAC
0069131	L03AA02	filgrastim	ZARZIO	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcionim špric, 1 po 0,5 ml (48 Mj/0,5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	5.425,90	0,35 mg	3.956,39	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0328336	L03AB04	interferon alfa 2a	ROFERON A	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 1 po 3000000 i.j./0,5 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.365,20	2 M.j.	910,13	-	1. Hronični hepatitis B: a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) + b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci. za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci. -Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 2. Hronični hepatitis C: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci. b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+) c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje. 3. Hronična mijeloidna leukemija. 4. Trihroleukemija. 5. Održavanje remisije multiplog mijeloma. 8. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrine tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.	
0328337	L03AB04	interferon alfa 2a	ROFERON A	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 1 po 4500000 i.j./0,5 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	1.979,30	2 M.j.	879,69	-	1. Hronični hepatitis B: a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) + b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci. za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci. -Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 2. Hronični hepatitis C: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci. b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+) c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. e)Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje. 3. Hronična mijeloidna leukemija. 4. Trihroleukemija. 5. Održavanje remisije multiplog mijeloma. 8. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrine tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.	

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0328339	L03AB04	interferon alfa 2a	ROFERON A	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 1 po 9000000 i.j./0,5 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	4.019,20	2 Mj.	893,16	-	1. Hronični hepatitis B: a) Ose forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) + b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci. za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci. -Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 2. Hronični hepatitis C: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci. b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+) c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje. 3. Hronična mijeloidna leukemija. 4. Triloboleukemija 5. Odlašavanje remisije multiplog mijeloma. 6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinne tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.	
0328645	L03AB04	interferon alfa 2a	ROFERON A	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 0,6ml (18 Mj/0,6 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	10.036,70	2 Mj.	1.115,19	-	1. Hronični hepatitis B: a) Ose forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) + b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci. za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci. -Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 2. Hronični hepatitis C: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci. b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+) c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje. 3. Hronična mijeloidna leukemija. 4. Triloboleukemija 5. Odlašavanje remisije multiplog mijeloma. 6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinne tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.	

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0328183	L03AB05	interferon alfa 2b – rekombinantni	INTRON A	rastvor za injekciju, pen sa uloskom	1 po 18 Mi.j./1,2 ml	Schering Plough Central East AG	Irska	10.361,20	2 Mi.j.	1.151,24	-	1. Hronični hepatitis B: a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) + b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci. za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci. -Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 2. Hronični hepatitis C: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci. b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+) c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje. 3. Hronična mijeloidna leukemija. 4. Trih leukemija. 5. Održavanje remisije multiplog mijeloma. 6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinne tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.	
0328657	L03AB05	interferon alfa 2b – rekombinantni	REALDIRON	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 5 po 3 Mi.j.	Sicor Biotech UAB	Litvanija	4.419,50	2 Mi.j.	589,27	-	1. Hronični hepatitis B: a) Obe forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV DNK (PCR) + b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre e) Isključiti bolesnike sa kontraindikacijama za primenu interferona f) Doze: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 4-6 meseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j. 3x nedeljno, 12-24 meseci. za decu: 5-6 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 4-6 meseci. -Lek se daje na osnovu mišljenja infektologa i hepatologa/gastroenterologa. 2. Hronični hepatitis C: a) Antitela na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 meseci. b) Prisutna replikacija HCV (HCV RNK-PCR+) c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrednosti) d) Histološki dokazana aktivna (nekroinflamacija i/ili fibroza) bolest jetre: hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. e) Doza: rekombinirani interferon alfa se primenjuje u dozi od 3 miliona i.j. 3x nedeljno, 52 nedelje za decu: 5 miliona i.j./m² 3x nedeljno, 52 nedelje. 3. Hronična mijeloidna leukemija. 4. Trih leukemija. 5. Održavanje remisije multiplog mijeloma. 6. Neuroendokrini tumori na osnovu mišljenja konzilijuma za neuroendokrinne tumore Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra.	
0039421	L03AX03	živi atenuirani bacili M.bovis, soj BCG	IMMUCYST	prašak za intravezikalnu suspenziju	bočica, 1 po 81 mg	Sanofi Pasteur Limited; Sanofi-Aventis ZRT.	Kanada; Madarska	8.789,60	1,8 mg	195,32	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0010221	L04AA04	anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića	ATG FRESENIUS S	koncentrat za rastvor za infuziju	10 po 5 ml (20 mg/ml)	Neovii Biotech GmbH	Nemačka	278.807,20	-	-	-		STAC
0010220	L04AA04	anti-humani T limfocitni imunoglobulin kunića	ATG FRESENIUS S	koncentrat za rastvor za infuziju	1 po 5 ml (20 mg/ml)	Neovii Biotech GmbH	Nemačka	27.880,60	-	-	-		STAC
0014111	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 250 mg/5 ml (50 mg/ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	9.996,50	0,25 g	999,65	-		STAC; Samo za pacijente nakon transplantacije.
0162440	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	rastvor za injekciju	5 po 3 ml (75 mg/3 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	112,60	0,1 g	30,03	-		
0162192	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 3 ml (75 mg/3 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	112,60	0,1 g	30,03	-		
1162485	M01AB05	diklofenak	RAPTEN-K	obložena tableta	blister, 10 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	57,70	0,1 g	11,54	-		
1162487	M01AB05	diklofenak	RAPTEN DUO	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	263,80	0,1 g	11,72	-		
1162190	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	film tableta	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	76,80	0,1 g	7,68	-		
1162193	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	149,70	0,1 g	7,49	-		
1162441	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	film tableta	blister, 20 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	76,80	0,1 g	7,68	-		
1162442	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	149,70	0,1 g	7,49	-		
5162445	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN	supozitorija	10 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	134,50	0,1 g	26,90	-		
1162403	M01AB05	diklofenak	DIKLOFEN DUO	kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 75 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	263,80	0,1 g	11,72	-		
5162648	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAK	supozitorija	10 po 50 mg	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	99,00	0,1 g	19,80	-		
1162402	M01AB05	diklofenak	DIKLOFENAC-RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	Alvogen d.o.o.	Republika Srbija	149,70	0,1 g	7,49	-		
1162520	M01AB15	ketorolak	ZODOL	film tableta	10 po 10 mg	Hemofarm a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche, Švajcarska	Republika Srbija	469,60	30 mg	140,88	-		
0162522	M01AB15	ketorolak	ZODOL	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 30 mg/ml	Hemofarm a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche, Švajcarska	Republika Srbija	253,00	30 mg	50,60	-		
1162555	M01AB16	aceklofenak	AFLAMIL	film tableta	blister, 20 po 100 mg	Gedeon Richter PLC	Mađarska	354,10	0,2 g	35,41	-		
0161022	M01AC06	meloksikam	MOVALIS	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1,5 ml (15 mg/1,5 ml)	Boehringer Ingelheim Espana S.A.	Španija	222,70	15 mg	44,54	-		
1161300	M01AC06	meloksikam	MELOKSİKAM PHARMAS	tableta	blister, 20 po 7,5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	113,70	15 mg	11,37	-		
1161301	M01AC06	meloksikam	MELOKSİKAM PHARMAS	tableta	blister, 20 po 15 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	165,70	15 mg	8,29	-		
1161108	M01AC06	meloksikam	MELOXAN	tableta	blister, 30 po 15 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	248,50	15 mg	8,28	-		
1161302	M01AC06	meloksikam	MELOXAN	tableta	blister, 20 po 15 mg	Pharmanova d.o.o.	Republika Srbija	165,70	15 mg	8,29	-		
1161051	M01AC06	meloksikam	MELOGAL	tableta	blister, 10 po 15 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	82,80	15 mg	8,28	-		
1162531	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	91,20	1,2 g	9,12	-		
1162532	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN	film tableta	blister, 30 po 600 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	131,80	1,2 g	8,79	-		
1162512	M01AE01	ibuprofen	RAPIDOL	film tableta	blister, 30 po 400 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	91,20	1,2 g	9,12	-		
1162513	M01AE01	ibuprofen	RAPIDOL	film tableta	blister, 30 po 600 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	131,80	1,2 g	8,79	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1162423	M01AE02	naproksen	NAPROXSEN	film tableta	blister, 20 po 375 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	180,30	0,5 g	12,02	-		
0162088	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	rastvor za injekciju	10 ampula po 100 mg/2 ml	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	345,80	0,15 g	51,87	-		
1162089	M01AE03	ketoprofen	KETONAL FORTE	film tableta	bočica staklena, 20 po 100 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	158,30	0,15 g	11,87	-		
1162220	M01AE11	tiaprofenska kiselina	TURGANIL	tableta	blister, 20 po 300 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	222,60	600 mg	22,26	-		
0082320	M03AB01	suksametnijum	MIDARINE	rastvor za injekciju/infuziju	100 po 2 ml (100 mg/2 ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	4.417,60	-	-	-		STAC
0082290	M03AC04	atrakurijum besilat	TRACRIUM	rastvor za injekciju	5 po 25 mg/2,5 ml	GlaxoSmithKline SPA	Italija	897,30	-	-	-		STAC
0082291	M03AC04	atrakurijum besilat	TRACRIUM	rastvor za injekciju	5 po 50 mg/5 ml	GlaxoSmithKline SPA	Italija	1.794,80	-	-	-		STAC
0082052	M03AC09	rokuronijum bromid	ESMERON	rastvor za injekciju	10 po 5 ml (50 mg/5 ml)	N.V. Organon	Holandija	4.848,60	-	-	-		STAC
0082051	M03AC09	rokuronijum bromid	ESMERON	rastvor za injekciju	10 po 10 ml (100 mg/10 ml)	N.V. Organon	Holandija	9.834,10	-	-	-		STAC
0082410	M03AC11	cisatrakurijum	NIMBEX	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 2,5 ml (2 mg/ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH	Italija; Nemačka	1.360,40	-	-	-		STAC
0082411	M03AC11	cisatrakurijum	NIMBEX	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 5 ml (2 mg/ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.; Aspen Bad Oldesloe GmbH	Italija; Nemačka	2.720,50	-	-	-		STAC
0082111	M03AX01	toksin clostridium botulinum tip A	DYSPORE	prašak za rastvor za injekciju	bočica, 2 po 500LD50jed.	Ipsen Biopharm Limited	Velika Britanija	54.205,30	-	-	-	1. Cerebralna paraliza sa spastičtetom i/ili distonijom i urednim mentalnim stanjem (G80.0, G80.1, G80.2, G80.3, G80.8); 2. Spazmodična distonija, blefarospazam, hemifacijalni spazam, tortikolis (cervikalna distonija), (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.8, G24.9, G24.0, G51.3); 3. Postapopleksična distonija šake, ruke i stopala. (G81.8, G83.1, G83.2).	STAC
0059089	M05BA06	ibandronska kiselina	BONVIVA	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 3 ml (3 mg/3 ml)	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	8.438,30	6 mg	16.876,60	-	Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) kod žena kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata zbog nemogućnosti efikasne apsorpcije. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa: - o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ukusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0059213	M05BA08	zolendronska kiselina	ACLASTA	rastvor za infuziju	bočica, 1 po 100 ml (0,05 mg/ml)	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	32.872,10	4 mg	26.297,68	-	1. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) sa povećanim rizikom od fraktura kao i kod bolesnika sa nedavnom frakturom kuka usled lake povrede, a kod kojih nije moguća primena oralnih bisfosfonata. Nemogućnost primene oralnih bisfosfonata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa: - o postojanju hroničnog gastritisa ili erozivnog gastritisa ili ukusne bolesti ili pogoršanja postojeće bolesti jednaka ili želuca ili creva verifikovano gastroskopskim nalazom ili - o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije, 2. Za lečenje teških oblika osteoporoze (DEXA T vrednosti ≤ -3,5 SD) povezane sa dugotrajnom terapijom sistemskim glukokortikoidima kod žena u postmenopauzi i muškaraca sa povećanim rizikom od fraktura. 3. Terapija Paget-ove bolesti.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
9080091	N01AB01	halotan	HALOTAN	para za inhalaciju, tečnost	bočica staklena, 5 po 50 ml (99,99%)	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	4.977,80	-	-	-		
0086161	N01AB06	izofluran	FORANE	para za inhalaciju, tečnost	bočica, 1 po 100 ml (100%)	Aesica Queenborough Ltd.	Velika Britanija	2.864,20	-	-	-		STAC
9080161	N01AB08	sevofluran	SEVORANE	para za inhalaciju, tečnost	boca plastična, 1 po 250 ml (100%)	Aesica Queenborough Ltd.	Velika Britanija	17.106,90	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0087552	N01AH01	fentanil	FENTANYL	rastvor za injekciju	50 po 2 ml (0,05 mg/1 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.619,80	-	-	-		STAC
0087555	N01AH01	fentanil	FENTANYL	rastvor za injekciju	50 po 10 ml (0,05 mg/1 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	7.108,50	-	-	-		STAC
0087575	N01AH02	alfentanil	RAPIFEN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 10 ml (0,5 mg/1 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	14.734,70	-	-	-		STAC
0087171	N01AH03	sufentanil	SUFENTA forte	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 5 ml (0,25 mg/5 ml)	Glaxo Smith Kline Manufacturing S.p.a.	Italija	2.418,50	-	-	-		STAC
0087621	N01AH06	remifentanil	ULTIVA	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 2 mg/5 ml	Glaxo Operations UK Limited	Velika Britanija	4.927,80	-	-	-		STAC
0080300	N01AX07	etomidat	HYPNOMIDATE	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 10 ml (2 mg/ml)	GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.	Italija	537,90	-	-	-		STAC
0080420	N01AX10	propofol	PROPOFOL 1% Fresenius	rastvor za injekciju	5 po 20 ml (10 mg/ml)	Fresenius Kabi	Austrija	1.131,30	-	-	-		STAC
0080421	N01AX10	propofol	PROPOFOL 1% Fresenius	rastvor za injekciju	1 po 50 ml (10 mg/ml)	Fresenius Kabi	Austrija	627,30	-	-	-		STAC
0080423	N01AX10	propofol	PROPOFOL 1% Fresenius	rastvor za injekciju	1 po 100 ml (10 mg/ml)	Fresenius Kabi	Austrija	1.121,40	-	-	-		STAC
0080432	N01AX10	propofol	PROPOFOL LIPURO 1%	emulzija za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 20 ml (10 mg/1 ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	1.131,30	-	-	-		STAC
0080431	N01AX10	propofol	PROPOFOL LIPURO 1%	emulzija za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 50 ml (10 mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	6.273,20	-	-	-		STAC
0080430	N01AX10	propofol	PROPOFOL LIPURO 1%	emulzija za injekciju/infuziju	bočica, 10 po 100 ml (10 mg/ml)	B. Braun Melsungen AG	Nemačka	11.214,00	-	-	-		STAC
0081581	N01BB01	bupivakain	MARCAINE 0.5%	rastvor za injekciju	bočica staklena, 5 po 20 ml (5 mg/ml)	Recipharma Monts	Francuska	1.213,60	-	-	-		STAC
0081582	N01BB01	bupivakain	MARCAINE SPINAL 0.5%	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)	Cenexi SAS	Francuska	2.387,80	-	-	-		STAC
0081583	N01BB01	bupivakain	MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 4 ml (5 mg/ml)	Cenexi SAS	Francuska	2.528,00	-	-	-		STAC
0081222	N01BB02	lidokain	LIDOKAIN-HLORID 1%	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 3,5 ml (35 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	210,60	-	-	-		
0081560	N01BB02	lidokain	LIDOKAIN-HLORID 2%	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (40 mg/2 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.048,00	-	-	-		
0081011	N01BB10	levobupivakain	CHIROCAINE	rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 10 po 10 ml (5 mg/ml)	Abbvie S.R.L.	Italija	4.103,10	-	-	-		STAC
0081540	N01BB52	lidokain, adrenalin (epinefrin)	LIDOKAIN 2%-ADRENALIN	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2 ml (40 mg+0,025 mg)	Galenika a.d.	Republika Srbija	865,20	-	-	-		
0087854	N02AA01	morfin	MORFIN HIDROHLORID ALKALOID	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 20 mg/ml	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	688,70	30 mg	103,31	-		
0087018	N02AB02	petidin hidrohlorid	DOLANTIN	rastvor za injekciju	5 po 2 ml/100 mg	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	551,20	400 mg	440,96	-		STAC
0087531	N02AX02	tramadol	TRODON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	157,40	0,3 g	188,88	-		
0087533	N02AX02	tramadol	TRODON	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 2 ml (100 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	220,00	0,3 g	132,00	-		
0086431	N02BB02	metamizol natrijum	NOVALGETOL	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 2,5 g/5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.345,40	3 g	32,29	-		
0086418	N02BB02	metamizol natrijum	ANALGIN	rastvor za injekciju	ampula 50 po 2,5 g/5 ml	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.345,40	3 g	32,29	-		
0086930	N02BE01	paracetamol	PARACETAMOL PHARMASWISS	rastvor za infuziju	boca, 10 po 100 ml (10 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.296,80	3 g	689,04	-		

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0084520	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON NATRIUM	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i ampula sa rastvaračem, 5 po 2 ml (220 mg/2 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	256,80	0,1 g	23,35	-		
0084405	N03AE01	klonazepam	RIVOTRIL	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju sa rastvaračem u ampuli, 5 po 1 ml (1 mg/ml)	ampula sa rastvaračem u ampuli, 5 po 1 ml (1 mg/ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	576,40	8 mg	922,24	-		
0084502	N03AG01	valproinska kiselina	DEPAKINE	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	llobočica sa rastvaračem, 4 po 4 ml (400 mg/4 ml)	Gruppo Lepetit S.p.a.; Glaxo Wellcome Production	Italija; Francuska	3.542,40	1,5 g	3.321,00	-		
0085353	N04BB01	amantadin sulfat	PK MERZ	rastvor za infuziju	10 po 500 ml (200 mg)	Merz Pharmaceuticals GmbH	Nemačka	16.255,90	-	-	-	STAC; U terapiji off-faze parkinsonizma koji ne reaguju na peroraini oblik amantadina.	
0070261	N05AB02	flufenazin	MODITEN Depo	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (25 mg/ml)	Krka Tovarna Zdravil d.d. u saradnji sa Bristol-Myers-Squibb, USA	Slovenija	1.135,70	1 mg	9,09	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070207	N05AD01	haloperidol	HALDOL DEPO	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)	Krka Tovarna Zdravil d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija	Slovenija	1.420,90	3,3 mg	18,76	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070200	N05AD01	halopendol	HALDOL	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (5 mg/ml)	Krka Tovarna Zdravil d.d. u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija	Slovenija	306,00	8 mg	48,96	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070654	N05AE04	ziprasidon	ZELDOX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	1 po 1,2 ml (20 mg/ml)	Pfizer PGM	Francuska	1.397,30	40 mg	2.328,83		1. Agitacija kod shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja za pacijente sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primenjena antipsihotika (F20-F29); 2. Agitacija kod manične i mešovite epizode povezane sa bipolarnim poremećajima sa ili bez psihotičnih simptoma (F31.1; F31.2; F31.6).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0070972	N05AF05	zukupentiksol dekanolat	CLOPIXOL ACUPHASE	rastvor za injekciju	ampula, 5 po 1 ml (50 mg/ml)	H. Lundbeck A/S	Danska	2.872,20	30 mg	344,66	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070973	N05AF05	zukupentiksol	CLOPIXOL DEPOT	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 1 ml (200 mg/ml)	H. Lundbeck A/S	Danska	3.136,00	15 mg	23,52	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070925	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 25 mg	Cilag Ltd.	Švajcarska	10.918,70	2,7 mg	1.179,22	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070926	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 37,5 mg	Cilag Ltd.	Švajcarska	14.153,90	2,7 mg	1.019,08	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070927	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT CONSTA	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 1 po 50 mg	Cilag Ltd.	Švajcarska	17.497,80	2,7 mg	944,88	-	Shizofrenija, shizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) 1. Nekomplijantni pacijenti i/ili koji imaju neželjene efekte na klasičnim depoima koji se ne mogu tolerisati. 2. Rezistentni na klasične depo antipsihotike (pod rezistencijom se podrazumeva neadekvatan odgovor na dva klasična antipsihotika u roku od 6 meseci).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0070131	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	20.329,20	2,5 mg	1.016,46	-	Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompljanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primerjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070132	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 0,75 ml (75 mg/0,75 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	26.409,20	2,5 mg	880,31	-	Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompljanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primerjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070134	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (100 mg/1 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	32.494,80	2,5 mg	812,37	-	Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompljanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primerjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0070133	N05AX13	paliperidon	XEPLION	suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem	napunjen injekcioni špric, 1 po 1,5 ml (150 mg/1,5 ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	46.644,00	2,5 mg	777,40	-	Pacijenti sa shizofrenijom koji su u pogoršanju zbog neadekvatne kompljanse, a kod kojih je nekad tokom tretmana bolesti primerjivan risperidon.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
0071123	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	rastvor za injekciju	10 po 10 mg/2 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	281,50	10 mg	28,15	-		
0071834	N05CD08	midazolam	DORMICUM	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 5 mg/5 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	662,90	15 mg	198,87	-		STAC
0071835	N05CD08	midazolam	DORMICUM	rastvor za injekciju	5 po 15 mg/3 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	794,80	15 mg	158,96	-		STAC
0072741	N06AA04	klonipramin	ANAFRANIL	rastvor za injekciju	10 po 25 mg/2 ml	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	354,20	0,1 g	141,68	-		
0088065	N07AA01	neostigmin metilsulfat	NEOSTIGMINE	rastvor za injekciju	ampula, 50 po 1 ml (2,5 mg/ml)	Cooper S.A.	Grčka	1.479,60	2 mg	23,67	-		STAC
3087506	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralni rastvor	bočica, 1 po 100 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	1.131,20	25 mg	28,28	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
3087507	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralni rastvor	bočica, 1 po 1000 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Makedonija	10.976,80	25 mg	27,44	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
2087516	N07BC02	metadon	METADON MOLTENI	oralni rastvor	bočica plastična, 1 po 1000 ml (5 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Società Di Esercizio S.P.A.	Italija	5.048,00	25 mg	25,24	-	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
0058334	R06AC03	hloropiramin	SYNOPEN	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 20 mg/2 ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	785,20	20 mg	78,52	-		
0119150	R07AA...	porakant alfa	CUCROSURF	suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje	bočica staklena, 2 po 1,5 ml (120 mg/1,5 ml)	Chiesi Farmaceutici S.P.A; Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Italija; Austrija	89.960,70	0,16 g	59.973,80	-		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neonatologa ili pedijatra uz overu načelnika i direktora zdravstvene ustanove.
7097030	S01HA03	tetrakain	TETRAKAIN	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 10 ml (0,5%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	153,10	-	-	-		
0180030	V03AB14	protamin	PROTAMIN SULFAT	rastvor za injekciju	5 po 50 mg/5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.354,20	-	-	-		STAC
0189100	V03AB25	flumazenil	ANEXATE	rastvor za injekciju	5 po 0,5 mg/5 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	4.315,00	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0189101	V03AB25	fiumazenil	ANEXATE	rastvor za injekciju	5 po 1 mg/10 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	9.521,50	-	-	-		STAC
0184034	V03AF03	kalcijum folinat	CALCIUMFOLINAT "Ebewe"	rastvor za injekciju/infuziju	ampula, 5 po 3 ml (30 mg/3 ml)	Ebewe Pharma Ges. M.B.H.NFG. KG	Austrija	1.153,00	60 mg	461,20	-		STAC
0184027	V03AF03	kalcijum folinat	LEUCOVORIN Kalcijum	rastvor za injekciju	ampula, 10 po 50 mg/5 ml	Pfizer (Parth) PTY. Ltd.	Australija	2.363,10	60 mg	283,57	-		STAC
0184100	V03AF03	kalcijum folinat	FOLCASIN	rastvor za injekciju/infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (30 mg/10 ml)	S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A	Rumunija; Italija	230,60	60 mg	461,20	-		STAC
0012070	V04CF01	prečišćeni proteinski derivat tuberkulina za humanu upotrebu	PPD-T TUBERKULIN	rastvor za injekciju	10 po 2,5 ml (3 i.j./0,1ml)	Institut za virusologiju, vakcine i serume "Torlak"	Republika Srbija	19.610,80	-	-	-		
0176042	V07AB...	voda za injekcije	VODA ZA INJEKCIJE	rastvor za injekciju	50 po 5 ml	Galenika a.d.	Republika Srbija	1.350,00	-	-	-		
0176185	V07AB...	voda za injekcije	AQUA PRO INJECTIONE	rastvarač za parenteralnu upotrebu	50 po 5 ml	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	1.350,00	-	-	-		
0176183	V07AB...	voda za injekcije	AQUA PRO INJECTIONE	rastvarač za parenteralnu upotrebu	ampula, 50 po 10 ml	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	2.700,00	-	-	-		
0176184	V07AB...	voda za injekcije	AQUA PRO INJECTIONE	rastvarač za parenteralnu upotrebu	50 po 2 ml	Jugoremedija a.d.	Republika Srbija	540,00	-	-	-		
2194362	V08AA05	joksitaminska kiselina	TELEBRIX GASTRO	rastvor za oralnu i rektalnu primenu	1 po 100 ml (300 mg/ml)	Guerbet	Francuska	714,90	-	-	-		STAC
0199210	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 50 ml (300 mg l/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	14.057,90	-	-	-		STAC
0199211	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 100 ml (300 mg l/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	30.417,40	-	-	-		STAC
0199214	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	boca plastična, 10 po 50 ml (350 mg l/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	14.403,40	-	-	-		STAC
0199215	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 100 ml (350 mg l/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	28.806,90	-	-	-		STAC
0199217	V08AB02	joheksol	OMNIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 200 ml (350 mg l/ml)	GE Healthcare Ireland	Irska	55.285,90	-	-	-		STAC
0194350	V08AB03	joksaglat meglumin, joksaglat natrijum	HEXABRIX 320	rastvor za injekciju	1 po 50 ml (320 mg/ml)	Guerbet	Francuska	1.359,90	-	-	-		STAC
0194351	V08AB03	joksaglat meglumin, joksaglat natrijum	HEXABRIX 320	rastvor za injekciju	1 po 100 ml (320 mg/ml)	Guerbet	Francuska	2.582,40	-	-	-		STAC
0194292	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 300	rastvor za infuziju	10 po 50 ml (300)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	17.369,20	-	-	-		STAC
0194293	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 300	rastvor za infuziju	10 po 100 ml (300)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	32.039,70	-	-	-		STAC
0194255	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	10 po 50 ml (370)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	20.363,90	-	-	-		STAC
0194258	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	10 po 100 ml (370)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	39.505,60	-	-	-		STAC
0194257	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	boca staklena, 10 po 200 ml (370 mg joda/ml)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	78.949,10	-	-	-		STAC
0194259	V08AB05	jopromid	ULTRAVIST 370	rastvor za infuziju	boca staklena, 8 po 500 ml (768,86 mg/ml)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	157.843,80	-	-	-		STAC
0199406	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 50 ml sa 300 mg joda/ml (63,6%)	Mallinckrodt Canada ULC	Kanada	16.037,20	-	-	-		STAC
0199411	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 75 ml (300 mg joda/ml)	Mallinckrodt Canada ULC	Kanada	24.376,60	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0199413	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 100 ml (300mg joda/ml)	Mallinckrodt Canada ULC	Kanada	31.272,60	-	-	-		STAC
0199412	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 150 ml (300 mg joda/ml)	Mallinckrodt Canada ULC	Kanada	47.534,30	-	-	-		STAC
0199415	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 200 ml (300 mg joda/ml)	Mallinckrodt Canada ULC	Kanada	60.981,60	-	-	-		STAC
0199416	V08AB07	joversol	OPTIRAY 300	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 5 po 500 ml (300 mg joda/ml)	Mallinckrodt Canada ULC	Kanada	59.418,10	-	-	-		STAC
0199407	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 50 ml sa 350 mg joda/ml (74.2%)	Mallinckrodt Canada ULC	Švajcarska	16.037,20	-	-	-		STAC
0199408	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 100 ml (350 mg joda/ml)	Mallinckrodt Canada ULC	Kanada	31.272,60	-	-	-		STAC
0199409	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 10 po 200 ml (350 mg joda/ml)	Mallinckrodt Canada ULC	Kanada	60.981,60	-	-	-		STAC
0199410	V08AB07	joversol	OPTIRAY 350	rastvor za injekciju i infuziju	boca, 5 po 500 ml (350 mg joda/ml)	Mallinckrodt Canada ULC	Kanada	59.418,10	-	-	-		STAC
0199463	V08AB09	jodiksanol	VISIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 50 ml (320 mg l/ml)	GE Healthcare AS	Norveška	19.588,20	-	-	-		
0199464	V08AB09	jodiksanol	VISIPAQUE	rastvor za injekciju	10 po 100 ml (320 mg l/ml)	GE Healthcare AS	Norveška	39.038,30	-	-	-		
0199480	V08AB11	jobitridol	XENETIX 300	rastvor za injekciju	1 po 50 ml (300 mg/ml)	Guerbet	Francuska	1.586,20	-	-	-		STAC
0199481	V08AB11	jobitridol	XENETIX 300	rastvor za injekciju	1 po 100 ml (300 mg/ml)	Guerbet	Francuska	3.172,00	-	-	-		STAC
0199482	V08AB11	jobitridol	XENETIX 350	rastvor za injekciju	1 po 50 ml (350 mg/ml)	Guerbet	Francuska	1.691,40	-	-	-		STAC
0199483	V08AB11	jobitridol	XENETIX 350	rastvor za injekciju	1 po 100 ml (350 mg/ml)	Guerbet	Francuska	3.320,20	-	-	-		STAC
3192101	V08BA02	barijum sulfat	BARIJUM SULFAT	oralna/rektalna suspenzija	kontejner plastični, 1 po 5 l (1 g/ml)	Hemofarm d.o.o.	Republika Srbija	3.868,50	-	-	-		
0199430	V08CA01	gadopentetat dimeglumin (gadopentetinska kiselina)	MAGNEVIST	rastvor za injekciju	bočica, 10 po 20 ml (469,01 mg/ml)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	22.425,80	-	-	-		STAC
0199015	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 5 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	738,00	-	-	-		STAC
0199021	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 5 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	7.379,80	-	-	-		STAC
0199011	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	1.476,00	-	-	-		STAC
0199017	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 10 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	14.759,40	-	-	-		STAC
0199012	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 15 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	2.213,30	-	-	-		STAC
0199018	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 15 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	22.133,70	-	-	-		STAC
0199013	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 20 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	2.242,60	-	-	-		STAC

Lista B - Lekovi koji se primenjuju u toku ambulantnog, odnosno bolničkog lečenja u zdravstvenim ustanovama

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0199019	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 20 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	22.425,80	-	-	-		STAC
0199014	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 30 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	3.364,70	-	-	-		STAC
0199020	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 30 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	33.646,50	-	-	-		STAC
0199010	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 100 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	11.213,00	-	-	-		STAC
0199016	V08CA01	gadopentetska kiselina	MAGNEGITA 500	rastvor za injekciju	bočica staklena, 10 po 100 ml (500 mcml/ml)	Biokanol Pharma GmbH, Nemačka za Insight Agents GmbH	Nemačka	112.129,40	-	-	-		STAC
0199475	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAREM	rastvor za injekciju	15 ml po (0,5 mmol/ml)	Guerbet	Francuska	3.659,70	-	-	-		STAC
0199476	V08CA02	gadoterična kiselina	DOTAREM	rastvor za injekciju	20 ml po (0,5 mmol/ml)	Guerbet	Francuska	4.571,50	-	-	-		STAC
0199486	V08CA09	gadobutrol	GADOVIST	rastvor za injekciju	10 po 30 ml (1,0 mmol/ml)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	205.805,60	-	-	-		STAC
0199487	V08CA09	gadobutrol	GADOVIST	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 5 po 7,5 ml (604,72 mg/ml, 1 mmol/ml)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	26.724,80	-	-	-		STAC
0199535	V08CA10	gadoksetinska kiselina	PRIMOVI/ST	rastvor za injekciju	napunjen injekcioni špric, 1 po 10 ml (181,43 mg/ml)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	18.258,30	-	-	-		STAC

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0089152	B03XA01	epoetin alfa	EPREX	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 6 po 2000 i.j./0,5 ml	Cilag AG	Švajcarska	6.785,50	1000 i.j.	565,46	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0089157	B03XA01	epoetin alfa	EPREX	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 6 po 10000 i.j. (brizgalica)	Cilag AG	Švajcarska	31.366,00	1000 i.j.	522,77	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0089165	B03XA01	epoetin beta	RECORMON	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 6 brizg. po 2000 i.j./0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	6.785,50	1000 i.j.	565,46	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0089166	B03XA01	epoetin beta	RECORMON	rastvor za injekciju, špric	napunjen injekcioni špric, 6 brizg. po 5000 i.j./0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	20.876,50	1000 i.j.	695,88	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0089221	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	565,50	1000 i.j.	565,50	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0089222	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,3 ml (1000 i.j./0,3 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	3.392,80	1000 i.j.	565,47	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0089226	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.130,90	1000 i.j.	565,45	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0089227	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,6 ml (2000 i.j./0,6 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	6.785,50	1000 i.j.	565,46	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0089230	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,9 ml (3000 i.j./0,9 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.696,40	1000 i.j.	565,47	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0089231	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,9 ml (3000 i.j./0,9 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	10.178,30	1000 i.j.	565,46	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069234	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.261,80	1000 i.j.	565,45	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069235	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 6 po 0,4 ml (4000 i.j./0,4 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	13.570,90	1000 i.j.	565,45	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069223	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 1 ml (10000 i.j./ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	5.654,60	1000 i.j.	565,46	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069220	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 5 po 1 ml (10000 i.j./ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	33.927,60	1000 i.j.	565,46	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069224	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,5 ml (20000 i.j./0,5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	11.309,20	1000 i.j.	565,46	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069228	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,75 ml (30000 i.j./0,75 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	16.963,80	1000 i.j.	565,46	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069232	B03XA01	epoetin zeta	EQRALYS	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 1 ml (40000 i.j./ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	22.618,40	1000 i.j.	565,46	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l - za ovu indikaciju obavezno je pre primene eritropoetina obavezno popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika.	
0069939	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric, 1 po 0,4 ml (10 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	1.256,60	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069938	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj. špric 1 po 0,375 ml (15 mcg/0,375 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	1.884,90	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje)	
0069924	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj. špric, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	2.513,20	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje)	
0069928	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj. špric 1 po 0,3 ml (30 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	3.769,80	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje)	
0069929	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj. špric 1 po 0,4 ml (40 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	5.026,40	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje)	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069933	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	6.283,00	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069934	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	7.539,60	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069936	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	10.052,80	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069920	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj.špric 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	12.566,00	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069922	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj špric 1 po 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	18.849,00	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdjaliziranost bolesnika. 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069926	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	napunjen inj špric 1 po 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	37.698,00	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdjaliziranost bolesnika. 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069925	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (20 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	2.513,20	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdjaliziranost bolesnika. 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069930	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,4 ml (40 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	5.026,40	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdjaliziranost bolesnika. 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069935	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,3 ml (60 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	7.539,60	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069937	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,4 ml (80 mcg/0,4 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	10.052,80	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069921	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	12.566,00	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069923	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,3 ml (150 mcg/0,3 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	18.849,00	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
006927	B03XA02	darbepoetin alfa	ARANESP	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,6 ml (300 mcg/0,6 ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	37.698,00	4,5 mcg	565,47	-	1. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama gde se vrši dijaliza: samo za lečenje anemije u hroničnoj insuficijenciji bubrega sa hemoglobinom nižim od 90 g/l do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina popuniti depoe gvožđa, sanirati infekcije i zapaljenska stanja i obezbediti dobru izdijaliziranost bolesnika. 2. Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj insuficijenciji bubrega, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. - za ovu indikaciju obavezno je pre primene darbepoetina: korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
006926	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 50 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	8.334,50	4 mcg	666,76	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. Za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
006925	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 75 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	12.501,75	4 mcg	666,76	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. Za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
006924	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	1 po 100 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	16.669,00	4 mcg	666,76	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. Za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
006923	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	napunjeni injekcioni špric, 1 po 150 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	25.003,50	4 mcg	666,76	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. Za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
006922	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	napunjeni injekcioni špric, 1 po 200 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	33.338,00	4 mcg	666,76	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. Za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
006921	B03XA03	metoksipolietilenglikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju	napunjeni injekcioni špric, 1 po 250 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	41.672,50	4 mcg	666,76	-	Primenjuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l. Za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0069213	B03XA03	metokspolietilengl ikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 30 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	5.000,70	4 mcg	666,76	-	Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l Za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069212	B03XA03	metokspolietilengl ikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 30 mcg/0,3 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	20.002,80	4 mcg	666,76	-	Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l Za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
0069214	B03XA03	metokspolietilengl ikol - epoetin beta	MIRCERA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 1 po 360 mcg/0,6 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	60.008,40	4 mcg	666,76	-	Primenuje se u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou a na osnovu mišljenja lekara nefrologa: za lečenje pacijenata sa anemijom u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji, kod kojih su vrednosti klirensa kreatinina ≤ 50 ml/min, do postizanja i održavanja ciljnih vrednosti hemoglobina 110 g/l Za ovu indikaciju obavezno je pre primene dugodelujućih preparata eritropoetina korigovati sve razloge za nastanak anemije (nadoknada gvožđa, vitamina, drugih nutritivnih faktora, zaustaviti krvarenje).	
1031407	L01AX03	temozolomid	TEMODAL $\emptyset$	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 5 mg	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	1.930,90	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
1031405	L01AX03	temozolomid	TEMODAL $\emptyset$	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 20 mg	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	7.936,10	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
1031408	L01AX03	temozolomid	TEMODAL $\emptyset$	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 100 mg	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	39.683,60	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
1031406	L01AX03	temozolomid	TEMODAL $\emptyset$	kapsula, tvrda	bočica, 5 po 250 mg	Schering Plough Labo N.V.	Belgija	99.007,40	-	-	-	Glioblastoma multiforme kod bolesnika sa pozitivnim metilacionim statusom MGMT gena, PS 0 ili 1 (ECOG) kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračenju, lečenje nastaviti temozolomidom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemioterapije se vrši po uvidu u MRI učinjen 3-4 nedelja posle operativnog lečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko po pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0034413	L01BA04	pemetreksed	ALIMTA 0	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 500 mg	Lilly France S.A.S	Francuska	129.686,20	-	-	-	Maligni pleuralni mezoteliom, uznapredovala neresektabilna bolest, PS 0 ili 1.	STAC: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KC Kragujevac.
1034341	L01BC06	kapecitabin	XELODA 0	film tableta	blister, 120 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Productos Roche S.A. DE C.V	Švajcarska, Meksiko	20.093,90	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiji; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
1034340	L01BC06	kapecitabin	XELODA 0	film tableta	blister, 60 po 150 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd., Productos Roche S.A. DE C.V	Švajcarska, Meksiko	3.252,50	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiji; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
1034445	L01BC06	kapecitabin	XALVOBIN 0	film tableta	blister, 120 po 500 mg	Alvogen Pharma d.o.o	Republika Srbija	15.993,20	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiji; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU, PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1034444	L01BC06	kapeotabin	XALVOBIN ◊	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	2 428,90	-	-	-	1. Karcinom dojke: a) metastatski karcinom dojke, nakon prethodne primene antraciklina i/ili taksana PS 0, 1 ili 2; b) metastatski karcinom dojke, prva linija sistemske terapije kod pacijenata sa kontraindikacijama za primenu antraciklina i taksana PS 0, 1 ili 2. 2. Kolorektalni karcinom: a) adjuvantna hemioterapija u kliničkom stadijumu Dukes "C", PS 0 ili 1, ili nastavak adjuvantne terapije, pri razvoju toksičnosti gr. 3-4 na 5FU/LV hemioterapiju; b) metastatska bolest, kod očekivanih neželjenih efekata na hemioterapiju koja sadrži 5FU; PS 0, 1 ili 2.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
0033181	L01DB06	idarubicin	ZAVEDOS ◊	liofilizat za rastvor za injekciju	1 po 10 mg	Actavis Italy S.P.A.	Italija	11.649,90	-	-	-		STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - Univerzitetska dečja klinika, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš
0014140	L01XC02	rituksimab	MABTHERA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 2 po 10 ml (100 mg/10 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	47.487,50	-	-	-	1. Nehoćinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83 0; C83 1; C83 3; C83 8; C83 9). 2. Nehoćinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82). 3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to: a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB), i b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje DAS28 skora za najmanje 1,2). Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi. 4. Hronična limfocitna leukemija: a) prva linija: - u okviru imunohemoterapijskog protokola RFC; b) druga linija: - ako je relaps nakon primene imunohemoterapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije; - ako nije primenjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC; - ako je nakon imunohemoterapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodič podrazumevaju primeru R sa nekim drugim hemoterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014141	L01XC02	rituksimab	MABTHERA ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 50 ml (500 mg/50 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	117.245,50	-	-	-	1. Nemoćinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: difuzni krupoćelijski, novodijagnostikovani uz hemioterapiju (C83 0; C83 1; C83 3; C83 8; C83 9). 2. Nemoćinski limfomi, CD20 pozitivan, podtip: folikularni, novodijagnostikovani i u recidivu bolesti (C82). 3. Reumatoidni artritis (M05 i M06) - rituksimab u kombinaciji sa metotreksatom uvodi se u terapiju ukoliko su ispunjena oba kriterijuma i to: a) posle šest meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više ili postoje elementi nepodnošljivosti lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB); i b) posle šest meseci od početka primene prethodnog biološkog leka nije postignut adekvatan klinički odgovor tj. poboljšanje (smanjenje) DAS28 skora za najmanje 1,2). Ukoliko je započeto lečenje rituksimabom, neophodno je terapijske cikluse ponavljati na šest meseci ili nakon dužeg perioda, u zavisnosti od stanja bolesnika i broja limfocita u perifernoj krvi. 4. Hronična limfocitna leukemija: a) prva linija: - u okviru imunoheмотerapijskog protokola RFC; b) druga linija: - ako je relaps nakon primene imunoheмотerapije nastao nakon više od 24 meseca može se ponoviti terapija prve linije; - ako nije primerjen u prvoj terapijskoj liniji a planira se primena u kombinaciji sa FC; - ako je nakon imunoheмотerapije RFC došlo do relapsa nakon manje od 24 meseca ukoliko aktuelni institucioni vodič podrazumeva primenu R sa nekim drugim hemoterapijskim agensima različitim nego u prvoj liniji.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1., 2. i 4. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić”, - Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš Za indikaciju pod tačkom 3. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO
0039345	L01XC03	trastuzumab	HERCEPTIN ◊	prašak i rastvarač za koncentrat za rastvor za infuziju	libočica sa rastvaračem, 1 po 20 ml (440 mg/20 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	165.552,70	-	-	-	Karcinom dojke, HER2 prekomerna ekspresija (IHH 3+ ili CISH+): a) adjuvantna hemoterapija - kao nastavak adjuvantne hemoterapije antraciklinima kao monoterapija ili u kombinaciji sa taksanima do ukupno 12 meseci, kod nodus pozitivnih pacijenata i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontraindikacija za antracikline, trastuzumab kombinovati sa neantraciklinskim režimima); b) metastatska bolest- PS 0 ili 1, prva linija posle antraciklinske terapije, u kombinaciji sa taksanima, 6 do 8 ciklusa, a potom u odsustvu progresije bolesti, nastaviti samo Herceptin do progresije bolesti; c) lokalno uznapredovali karcinom dojke: primena Herceptina u kombinaciji sa taksanskom hemoterapijom, a nakon prethodne sekvencijalne primene antraciklina. Kod ove grupe nastavak primene Herceptina u adjuvantnom tretmanu, nakon operacije, do ukupno godinu dana, računajući i primenu Herceptina u neoadjuvantnom pristupu.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
0039153	L01XC06	cetuximab	ERBITUX ◊	rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (5 mg/ml)	Merck KGaA	Nemačka	19.034,20	-	-	-	1. Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatin i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija ili u kombinaciji sa irinotekanom; 2. Planocelularni karcinom glave i vrata: a) istovremeno sa radioterapijom kod pacijenata sa PS 0 ili 1 u lokalno uznapredovalom, inoperabilnom planocelularnom karcinomu usne duplje i orofarinksa, kod kojih je lečenje započeto indukcionom hemioterapijom; b) lokalno uznapredovala, inoperabilna bolest, u kombinaciji sa radioterapijom, PS 0 ili 1, u pacijenata kod kojih je kontraindikovana primena lekova na bazi platinne; c) u kombinaciji sa standardnom hemioterapijom (5FU-cisplatin ili 5FU-karboptatin) prva linija za rekurentni planocelularni karcinom glave i vrata koji nije podoban za lokoregionalni tretman, bez egzulceracije, PS 0-1.	STAC; Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Niš, - KC Kragujevac; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0039401	L01XC07	bevacizumab	AVASTIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 4 ml (100 mg/4 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	29.245,10	-	-	-	Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb ili IVc, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac
0039400	L01XC07	bevacizumab	AVASTIN ◊	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 16 ml (400 mg/16 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	117.126,30	-	-	-	Karcinom kolorektuma, potencijalno resektabilna metastatska bolest dominantno u jetri, klinički stadijum IVb ili IVc, prva linija sistemske terapije, u kombinaciji sa hemioterapijom, a u koliko se postigne resektabilnost metastaza i odgovarajuća operacija istih, i postoperativno, ukupno maksimalno 10 ciklusa.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac
1039384	L01XE01	imatinib	ANZOVIP ◊	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Zdravlje a.d	Republika Srbija	126.740,70	-	-	-	1. Prva terapijska linija kod novodijagnostikovanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, u hroničnoj fazi bolesti, Philadelphia hromozom ili bcr-abl rearanžman pozitivni, bez dodatnih aberacija, uz dozvoljenu prethodnu leukoredukciju hidrokortisonom do šest meseci. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić”; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039385	L01XE01	imatinib	ANZOVIP 0	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Zdravije a.d.	Republika Srbija	126.740,70	-	-	-	1. Prva terapijska linija kod novodijagnostikovanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, u hroničnoj fazi bolesti, Philadelphia hromozom ili bcr-abl rearanžman pozitivni, bez dodatnih aberacija, uz dozvoljenu prethodnu leukoredukciju hidroksiureom do šest meseci. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
1039393	L01XE01	imatinib	ALVOTINIB 0	film tableta	blister, 60 po 100 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	63.370,80	-	-	-	1. Prva terapijska linija kod novodijagnostikovanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, u hroničnoj fazi bolesti, Philadelphia hromozom ili bcr-abl rearanžman pozitivni, bez dodatnih aberacija, uz dozvoljenu prethodnu leukoredukciju hidroksiureom do šest meseci. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“; Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039394	L01XE01	imatinib	ALVOTINIB ◊	film tableta	blister, 120 po 100 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	126.740,70	-	-	-	1. Prva terapijska linija kod novodijagnostikovanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, u hroničnoj fazi bolesti, Philadelphia hromozom ili bcr-abl rearanžman pozitivni, bez dodatnih aberacija, uz dozvoljenu prethodnu leukoredukciju hidroksiureom do šest meseci. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić”. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.
1039397	L01XE01	imatinib	ALVOTINIB ◊	film tableta	blister, 30 po 400 mg	Alvogen Pharma d.o.o.	Republika Srbija	126.740,70	-	-	-	1. Prva terapijska linija kod novodijagnostikovanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, u hroničnoj fazi bolesti, Philadelphia hromozom ili bcr-abl rearanžman pozitivni, bez dodatnih aberacija, uz dozvoljenu prethodnu leukoredukciju hidroksiureom do šest meseci. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Ćupić”. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039392	L01XE01	imatinib	IMATINIB PHARMASWISS ◊	film tableta	blister, 120 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	126.740,70	-	-	-	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. 1. Prva terapijska linija kod novodijagnostikovanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, u hroničnoj fazi bolesti, Philadelphia hromozom ili bcr-abl rearranžman pozitivni, bez dodatnih aberacija, uz dozvoljenu prethodnu leukoredukciju hidroksiureom do šest meseci. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	
1039389	L01XE01	imatinib	IMATINIB PHARMASWISS ◊	film tableta	blister, 30 po 400 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	126.740,70	-	-	-	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Univerzitetska dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za gastroenterologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac. 1. Prva terapijska linija kod novodijagnostikovanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, u hroničnoj fazi bolesti, Philadelphia hromozom ili bcr-abl rearranžman pozitivni, bez dodatnih aberacija, uz dozvoljenu prethodnu leukoredukciju hidroksiureom do šest meseci. 2. GIST (Gastro intestinalni stromalni tumori) - lokalno uznapredovali inoperabilni ili metastatski oblik bolesti, PS 0 ili 1.	
1039398	L01XE02	gefitinib	IRESSA ◊	film tableta	30 po 250 mg	AstraZeneca UK Limited	Velika Britanija	206.330,10	-	-	-	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez slo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa. Nesitnoćeljski karcinom pluća u stadijumu IIIB i IV u prvoj liniji lečenja kod pacijenata sa pozitivnim testom na mutaciju tirozin kinaze receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK), PS 0 ili 1.	
1039402	L01XE03	erlotinib	TARCEVA ◊	film tableta	blister, 30 po 25 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	43.823,30	-	-	-	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez slo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa. Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIB i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.	

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039403	L01XE03	erlotinib	TARCEVA ◊	film tableta	blister, 30 po 100 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	151 214,00	-	-	-	Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa
1039404	L01XE03	erlotinib	TARCEVA ◊	film tableta	blister, 30 po 150 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	182.328,50	-	-	-	Adenokarcinom pluća u stadijumu IIIb i IV u drugoj liniji sistemskog lečenja kod bolesnika sa PS 0 ili 1, kod kojih je u prethodnom lečenju registrovana značajna toksičnost.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za pulmologiju KC Srbije, - Institut za plućne bolesti Vojvodine, - Klinika za plućne bolesti „Knez selo“ KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa.
1039703	L01XE04	sunitinib	SUTENT ◊	kapsula, tvrda	blister, 28 po 12,5 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	110.714,50	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetločeljski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš.
1039704	L01XE04	sunitinib	SUTENT ◊	kapsula, tvrda	blister, 28 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	220.365,20	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetločeljski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš.
1039706	L01XE04	sunitinib	SUTENT ◊	kapsula, tvrda	blister, 28 po 50 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	440.376,50	-	-	-	Lokalno odmakli i/ili metastatski karcinom bubrežnih ćelija (svetločeljski podtip), kod bolesnika dobre ili intermedijarne prognoze sa PS 0 ili 1, u prvoj liniji sistemskog lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za urologiju KCS, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za onkologiju KC Niš.
1039715	L01XE07	lapatinib	TYVERB ◊	film tableta	blister, 70 po 250 mg	Glaxo Wellcome Operations, Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija, Španija	116.591,90	-	-	-	Karcinom dojke - druga linija metastatskog HER2 pozitivnog karcinoma dojke, u kombinaciji sa lekom kapecitabin, kod pacijenata sa progresijom osnovne bolesti i PS 0-1, prethodno lečenih antraciklinima i/ili taksanima i lekom trastuzumab, koji je primenjen u prvoj liniji lečenja metastatske bolesti.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za onkologiju KC Niš, - Institut za onkologiju Vojvodine, - KC Kragujevac.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039710	L01XE08	nilotinib	TASIGNA ◊	kapsula, tvrda	blister, 112 po 200 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	353.773,20	-	-	-	Druga terapijska linija kod odraslih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, otpornih ili netolerantnih na bar jednu prethodnu terapiju, uključujući imatinib mesilat.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac
1069140	L01XX14	tretinoin	VESANOID ◊	kapsula, meka	bočica staklena, 100 po 10 mg	Cenexi, Cheplapharm Arzneimittel GmbH	Francuska, Nemačka	16.226,20	-	-	-	Akutna mijeloidna leukemija, podtip akutna promijelocitna leukemija.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Klinika za hematologiju KC Srbije, - Univerzitetna dečja klinika, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - KC Kragujevac, - Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Sroje „Dr Vukan Čupić”, - Institut za decu i omladinu Vojvodine, - Klinika za dečje interne bolesti KC Niš, - KBC Bežanijska Kosa.
0039100	L01XX32	bortezomib	VELCADE ◊	prašak za rastvor za injekciju	1 po 3,5 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	115.350,80	-	-	-	Multipli mijelom: a) u prvoj terapijskoj liniji kod visoko rizičnih bolesnika sa renalnom insuficijencijom (kirens kreatinina manji od 60 ml/min) i/ili citogenetskim abnormalnostima visokog rizika /del 13, t(4; 14), t(14; 16)/ i/ili sa rizikom od tromboembolijskih komplikacija; b) u recidivu bolesti uz odsustvo značajne periferne polineuropatije (WHO gradus 2-4).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO, a na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova: - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, - Klinika za hematologiju KC Srbije, - KBC Bežanijska Kosa, - Institut za onkologiju Vojvodine, - Klinika za hematologiju KC Vojvodine, - Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju KC Niš, - Klinika za onkologiju KC Niš, - KC Kragujevac
0328388	L03AB07	interferon beta 1a	REBIF	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (44 mcg/0,5 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	83.112,10	-	-	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328387	L03AB07	interferon beta-1a	REBIF	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 12 po 0,5 ml (22 mcg/0,5 ml)	Merck Serono S.P.A.	Italija	74.683,50	-	-	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328647	L03AB07	interferon beta 1a	AVONEX	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 4 po 0,5 ml (30 mcg/0,5 ml)	Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS	Danska	67.142,90	4,3 mcg	2.405,95	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015150	L03AB08	interferon beta 1b	BETAFERON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i rastvarač u napunjenom injekcionom špricu, 15 po 1,2 ml (250 mcg/ml)	Bayer Schering Pharma AG	Nemačka	77.752,00	4 Mj.	2.159,78	-	Multipla skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328630	L03AB10	peginterferon alfa-2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (50 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	7.797,30	7,5 mcg	1.169,60	-	Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (neko/inflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vremena se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0328631	L03AB10	peginterferon alfa - 2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (80 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	12.436,50	7,5 mcg	1.165,92	-	Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nektroinflatorna aktivnost sa ili bez fibroze); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol, prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328900	L03AB10	peginterferon alfa - 2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (100 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	15.757,60	7,5 mcg	1.181,82	-	Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nektroinflatorna aktivnost sa ili bez fibroze); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol, prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328632	L03AB10	peginterferon alfa - 2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (120 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	18.426,30	7,5 mcg	1.151,64	-	Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nektroinflatorna aktivnost sa ili bez fibroze); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol, prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0328633	L03AB10	peginterferon alfa-2b	PEGINTRON	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	pen sa uoškom, 1 po 0,5 ml (150 mcg/0,5 ml)	Schering Plough Company	Irska	23.824,60	7,5 mcg	1.191,23	-	Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekrainflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vremnja se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328607	L03AB11	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12.371,00	26 mcg	2.382,56	-	1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekrainflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vremnja se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja. 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je: a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci; b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml); c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze; d. vremnja (HBV DNK) ≤ 10. kopija /ml krvi.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0328608	L03AB11	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	16.494,70	26 mcg	2.382,57	-	1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci; - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (neinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja. 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je: a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci; b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml); c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze; d. viremija (HBV DNK) ≤ 10⁷ kopija /ml krvi.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0328604	L03AB11	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u peni sa uloškom	pen sa uloškom, 1 po 0,5 ml (135 mcg/0,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	12.371,00	26 mcg	2.382,56	-	1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci; - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (neinflamatorna aktivnost sa ili bez fibroza); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Vremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja. 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je: a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci; b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml); c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze; d. viremija (HBV DNK) ≤ 10⁷ kopija /ml krvi.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0328603	L03AB11	peginterferon alfa-2a	PEGASYS	rastvor za injekciju u penu sa uoškom	pen sa uoškom, 1 po 0,5 ml (180 mcg/0,5 ml	F. Hoffmann-La Roche Ltd	Švajcarska	16 494,70	26 mcg	2 382,57	-	1. Hronični HEPATITIS C sa ili bez kompenzovane ciroze jetre uzrokovane virusom hepatitisa C koji treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: a. virusološki profil: - anti HCV antitela pozitivna u serumu najkraće 6 meseci, - pozitivan HCV RNK i određen genotip virusa; b. biohemijski nalaz: - bez fibroze: povišena aktivnost transaminaza ili - sa fibrozom: bez povišene aktivnosti transaminaza; c. histološki dokazano hronično zapaljenje jetre (nekrinflatorna aktivnost sa ili bez fibroza); d. bolesnici kojima nije rađena biopsija jetre zbog kontraindikacije, a ispunjavaju sve ostale uslove; e. bolesnici koji apstiniraju od i.v. droga i alkohola, najmanje 12 meseci uz potvrdu neuropsihijatra/psihijatra; f. isključiti bolesnike sa prisutnim kontraindikacijama na terapiju pegilovanim interferonom i ribavirinom. Terapijski protokol: prema kriterijumima za lečenje hroničnih oboljenja jetre (hroničnog hepatitisa i kompenzovane ciroze jetre) uzrokovanih virusom hepatitisa C (HCV) kombinovanom terapijom (pegilovani interferon alfa + ribavirin). Trajanje terapije zavisi od genotipa virusa kao i od terapijskog odgovora koji se proverava u 4., 12. i 24. nedelji lečenja. Viremija se proverava 24. i 72. nedelje od završetka lečenja. 2. Hronični hepatitis B za pacijente kod kojih je: a. HBsAg pozitivnost duža od 6 meseci; b. povišena aktivnost alaninaminotransferaze (ALT povišena >2,5 odnosno >100 IU/ml); c. hronični hepatitis, sa ili bez fibroze; d. viremija (HBV DNK) ≤ 10⁷ kopija /ml krvi.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0015120	L03AX13	glatiramer acetat	COPAXONE	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 28 po 1 ml (20 mg/ml)	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	Izrael; Holandija	70 748,50	20 mg	2 526,73	-	Multipia skleroza	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014310	L04AB01	etanercept	ENBREL	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica i napunjen injekcioni špric, 4 po 1 ml (25 mg/1 ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	46 859,40	7 mg	3 280,16	-	1. Poliartrikularni juvenilni hronični artritis (M08) za pacijente čija je bolest počela u dobi od 2 do 17 godina života, sa neadekvatnim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove najmanje tokom šest meseci terapije; 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflatornog leka (NSAID), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflatornog leka (NSAID), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođač leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014312	L04AB01	etanercept	ENBREL		rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu napunjen injekcionim špricom sa iglom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	92.833,00	7 mg	3.249,16	-	1. Poliartrikularni juvenilni hronični artritis (M08) za pacijente čija je bolest počela u dobi od 2 do 17 godina života, sa neadekvatnim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove najmanje tokom šest meseci terapije; 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili obolevi i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014313	L04AB01	etanercept	ENBREL		rastvor za injekciju u peni sa uoškom pen sa uoškom, 4 po 1 ml (50 mg/ml)	Wyeth Pharmaceuticals	Velika Britanija	92.833,00	7 mg	3.249,16	-	1. Poliartrikularni juvenilni hronični artritis (M08) za pacijente čija je bolest počela u dobi od 2 do 17 godina života, sa neadekvatnim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove najmanje tokom šest meseci terapije; 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili obolevi i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014220	L04AB02	infliximab	REMICADE	prahak za koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 100 mg	Janssen Biologics B.V.	Holandija	54 111,80	3,75 mg	2 029,19	-	1. Teška, aktivna forma Crohnove bolesti - inflamatorni tip sa/bez fistule kod pacijenata koji nisu reagovali na konvencionalnu terapiju kortikosteroidima, imunomodulatorima i primarnu nutritivnu terapiju kao i kod onih pacijenata koji pomenute lekove ne podnose ili kod kojih je takva vrsta terapije kontraindikovana; 2. Teški i vrlo teški oblik aktivnog ulceroznog kolitisa, kod pacijenata koji su imali neadekvatan odgovor na konvencionalnu terapiju uključujući kortikosteroide i imunomodulatore (6-merkaptopurin ili azatioprin), odnosno koji ne podnose ili imaju medicinske kontraindikacije za takvu terapiju; 3. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 4. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 (ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 5. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSA/L), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSA/L), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci).	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014202	L04AB04	adalimumab	HUMIRA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni špric, 2 po 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)	Abbvie Biotechnology GmbH	Nemačka	94 497,30	2,9 mg	3 425,53	-	1. Aktivni poliartrikularni juvenilni hronični artritis (M08) za pacijente uzrasta od 4 godine i starije, sa neadekvatnim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lekove najmanje tokom šest meseci terapije; 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 (ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSA/L), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSA/L), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci); 4. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 5. Za lečenje teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti (K50); kod bolesnika kod kojih prethodno lečenje kortikosteroidima i imunosupresivima nije dalo zadovoljavajući odgovor, ili postoji kontraindikacija za pomenutu konvencionalnu terapiju.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0014205	L04AB06	golimumab	SIMPONI	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjen injekcioni šprica, 1 po 0,5 ml (50 mg/0,5 ml)	Janssen Biologics B.V.	Holandija	106.784,30	1,66 mg	3.545,24	-	1. Psorijazni artritis (M07) ukoliko je ispunjen kriterijum da postoji prisustvo aktivne zglobne bolesti (tri ili više bolnih otečenih zglobova prilikom dva pregleda u intervalu od mesec dana) uprkos primeni prethodnog lečenja sa najmanje jednim ili kombinacijom više lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) u toku šest meseci terapije; 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB; 3. Ankilozirajući spondilitis (M45) ukoliko je ispunjen jedan od kriterijuma: a) intolerancija ili neefikasnost pojedinačne primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca (a ukupno trajanje lečenja od najmanje šest meseci) ili b) prisustvo perifernog artritisa i intolerancije ili neefikasnosti nakon primene najmanje dva nesteroidna antiinflamatorna leka (NSAIL), u maksimalnoj preporučenoj dozi, u toku od po tri meseca uz sulfasalazin (a u ukupnom trajanju lečenja od najmanje šest meseci)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014400	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 4 ml (80 mg/4 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	13.660,40	-	-	-	1. Aktivna sistemska forma juvenilnog hroničnog artritisa (M06.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine i starijih koji nisu imali zadovoljavajući terapijski odgovor na primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) i kortikosteroida. 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014401	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 10 ml (200 mg/10 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	34.144,50	-	-	-	1. Aktivna sistemska forma juvenilnog hroničnog artritisa (M06.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine i starijih koji nisu imali zadovoljavajući terapijski odgovor na primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) i kortikosteroida. 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0014402	L04AC07	tocilizumab	ACTEMRA	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (400 mg/20 ml)	Roche Pharma AG	Nemačka	69.068,20	-	-	-	1. Aktivna sistemska forma juvenilnog hroničnog artritisa (M06.2; M06.1) kod pacijenata uzrasta od 2 godine i starijih koji nisu imali zadovoljavajući terapijski odgovor na primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) i kortikosteroida. 2. Reumatoidni artritis (M05 i M06) ukoliko je ispunjen kriterijum da posle 6 meseci primene lekova koji modifikuju tok bolesti (LMTB) nije postignut odgovarajući klinički odgovor tj. poboljšanje DAS28 skora za najmanje 1,2 ili više, ili oboleli i dalje imaju visoku aktivnost bolesti (DAS28 veći od 5,1), ili postoje elementi nepodnošljivosti LMTB.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Komisije RFZO.
0059102	M05BA03	pamidronska kiselina	AREDIA	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	libočica sa rastvaračem, 2 po 10 ml (30 mg)	Novartis Pharma AG	Švajcarska	3.165,70	60 mg	3.165,69	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijamom nivou zdravstvene zaštite.
0059300	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMITOR	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 2 ml (15 mg/ml)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	1.582,80	60 mg	3.165,62	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijamom nivou zdravstvene zaštite.
0059301	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMITOR	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 4 ml (15 mg/ml)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	5.024,90	60 mg	5.024,90	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijamom nivou zdravstvene zaštite.

Lista C - Lekovi sa posebnim režimom izdavanja

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0059302	M05BA03	pamidronska kiselina	PAMITOR	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 6 ml (15 mg/ml)	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	Austrija	7.537,40	60 mg	5.024,93	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059086	M05BA06	ibandronat	BONDRONAT	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 6 mg/6 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	13.231,30	6 mg	13.231,26	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059087	M05BA06	ibandronat	BONDRONAT	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 5 po 6 mg/6 ml	Roche Diagnostics GmbH	Nemačka	66.156,30	6 mg	13.231,26	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059092	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	koncentrat za rastvor za infuziju	ampula, 1 po 2 ml (2 mg/2 ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	5.862,70	6 mg	17.588,13	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059093	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica, 1 po 6 ml (6 mg/6 ml)	Pharmathen S.A.	Grčka	13.231,30	6 mg	13.231,26	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059211	M05BA08	zoledronska kiselina	ZOMETA	prašak za rastvor za infuziju	1 po 4 mg+ 5 ml rastvarača	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	13.590,90	4 mg	13.590,85	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
0059222	M05BA08	zoledronska kiselina	ZOLEDRONATE PHARMASWISS	koncentrat za rastvor za infuziju	bočica staklena, 1 po 5 ml (4 mg/5 ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	13.590,90	4 mg	13.590,85	-	1. Humoralna hiperkalcemija u malignitetu (HHM) preko 3,0 mmol/l, primena i održavanje normokalcemije tokom narednih šest meseci; 2. Hiperkalcemije preko 3,0 mmol/l; 3. Hiperkalcemijska koma.	STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili teracijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1079070	N07XX02	riluzol	RILUTEK	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	20.501,20	0,1 g	732,19	-	Amiotrofična lateralna skleroza - AML (G12.2).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara neurologa ili neuropsihijatra Klinike za neurologiju KCS kod pacijenata koji nisu respiratorno ugroženi.

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
	A				
N002410	A02AB01	aluminium hydroxide	tableta	500 mg	Terapija hiperfosfatemije u lečenju renalne osteopatije kod bolesnika sa hroničnom insuficijencijom bubrega.
N002451	A03BA01	atropine sulfate	injekcija	1 mg/1 ml	
N003798	A11JA..	retinol, fitomenadion, ergokalciferol, tokoferol ⁰	koncentrat za emulziju za infuziju	10 ml (135,3 mcg/ml + 20 mcg/ml + 1 mcg/ml + 0,64 mg/ml)	Deficit liposolubilnih vitamina A, D2, E, K1 uzrokovan različitim oboljenjima koji u osnovi imaju malapsorpciju ili malnutriciju (K90). Infant samo kod dece do 11 godina starosti. STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.
N002709	A12AA02	calcium gluconate	injekcija	10% a 10 ml	
N001016	A12CB01	zinc sulfate	tableta	20 mg	
N001024	A12CC02	magnesium sulfate	infuzija	20% a 100 ml	
	B				
N003616	B01AB01	heparin ⁰	rastvor za injekciju	5000 I.J./0,25 ml	
N001032	B02AA02	traneksaminska kiselina	tableta	500 mg	
N001040	B02AA02	traneksaminska kiselina ⁰	injekcija	100 mg/ml	
N002469	B02BX01	etamsylate	injekcija	250 mg/2 ml	
N003772	B05BA01	alanin, arginin, aspartanska kiselina, cistein, glutaminska kiselina, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, taurin, treonin, triptofan, tirozin, valin ⁰	rastvor za infuziju	100ml (6.3g/L+4.1g/L+4.1g/L+1g/L+7.1g/L+2.1g/L+2.1g/L+3.1g/L+7g/L+5.6g/L+1.3g/L+2.7g/L+5.6g/L+3.8g/L+300mg/L+3.6g/L+1.4g/L+500mg/L+3.6g/L)	STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.
N002105	B05BA03	glucose	rastvor za infuziju	50%	
N003624	B05XA01	kalijum hlorid ⁰	koncentrat za rastvor za infuziju	1mmol/ml	
N003632	B05XA02	natrijum hidrogenkarbonat ⁰	rastvor za infuziju	8,4%	
N003780	B05XC..	askorbinska kiselina, nikotinamid, natrijum-pantotenat, piridoksin, riboflavin, tiamin, folna kiselina, biotin, cijankobalamin ⁰	prašak za rastvor za infuziju	10 ml (100mg+40mg+15mg+4mg+3.6mg+2.5mg+0.4mg+60mcg+5mcg)	STAC; Samo za hospitalno lečenje pedijatrijske populacije.
	C				
N001065	C01BA01	quinidine sulfat	tableta	200 mg	
N001073	C01BA02	procainamide hydrochloride	injekcija	100 mg/ml	
N002477	C01BC03	propafenon	injekcija	35 mg/10 ml	
N001081	C01CA02	isoprenaline	injekcija	10 mg/5 ml	
N001099	C01CA03	noradrenalin	injekcija	1 mg/ml	
N001107	C01CA06	phenilephrin	injekcija	10 mg/ml	

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003914	C01CA24	adrenalin hidrohlorid (epinefrin) ⁰	rastvor za injekciju	1 mg/ml	
N002683	C01DA02	glyceryl trinitrate	sublingvalna tableta	500 mcg	
N003004	C01DA02	glyceryl trinitrate ⁰	rastvor za injekciju	1 mg	
N003038	C01DA02	glyceryl trinitrate	rastvor za infuziju	1 mg	
N003012	C01DA02	glyceryl trinitrate ⁰	koncentrat za rastvor za infuziju	5 mg	
N003491	C01DX12	molsidomin	tableta	2 mg	
N003509	C01DX12	molsidomin ⁰	tableta	4 mg	
N003517	C01DX12	molsidomin	tableta sa produženim oslobađanjem	8 mg	
N002311	C01EA01	alprostadil	injekcija	500 mcg	
N001115	C02DA01	diazoksid	kapsula	25 mg	
N001123	C02DA01	diazoksid	injekcija	15 mg/ml	
N001131	C02DD01	natrijum nitroprusid	injekcija	50 mg	
N003178	C03CA01	furosemid ⁰	tableta	40 mg	-
N003186	C03CA01	furosemid ⁰	rastvor za injekciju	20 mg/2ml	-
N001149	C03DB01	amilorid	tableta	5 mg	
N001156	C04AX02	phenoxybenzamin	kapsula	10 mg	
N001164	C04AX02	phenoxybenzamin	injekcija	50 mg/ml	
N002626	C10AC01	colestyramine	prasak	4 g	
	D				
N002485	D05BA02	methoxsalen	tableta	10 mg	
	G				
N002949	G02CB03	cabergolin	tableta	0,5 mg	Tumori hipofize - za osobe koje imaju izražene neželjne efekte na prethodnu terapiju bromokriptinom. Lek se uvodi u terapiju na osnovu konzilijarnog mišljenja tri lekara endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003210	G03GB02	klomifen	tableta	50 mg	Za indukciju ovulacije kod anovulatorne i oligoovulatorne neplodnosti kod žena (N97).
N003277	G04BE03	sildenafil	tableta	20 mg	Plućna hipertenzija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
	H				
N001206	H01AA01	corticotrophin-releasing factor-CRF	injekcija	25 IU	
N001214	H01AA02	tetrakosartid	injekcija	1 mg/ml	

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N002493	H01BA02	dezmpresin	injekcija	4 mcg/1ml	
N002501	H01BA02	dezmpresin	injekcija	20 mcg/1ml	
N001222	H01CA01	gonadorelin	injekcija	100 mcg	
N001263	H02AA02	fludrocortizon	tableta	0,1 mg	
N003731	H02AB02	deksametazon	tableta	4 mg	
N002634	H02AB09	hidrokortizon	tablete	10 mg	
N002923	H02AB09	hidrokortizon ⁰	prašak za injekciju	100 mg	
N002931	H02AB09	hidrokortizon ⁰	prašak za injekciju	500 mg	
	J				
N002121	J01BA01	hloramfenikol	injekcija	1000 mg	
N002907	J01CE01	benzilpenicilin	prašak za injekciju	1 MIU	
N002915	J01CE01	benzilpenicilin	prašak za injekciju	5 MIU	
N001289	J01CE08	benzatinbenzilpenicilin	injekcija	1,2 MIU	
N001297	J01CE08	benzatinbenzilpenicilin	injekcija	2,4 MIU	
N001305	J01CF02	cloxacilin	injekcija	500 mg	
N003806	J01CR01	ampicilin, sulbaktam ⁰	prašak za rastvor za injekciju	1000 mg + 500 mg	
N001313	J01EC02	sulfadiazin	tableta	500 mg	
N001321	J01FA01	eritromicin	injekcija	1000 mg	
N002865	J01GA01	streptomycin sulfat	prašak za injekciju	1 g	Tuberkuloza (A15)
N002139	J01GB04	kanamycin	injekcija	1000 mg	
N003657	J02AA01	amfotericin B ⁰	rastvor za infuziju (lipidni kompleks)	50 mg	
N003665	J02AA01	amfotericin B ⁰	rastvor za infuziju (lipidni kompleks)	100 mg	
N002733	J02AA01	amfotericin B	rastvor za infuziju	50 mg	
N001339	J02AA01	amfotericin B (sa liposomima)	injekcija	50 mg	
N002147	J04AA01	p - aminosalicilic acid	tableta	500 mg	
N002154	J04AA01	p - aminosalicilic acid	granula	4 g	
N002162	J04AB01	cycloserine	kapsula ili tableta	250 mg	
N002329	J04AB02	rifampicin	kapsula ili tableta	150 mg	
N002170	J04AB30	capreomycin	injekcija	1000 mg	
N002337	J04AC01	izoniazid	tableta	100 mg	
N002519	J04AC01	izoniazid	tableta	300 mg	
N002188	J04AD03	ethionamide	tableta	125 mg	
N002196	J04AD03	ethionamide	tableta	250 mg	
N001347	J04AK01	pyrazinamide	tableta	400 mg	
N001354	J04AK02	etambutol	tableta	400 mg	
N002675	J04BA02	dapsone	tablete	50 mg	

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N002741	J05AE03	ritonavir	oralni rastvor	80 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002758	J05AE07	fosamprenavir	oralna suspenzija	50 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002766	J05AE09	tipranavir	oralni rastvor	100 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002774	J05AE..	lopinavir, ritonavir	oralni rastvor	80 mg/ml + 20 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003020	J05AF01	zidovudin	oralni rastvor	50 mg/5 ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002782	J05AF04	stavudin	prašak za oralnu suspenziju	1 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002808	J05AF05	lamivudin	oralni rastvor	10 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N002816	J05AF06	abakavir	oralni rastvor	20 mg/ml	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: Klinike za infektivne i tropske bolesti KCS, Klinike za infektivne bolesti KC Niš, Klinike za infektivne bolesti KC Vojvodine, Klinike za infektivne bolesti KC Kragujevac.
N001362	J06AA01	diphtheria antitoxin	injekcija	10000 IU	
N002204	J06AA01	diphtheria antitoxin	injekcija	20000 IU	

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
	L				
N001396	L01AA01	cyclophosphamide	tableta	50 mg	
N002212	L01AA02	hlorambucil	tableta	2 mg	
N001404	L01AA03	melphalan	injekcija	50 mg	
N002220	L01AA03	melphalan	tableta	2 mg	
N001412	L01AA05	chlormethine(cariolizin)	injekcija	10 mg	
N003699	L01AA09	bendamustin	prašak za rastvor za infuziju	25 mg	Hronična limfocitna leukemija.
N003707	L01AA09	bendamustin	prašak za rastvor za infuziju	100 mg	Hronična limfocitna leukemija.
N002238	L01AB01	busulfan	tableta	2 mg	
N001438	L01AC01	thiotepa	injekcija	15 mg	
N001446	L01AD01	karmustin	injekcija	100 mg	
N001453	L01AD02	lomustin	tableta	40 mg	
N002964	L01AX04	dakarbazin	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	100 mg	
N002972	L01AX04	dakarbazin	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	200 mg	
N002246	L01BB02	merkaptopurin	tableta	50 mg	
N003525	L01BB03	tioguanin	tableta	40 mg	Akutna leukemija, limfoblastni limfom kod dece i odraslih (C91.0; C92.0; C83.5).
N003111	L01BC02	fluorouracil ⁰	rastvor za injekciju	50 mg/ml	
N003129	L01BC02	fluorouracil ⁰	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	250 mg/5 ml	
N003137	L01BC02	fluorouracil ⁰	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	500 mg/10 ml	
N003152	L01BC02	fluorouracil ⁰	rastvor za injekciju/infuziju	1000 mg/20 ml	

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003202	L01BC02	fluorouracil ⁰	rastvor za injekciju/infuziju	5000 mg/100 ml	
N001479	L01DA01	daktinomycin	injekcija	0,5 mg	
N003467	L01DB07	mitoksantron ⁰	koncentrat za rastvor za infuziju	10 mg/5 ml	
N003475	L01DB07	mitoksantron ⁰	koncentrat za rastvor za infuziju	20 mg/10 ml	
N002428	L01DC03	mitomicin	prašak za injekciju	1 po 5 mg	
N002527	L01DC03	mitomicin	prašak za injekciju	1 po 10 mg	
N002436	L01DC03	mitomicin	prašak za injekciju	1 po 20 mg	
N001487	L01XB01	procarbazine hydrochloride	kapsula	50 mg	
N001495	L01XX02	l-asparaginase	injekcija	10000 IU	
N001503	L01XX23	mitotane	tableta	500 mg	Karcinom nadbubrežne žlezde
N002253	L02AB02	medroksiprogesteron	tableta	100 mg	
N003608	L03AX03	atenuirani bacili Mycobacterium bovis, soj BCG ⁰	prašak za intravezikalni rastvor	1x12,5mg/2-8x108 CFU	
N002360	L04AX02	thalidomide	tableta	100 mg	Multipli mijelom
	M				
N001511	M01CC01	penicillamine	kapsula	250 mg	Willson-ova bolest
N003145	M03AC01	pankuronijum ⁰	rastvor za injekciju	4 mg/2 ml	
N003285	M03BX01	baclofen	tableta	5 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003293	M03BX01	baclofen	tableta	10 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003301	M03BX01	baclofen	tableta	25 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003319	M03BX01	baclofen	injekcija	0,05 mg	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
					Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003327	M03BX01	baclofen	infuzija	0,05 mg/2 ml	
N001529	M09AA01	quinine dihydrochloride	injekcija	600 mg/2 ml	
	N				
N001537	N01AF03	thiopenthal	injekcija	0,5 g	
N001545	N01AX03	ketamin	injekcija	50 mg/1 ml	
N001552	N01BB02	lidocain	sprej	10%	
N001560	N01BB52	lidocain, epinephrin	krema	2,50%	
N003749	N02AA01	morfin	tableta sa produženim oslobađanjem	10 mg	Samo za decu.
N003756	N02AA01	morfin	tableta sa produženim oslobađanjem	30 mg	Samo za decu.
N003764	N02AA01	morfin	tableta sa produženim oslobađanjem	60 mg	Samo za decu.
N001610	N03AB02	phenytoin	injekcija	250 mg	
N001628	N03AB02	phenytoin	kapsula ili tableta	25 mg	
N001636	N03AB02	phenytoin	kapsula ili tableta	50 mg	
N001644	N03AB02	phenytoin	kapsula ili tableta	100 mg	
N002543	N03AG04	vigabatrin	kapsula	500 mg	Epilepsija na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003335	N03AX03	sultiame	tableta	50 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003343	N03AX03	sultiame	tableta	200 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003350	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	25 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003368	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	50 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003376	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	100mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003384	N03AX15	zonisamid	orodisperzibilna tableta	300 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N001677	N05AA02	levomepromazin	tableta	100 mg	
N003079	N05AN01	litijum karbonat	kapsula	300 mg	
N002956	N05BA09	clobazam	tableta	10 mg	Epilepsija (G40)

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003392	N05BA09	clobazam	tableta	20 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003400	N05CC01	chloralhydrate	oralni rastvor	100 mg/ml	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003418	N05CC01	chloralhydrate	kapsula	250 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003426	N05CC01	chloralhydrate	kapsula	500 mg	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003681	N05CD08	midazolam	rastvor za bukalnu primenu	10 mg/ml	Terapija prolongiranih akutnih konvulzivnih napada kod dece starosti od 3 meseca do 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003434	N06BX03	piracetam	oralni rastvor	333mg/ml	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N003442	N06BX03	piracetam	granule	2,4 g	Progresivna mioklonična epilepsija (G40) udružena sa drugim označenim degenerativnim bolestima nervnog sistema (G31.8). Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N002691	N07AA01	neostigmin	rastvor za injekciju	0,5 mg/ml	
N001669	N07AA01	neostigmin ^u	injekcija	2,5 mg/ml	
	P				
N001685	P01BA01	chloroquine phosphate ili sulphate	tableta	100 mg	
N001693	P01BA01	chloroquine phosphate ili sulphate	tableta	150 mg	
N001701	P01BA01	chloroquine phosphate ili sulphate	tableta	250 mg	
N001719	P01BA02	hidroxychloroquine	tableta	200 mg	
N001727	P01BA03	primaquin diphosphate	tableta	15 mg	
N001735	P01BB01	proguanil hydrochloride	tableta	100 mg	
N001743	P01BC01	quinine bisulfat ili sulfat	tableta	300 mg	
N001750	P01BC02	mefloquine hydrochloride	tableta	250 mg	
N001768	P01BD01	pyrimethamin sulfat	tableta	25 mg	
N001776	P01BE02	artemether	injekcija	80 mg/ml	
N001784	P01BE02	artemether	tableta	20 mg	
N001792	P01BE03	artesunat	tableta	50 mg	
N001800	P02BA01	praziquantel	tableta	150 mg	
N001818	P02BA01	praziquantel	tableta	600 mg	
N002642	P02CA01	mebendazol	tableta	100 mg	
N002659	P02CA03	albendazol	tableta	200 mg	1. Ehinokokoza, 2. Cisticerkoza
N001826	P02CB02	diethylcarbamazine dihydrogen citrate	tableta	50 mg	
N002279	P02CB02	diethylcarbamazine dihydrogen citrate	tableta	100 mg	
N001834	P02CF01	ivermectin	tableta	3 mg	
N001842	P02CF01	ivermectin	tableta	6 mg	
N001859	P02DA01	niclosamid	tableta	500 mg	
N002873	P03AX01	benzyl benzoate	losion	25%	
	R				
N001867	R03BB01	ipatropium bromid	ampula za inhalaciju	0,25 mg/1 ml	

Lista D- Lekovi koji nemaju dozvolu za stavljanje u promet u Republici Srbiji, a neophodni su u dijagnostici i terapiji - neregistrovani lekovi

ŠIFRA LEKA	ATC	INN	FO	JAČINA LEKA	INDIKACIJE
N001875	R03CC02	salbutamol	injekcija	1 mg/ml	
N003160	R03DA05	aminofilin	rastvor za injekciju/infuziju	250 mg/10 ml	
N003483	R03DA05	aminofilin	rastvor za injekciju/infuziju	240 mg/10 ml	
	S				
N003087	S01EB01	pilokarpin °	kapi za oči	2%	
N001891	S01EC01	acetazolamide	tableta	250 mg	
N001909	S01EC01	acetazolamide	injekcija	500 mg	
N003095	S01FA01	atropin °	kapi za oči, rastvor	0,50%	
N003103	S01FA01	atropin °	kapi za oči, rastvor	1%	
	V				
N002535	V03AB	trientine trietilen tetramin-dihidrohlorid	kapsula	300 mg	Willson-ova bolest
N003640	V03AB14	protamin °	rastvor za injekciju	50 mg/5 ml	
N001917	V03AB15	naloxon hydrochloride	injekcija	0,4 mg/ml	
N001925	V03AC01	deferoxamine mesilat	injekcija	500 mg	
N001933	V03AF01	mesna (uromiteksan)	injekcija	400 mg	
N002584	V04CD01	metyrapone	kapsula	250 mg	Cushingov sindrom na osnovu mišljenja tri lekara Instituta za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS - Beograd.
N001941	V04CJ02	protirelin	injekcija	0,2 mg	
N001958	V04CJ02	protirelin	injekcija	0,4 mg	
N003673	V08BA02	barijum sulfat °	suspenzija	1 g/ml	

° Lek se nabavlja samo u izuzetnim slučajevima kada snabdevanje lekom istog INN, istog ili srodnog farmaceutskog oblika i iste jačine sa Liste A, A1, B ili C ne zadovoljava potrebe u lečenju osiguranih lica RFZO-a.